

ДОМАШНИЙ
ЛЪЧЕБНИКЪ.

РУЧНАЯ КНИГА ДЛЯ ВСЯКОГО,

ПАМЯТКА

ДЛЯ ПОМОЩИКОВЪ, ЖЕНЩИНЪ ВЪ
БЕРЕМЕННОСТИ И ГУТЕНЦЕСТВУЮЩИХЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЪ.

1833

BIBLIOTHEQUE

DU

PRINCE E. LWOFF.

Arm. 18

Ray. 8

Nº 28

БИБЛИОТЕКА
ИМПЕРАТОРСКАГО УНИВЕРСИТЕТА
Св. Владимира.

БИБЛИОТЕКА ГЕН.-АДЪЮТАНТА
Дмитрия Гавриловича
БИБИКОВА,
пожертвованная Университету
его дочерью,
ГРАФИНЕЮ КАССИНИ
въ 1898 г.

№ 926.

ДОМАШНИЙ
ЛЪЧЕБНИКЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

A-138909

~~65/08
F.M.~~

ДОМАШНИЙ
ЛЪЧЕНИКЪ,
или
ОБСТОЯТЕЛЬНОЕ и ЯСНОЕ
ПОКАЗАНІЕ,

какъ

во всѣхъ опасныхъ, скоропоспѣжныхъ и продолжительныхъ, какъ наружныхъ, такъ и внутреннихъ болѣзняхъ при отсутствии врача, можно подать нужную помощь посредствомъ однихъ домашнихъ средствъ и дѣшы; сверхъ того, какъ поступать касательно предупрежденія болѣзней и храненія своего здравія.

РУЧНАЯ КНИГА ДЛЯ ВСЯКАГО,
а наилѣбѣ
для помѣщиковъ, живущихъ въ деревняхъ и путешествующихъ.

К. И. КИЛІАНА,

Доктора Медицины и Профессора.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ,

содержащая въ себѣ всѣ опасныя, повалыныя, скорой помощи требующія болѣзни и отравленія различнаго рода ладами.

ПЕРЕВОДЪ съ Нѣмецкаго
ПЕТРА БУТКОВСКАГО.

Издание второе,
переводившимъ во многомъ дополненное и вновь передѣланное.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

Печатано въ Типографіи Ивана Глазунова, 1830 года.

Печать позволяет,

съ тѣмъ, чтобы по оцпечатаніи и едставле-
ны были въ Цензурный Комитетъ при экзем-
пляра. Санктпетербургъ, Декабря 28 дня 1828
года.

Цензоръ Николай ІІеглосъ.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Благосклонное принятие Публикою перваго изданія сей книги побудило меня приспупити и ко впорому. Желая содѣлать ее удобнѣйшею къ употребленію и доспавити ванцшую пользу, я вознамѣрился изданіе сіе исправить, дополнить и перемѣнить сообразно новѣйшимъ наблюденіямъ. Въ слѣдствіе сего всѣ существоспѣ болѣзней, изложенные по Бровніанской системѣ, какъ недоставляющія пользы народу, уничтожены, расположение горячекъ и воспаленій измѣнено, многія болѣзни и спатия объ оправленіяхъ совершенно передѣланы, а лѣченіе нѣкоторыхъ недуговъ дополнено. Въ первой главѣ впорой часпи, помѣщено вновь о

родахъ, болѣзняхъ беременныхъ женщинъ, роженицъ и поворожденныхъ младенцовъ; а во второй главѣ сей части прибавлены венерическія и другія болѣзни. Изъ ша-
коваго умноженія предметовъ необходимо должна была соспавиться третья часть,
въ коей всѣ спасы перваго изданія по-
полнены, умножены, а нѣкоторыя вновь
передѣланы.

Не маловажное затрудненіе при соспав-
леніи сей книги соспояло въ замѣненіи
техническихъ терминовъ проспымъ удо-
бопонятными изречніями, въ удобовразу-
мительномъ для каждого изъясненіи бо-
лѣзняхъ измѣнений и въ изложеніи
леченія болѣзней проспымъ домашними
средствами. Трудъ сей шѣмъ болѣе былъ
для меня ощущимеленъ, чѣмъ изъ обши-
наго числа книгъ, относящихся до опе-
чественной народной медицины, нѣпъ
почти ни одного могущаго служить над-
лежащимъ руководствомъ; ибо почти
всѣ онѣ, изключая сочиненіе *Каленецка-*
го, или списаны одни съ другихъ, или

выбранны изъ медицинскихъ книгъ, слу-
жащихъ руководствомъ для однихъ Вра-
чей. Во избѣжаніе сего, я принужденъ былъ
при собственныхъ наблюденіяхъ поль-
зоваться иностранными сочиненіями (*)
и приспособлять все извлекаемое изъ
нихъ къ образу жизни и привычкамъ
Россійскаго народа. — Не гоняясь за сла-
вою, а шѣмъ менѣе за корыстю, я со-
чишу себя въ полной мѣрѣ награжден-
нымъ за понесенный трудъ, если сочи-

(*) 1) Беккера новая домашняя и дорожная апте-
ка. (*Neue Haus- und Reise-Apotheke* 2 Th.
1805). 2) Рейля діэптическій домашній
врачъ. (*Diätet. Hausarzt.* 1791). 3) Конс-
бружа діэптичика (*Dietät. Taschenbuch.*
1820). 4) Новая Англинская Библиопека
домашн. средствъ Опд. III. Медицин.
Домашн. средства. (*Neue Englische Bib-
liotheek der Hausmittel.* III. Abt. Medicin.
Hausmittel. 1825). 5) Орфиллы о спасеніи
оправленныхъ и мнимо-умершихъ (*Se-
cours à donner aux personnes empoisonnées
et Asphyxiées* 2 ed. 1821) и другія означен-
ныхъ Авторовъ сочиненія.

иение сие доспавить соотечесивнн
моимъ предполагаемую пользу.

П. Бутковскій.

Санктпетербургъ,

1828 года

Октября 10 дня.

~~~~~

# О ГЛАВЛЕНИЕ

## КЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

~~~~~

	Спран.
I. Объ огневицахъ вообще	1.
I. Воспалительная горячка	37.
II. Аспеническая горячка	53.
Прибавление	68.
III. Желчная горячка	95.
Холодная или перемежающаяся лихорадка	108.
О воспаленіяхъ вообще	128.
Воспаленіе глазъ	145.
Воспаленіе горла, или жаба	147.
Воспаленіе груди, или колошье въ боку	157.
Воспаленіе желудка	174.
Воспаленіе кишечка	185.
Воспаленіе печени или печенки	185.
Воспаленіе селезенки	195.
Воспаленіе почекъ	194.
Воспаленіе мочеваго пузыря	200.
Воспаленіе машки	201.
О скорошечныхъ болѣзняхъ кожи вообще	204.
Красуха или скарлапина	214.
Рожа	222.
Ревматизмъ или ломота съ горячкою	250.
Кашарръ	254.
Коклюшъ или судорожный кашель	243.
Одышка, или удушье и удушливый кашарръ	255.


II

Стран.

Нашужный или кровавый поносъ	264.
Холера или понось съ рвотою	269.
Кровошече́ніе изъ носа	276.
Кровохарканіе или кровавый ка- шель.	278.
Кровавая рвота	288.
Кровавая моча или кровавое моче- шченіе.	295.
Болѣзньное кровошече́ніе изъ маники	297.
Преждевременные роды или вы- кидыши	300.
Боли отъ мочевыхъ камней.	304.
Ущемление грыжи или килы	307.
Обморокъ	312.
Обмирание, или несовершенная смерть.	314.
A. О спасеніи пораженныхъ угаромъ	317.
B. О вспомоществованіи мнимо-умер- шимъ отъ испорченаго воз- духа	319.
C. Объ оживленіи замершихъ	320.
D. О спасеніи ушопшихъ	321.
E. О спасеніи удавленныхъ, или повѣ- сившихся	322.
Поспѣль, или ударъ	323.
Параличъ	329.
Падучая болѣзнь.	333.
Злая корча или рафания.	335.
Злокачественный волдырь	342.
Сибирская болѣзнь, или Сибир- ская язва	349.
Ожога	357.
Оппизибъ.	361.
Свѣжія раны	363.
Объ отравленіяхъ различного рода ядами	368.

III

	Спран.
I. Оспрые яды	375.
II. Ртущные или меркуриальные со- ставы	378.
III. Соспавы изъ мѣди.	381.
IV. Соспавы изъ свинца	383.
V. Крѣпкія кислошы	385.
VI. Щелочи	388.
VII. Шпанскія мушки	389.
VIII. Оспрыя ядовитыя распенія	392.
Одурающе или усыпительные яды	394.
II. Синильная кислота	397.
Оглушающе-оспрые яды	399.
I. Ядовитые грибы	—
Признаки подозрительныхъ гри- бовъ	402.
II. Одурающе-оспрыя распенія	—
III. Спиртовые напитки	404.
Объ укушеніи разнаго рода змѣй	406.
Объ укушеніи шаранишила	410.
Объ ужаленіи пчелъ, осъ, шерш- ней, оводовъ и другихъ ядо- вивыхъ насекомыхъ	413.
Объ укушеніи бѣшеныхъ живот- ныхъ и о шакъ называемой водобоязни	414.
Внутреннее лѣченіе укушенного бѣ- шенымъ животнымъ человѣка.	418.
Средство предохранять отъ водо- боязни.	—
Польза водяного попушника	420.
Лѣкарственные соспавы	423.



I.

О БЪ ОГНЕВИЦАХЪ ВООБЩЕ.

§ 1.

Огневицю или горяtkою называешся вообще всякая болѣзнь, сопровождаемая по-перемѣннымъ ознобомъ и жаромъ съ учащеннымъ и ускореннымъ жилобіеніемъ.

Явленія сии свойственны всѣмъ безъ изъяшія горячкамъ; но въ нѣкоморыхъ оказываются они болѣе и сильнѣе, а въ другихъ напротивъ того менѣе и слабѣе.

Кромѣ сихъ, при всѣхъ вообще огневицахъ въ большей или меньшей степени и въ нижеизложенномъ порядкѣ находятся еще слѣдующія:

Я в л е н і я.

§ 2.

1. *Предъ наступленіемъ.* Когда горячка поражаетъ больного мгновенно, — какъ

Часть I.

часто случается при воспалительной, то больной до самого наступления оной находится здоровымъ, веселымъ и бодрымъ. Если же оказывается она постепенно, то за нѣсколько времени предъ появлениемъ ея, больной бываешь не весель, имѣешь зѣвоншу и пошигашу, чувствуешь усталость и изнеможеніе, жалуешься на уменьшеніе позыва на пищу, тошноту, давленіе подъ ложечкою, сухость во рту и шаткость въ головѣ, часто перемѣняешься въ лицѣ, спрадаешь безсонницею или необыкновенною сонливостью, запоромъ на низъ, либо поносомъ и проч.

2. Во время наступленія. Всякая горячка начинается непріятнымъ ощущеніемъ чрезмѣрного холода. Впрочемъ холдъ шаковой касательно силы и продолженія своего бываешь различенъ. Иногда оказывается онъ токмо шероховатостью кожи или легкимъ ознобомъ (какъ говорится, морозъ по кожѣ подираешь); иногда же бываешь довольно продолжитель и сопровождаешься дрожаніемъ всѣхъ членовъ, стѣсненіемъ вокругъ ложечки, тошнотою и рвотою.

3. Во время достиженія высокой степени. Послѣ озюба пощасъ слѣдуешь жаръ, а съ симъ появляешься и жажда. Си и всѣ припадки, обнаруживающіеся предъ наступленіемъ горячки, съ каждымъ возвращающимся пароксизмомъ уменьжаются въ жестокости, продолженіи

и числъ до шѣхъ поръ, пока сдѣлаюшся наконецъ безпрерывными, — и если не будущъ преодолѣны цѣлишельною силою напуры или искусствомъ, то либо произведущъ другую болѣзнь, либо рано или поздно истощашъ жизненные силы и совершенно оспановляшъ живопнную машину.

И с х о д ы.

§ 5.

Исходы огневицы суть троякіе: а) разрѣшеніе или переломъ. б) Переходъ въ другую болѣзнь и с) смерть.

Переломъ ешь шакое дѣйствіе напуры, посредствомъ коего все болѣзнепворное веществство чрезъ приличные пупы испражняется изъ тѣла.

Послѣ настоящаго или совершенного перелома слѣдуешьъ всегда и совершенное выздоровленіе; если же онъ бываешьъ недоспашоченъ или обнаруживаешьъ совсѣмъ пропивнымъ свойству недуга образомъ, то и горячки или ожесточающа, или переходяща въ другія болѣзни.

Переломы, смотря по различію органовъ, чрезъ посредство коихъ они совершающа, бывающа различны.

Органы же или пупы, коими шаковыя дѣйствія напуры чаще и удобнѣе оказывающа, суть: а) Кожа (органъ испаренія),

b) почка (органъ отдаленія мочи), с) кишечный каналъ (поносъ) и d) Кровоносные сосуды (кровопречленія).

Каждому перелому предшествуютъ признаки или предвестники онаго, по коимъ можно узнать:клонится ли имѣющаяся горячка къ перелому и какими собственно пушнями сей послѣдній буде приводить совершающіяся. Точное познаніе шаковыхъ признаковъ необходимо нужно, частію для того, дабы узнать, скоро ли окажется переломъ или нѣтъ, частію же для того, нужно ли и должно ли вспомогательствомъ его развишю и совершенію.

§ 4.

Обыкновеннѣйшіе переломы и признаки ихъ приближенія суть слѣдующіе:

1) *Потѣхъ или испареніе* предвѣщающееся мягкимъ волнообразнымъ жилобеніемъ, мягкую и влажную кожу, зудомъ и спрекопаніемъ въ оной или легкимъ ознобомъ и подираніемъ по кожѣ; также малоколичественнымъ испражненіемъ мочи. Большею частію онъ случается въ воспалительной горячкѣ, у людей крѣпкаго сложенія и у тѣхъ, кои привыкли излѣчиваться потомъ. Настоящій кризискій потъ долженъ быть совершенно теплый, не слишкомъ сильный и распространенный по всему тѣлу. Съ по-

шомъ высступають иногда на кожѣ, особенно въ аспеническихъ горячкахъ, прозрачные пузырки, заключающіе въ себѣ жгучую влагу.

2) *Накожныя сыпи* предзнаменующіе: шоска, шрудное дыханіе, сухой, коропкій кашель, давленіе и щекотаніе въ груди, боль въ поясницѣ и крестцѣ, чувство распягиванія и напряженія поперемѣнно въ разныхъ часахъ тѣла оказывающіяся, шупосьть ручныхъ и ножныхъ пальцовъ, чрезвычайное беспокойство, беспорядочное жилобіеніе, иногда легкій пошъ, чиханіе, небольшой ознобъ, заиканіе и рвота.

Всѣ накожныя сыпи, оказывающіяся въ горячкахъ, всегда бывають рѣшищельныя, даже и шть, кои происходяшь отъ какой либо извѣстной заразительной мазеріи?? (Корь, красуха и проч.) Хотя сіи послѣднія гораздо рѣже. Часто рѣшищельная сыпь высступаетъ уже послѣ 3 часовъ по наступлению горячки, иногда же не прежде 13 дней.

Чѣмъ позже появляется накожная сыпь, штѣмъ опаснѣе, поелику отъ долгаго существованія болѣзни, силы больнаго не рѣдко уже такъ испощены бывають, что переломъ не можетъ бывть во всей силѣ совершеннымъ; однако до 13 дня накожная сыпь никогда неопасна.

Равнымъ образомъ сыпи, происходящія отъ извѣстной какой либо заразы и мо-

гущія быть причислены къ рѣшипельнымъ, также опасны, если они позже, нежели какъ должно обнаруживаются.

3) *Моча.* Признаки, предвѣщающіе переломъ чрезъ мочу, суть: шлягость въ поясницѣ, давленіе и напряженіе около мочеваго пузыря, зудъ и жженіе въ дѣшородныхъ частяхъ и частное побужденіе къ испражненію мочи; при чмъ оказывается сильная жажда, сухость кожи и языка, также мягкое, иногда перемѣжающееся жилобіеніе (пульсъ).

Переломъ чрезъ мочу чмъ совершеніе бываешьъ, если съ оною вмѣстѣ появляется и криптическій попъ.

Рѣшипельная моча должна опѣдѣляться въ обильномъ количествѣ и испражняется довольно часто. По испущеніи ея сперва показывается на верху сосуда облачко, попомъ дѣлается въ срединѣ онаго мутность, — — — переходящая наконецъ въ осадокъ. — Осадокъ сей бываешьъ бѣлой или красной, легкой, связной, на срединѣ нѣсколько возвышенъ, и споящая на ономъ моча не имѣетъ запаха.

Темно-желтая моча, опѣдѣляющаяся съ зудомъ въ дѣшородныхъ частяхъ и необразующая никакого облачка или скромно маленькое, плавающее на верху, не предвѣщающіе никакого перелома; безпреспанно же перемѣняющаяся, то свѣтлая, то темная, то мутная, показываешь продолжительность горячки.

4) *Поносъ* большею частію бываєть криптическимъ въ шѣхъ горячкахъ, кои сопряжены съ спраданіемъ брюшныхъ внутренностей, какъ то: въ желудочныхъ, желчныхъ и проч. Приближеніе его можно узнать изъ раздушости брюха, боли, рѣзи и ворчанія въ животѣ, напряженія и опухоли въ пахахъ, боли въ спинѣ, малоколичественаго отданія мочи, иногда болѣе или менѣе перемѣжающагося жилобіенія, заикованія больнаго, влажности языка, такжे дрожанія губъ и языка.

Рѣшищельный поносъ не долженъ быть слишкомъ сильный и всегда долженъ облегчать болѣзнь. Испражняемая имъ мацерія, смешанная по органамъ, отдаляющимъ ону, бываєть различна.

5) *Рвота* предвозвѣщающаяся: тошкою, беспокойствомъ, дрожью, болью въ головѣ и спинѣ, холоднымъ потомъ, особенно на лбу, головокруженіемъ, помраченіемъ зреїнія, отрыжкою, жженіемъ и напряженіемъ въ желудочной споронѣ, тошнотою, часпымъ плеваніемъ, дрожаніемъ нижней губы и неправильно перемѣжающимся жилобіеніемъ.

Криптическая рвота разрѣшаєть болѣзни, коихъ отдаленная причина находилась въ желудкѣ, или кои могутъ быть уничтожены чрезъ потрясеніе всей нервной системы. Впрочемъ рвота рѣже

другихъ испражненій бываєшъ переломъ.

6) *Кровотечеи изъ носа.* Сему перелому наиболѣе склоненъ юношескій возрастъ. Наспупленію его обыкновенно предшествуетъ давленіе въ запылкѣ, вискахъ, плечахъ и груди, головная боль, искры предъ глазами, особенно, когда они закрыты, шумъ и звонъ въ ушахъ, непривольное печеніе слезъ, часпый зудъ въ носу и чиханіе, сухой и красной носъ, какъ при насморкѣ, красное, раздутое лицо, сильное біеніе шейныхъ и височныхъ боевыхъ жилъ и двойное жилобіеніе, при копоромъ аршерія (боевая жила) два раза разширяется и одинъ разъ сокращается. Кровь иногда выходитъ шокомъ изъ одной ноздри, соопицѣствующей той споронѣ тѣла, въ которой находиться болная внутренность.

7) *Погетчъ (геморой).* Если больной подверженъ бытъ открытию почечную и во время горячки чувствуетъ жгучую, непостоянную, бьющуюся боль въ спинѣ, пояснице, крестцѣ и бедрахъ, часпое побужденіе къ испражненію мочи и кала, зудъ и жженіе въ заднемъ проходѣ и мишонкѣ, біеніе въ макушкѣ головы и пр. то съ вѣроятностію можно заключить, что переломъ воспослѣдуется чрезъ почечуйное кровотеченіе.

8) *Мѣсячныя отищенія* могутъ также заструпить мѣсто перелома, ежели срокъ

онаго подойдетъ къ тому времени, когда они должны появиться. Но иногда они и ранѣе для сей цѣли показываются. Признаки наступленія ихъ суть: чувство распягиванія и тягота въ лядвяяхъ и большихъ губахъ дѣшородныхъ частей, также давленіе въ лобкѣ, сопряженное съ болью и жженіемъ при испусканіи мочи. Сверхъ того всякая женщина имѣетъ совершенно особиыя чувствованія, предвѣщающія мѣсячное очищеніе.

Должно впрочемъ замѣтить, что чрезъ мѣсячныя очищенія, такъ какъ и вообще чрезъ кровопеченія, рѣдко происходяще совершиенные переломы.

9) *Выхаркиваніе мокроты изъ легкихъ* предзначающее обыкновенно: спѣсненіе груди и трудное дыханіе, соединенное съ кашлемъ. Оно свойственно большою частию только шѣмъ горячкамъ, кои сопряжены съ спраданіемъ грудныхъ внутренностей. Рѣшильная харкоптина должна быть блѣдно-желтоватая, склизкая, слизистая, шаровидная, гуская, легко растворимая и съ облегченіемъ дыханія извергающаяся.

10) *Слюнотегеніе* случается наиболѣе въ нервныхъ и гнилыхъ горячкахъ, въ сливной оспѣ, просѣ и иногда въ жабѣ. Оно обнаруживается опухолью шейныхъ железъ, труднымъ глопаніемъ, болью за ушами и въ запылкѣ; при чѣмъ лице,

шече и руки бываюшъ опухшими, кожа сухая и вѣдь другія испражненія извергаются въ маломъ количествѣ.

Переломы сіи суть обыкновеннѣйшіе въ горячкахъ; но часто случаются они безъ всякихъ предзнаменованій и не всегда обнаруживаются въ полной мѣрѣ совершенными, и потому не всегда можно полагаться на нихъ.

Хорошій и совершенный переломъ:

1) Долженъ быть соразмѣренъ силамъ больного: неумѣренный ослабляетъ его, а слишкомъ легкій служитъ опаснымъ признакомъ. Сей послѣдній счищается шаковымъ попому, что онъ показываетъ либо недоспапокъ жизненныхъ силъ къ рѣшильнымъ испражненіямъ, либо усиление къ переносу успремляющеся на другіе важные органы, а не на обыкновенные пупы, коими совершаются переломы. Такъ напримѣръ: если спраждущій горячкою при всѣхъ признакахъ, означающихъ переломъ, чрезъ кровоотечениѣ изъ носа будеТЬ извергать токмо нѣсколько капель крови изъ онаго: то сіе означаетъ, что упомянутое усиленіе успремляется на мозгъ, и слѣдовательно большой легко можетъ умереть отъ прострѣла.

2) Долженъ соотвѣтствовать роду и свойству горячки, т. н. въ воспалительныхъ горячкахъ переломъ наиболѣе совершается попомъ, мочею и кровоотече-

ніями, въ желудочныхъ горячкахъ поносъ, рвотою и пр. д. Впрочемъ при описаніи каждой горячки порознь будешь говорено и о свойственныхъ ей переломахъ.

3) Долженъ оказываться въ шакомъ мѣстѣ, которое способно къ шому; въ противномъ случаѣ можешь или ослабить больного, или породишь другую опаснѣйшую болѣзнь, т. н. если переломъ обнаружится кровопечениемъ изъ легкихъ, то можетъ споль сильно ослабить онъя, чѣмъ о宕ъ этого произойдетъ болѣзнь гораздо опаснѣйшая, нежели самая горячка.

4) Совершенный переломъ долженъ неизменно произвести облегченіе или уменіе болѣзни, т. е. жестокость горячки, число и сила сопровождающихъ ону припадковъ по окончаніи перелома, если не вдругъ и не всѣ должны исчезнуть, то по крайней мѣрѣ имѣть послабленіе.

Должно замѣтить еще, чѣмъ въ прошлыхъ горячкахъ переломъ бываетъ гораздо совереннѣе, нежели въ сложныхъ, т. е. сопряженныхъ съ мѣстнымъ спраданіемъ какого либо органа, напр. съ воспаленіемъ легкихъ и пр. Сіи послѣднія склонны болѣе къ переходамъ въ другія болѣзни, изъ коихъ главнѣйшія суть опровергніе, нагноеніе, антоновъ огонь, и проч.

1) *Отвердѣніе* рождающейся болѣе въ же-

лудочныхъ, желчныхъ и гнильыхъ горячкахъ, особенно сопровождаемыхъ мѣстнымъ воспаленіемъ.

2) *Нагноеніе* большею частію случается въ молодомъ возрастѣ, у полнокровныхъ, сингвинического шемпераменса людей, въ воспалительныхъ горячкахъ, наипаче съ воспаленіемъ легкихъ.

3) *Вѣ антоновѣ огонь* переходяще преимущественно гнилья, нервныя горячки и другія различныя болѣзни, видъ ихъ воспринимающія.

Смерть во всѣхъ огневицахъ приключается или отъ задушенія, или отъ антитона огня, или отъ посирѣла.

Теперь приспушимъ еще къ пѣмъ признакамъ, по коимъ можно изъ настоящаго состоянія больнаго предполагать о будущемъ, и. е. предсказывать.

1) Будетъ ли счастливой или несчастливой исходъ горячки.

2) Время, когда, и

3) Образъ, какимъ онъ окажется.

Изъ сего явствуетъ, сколь важно и нужно знать вѣрнѣйшіе признаки, сославляющіе основаніе предсказанія болѣзни.

Въ огневицахъ

Предсказаніе.

§ 5.

Основывающееся вообще на слѣдующихъ обстоятельствахъ и явленіяхъ:

Молодые, здоровые, крѣпкаго сложенія люди удобно переносятъ огневицы; напрощивъ шого для худосочныхъ (цынготныхъ, золотушныхъ и проч.), испошенныхъ различными недугами, старостію и др. причинами людей, беременныхъ женщинъ, кормилицъ, чрезвычайно раздражительныхъ и чувствительныхъ, ведущихъ сидачую жизнь особъ, малолѣтнихъ дѣшей и пр. онъ всегда бывающій опасны.

Чѣмъ болѣе чувствуетъ больной свою болѣзнь и при томъ переносить ону, какъ должно переносить, тѣмъ лучше.

Весьма худо, если онъ не совершенно чувствуетъ ее и переносить гораздо легче и спокойнѣе, нежели какъ бы требовали шого свойство и жестокость сопровождающихъ припадковъ, напримѣръ: сильный палающій жаръ безъ малѣйшаго побужденія къ пипью, соспавляеть самое худое предсказаніе.

Впрочемъ и чрезмѣрное чувствованіе болѣзни не надежно, такъ напр. если больной и малѣйшихъ припадковъ не можетъ переносить терпѣливо, или когда онъ и при слабыхъ припадкахъ вдругъ теряетъ свою бодрость и духъ: первое означаетъ нервное свойство горячки, а послѣднее гнилое свойство онай, или изнеможеніе силь.

Чѣмъ болѣе поведеніе больного отъ прежняго еспесивеннаго состоянія сво-

его опишупаєшъ, шѣмъ хуже предсказаніе, такъ напр. когда своенравные и капризные люди, особливо дѣши, вдругъ сдѣлаюшися скромными и шихими.

Равнымъ образомъ и положеніе паціен-ша, чѣмъ больше уклоняется отъ обыкновеннаго, шѣмъ хуже, т. е. когда больной или перемѣняешъ ежеминутно положеніе свое, какъ случается наипаче при внутреннихъ мѣстныхъ воспаленіяхъ, или всегда къ ногамъ сваливаешься, чѣо еще хуже, или безпреспанно лежишь съ великою скромностю на спинѣ, пропи-гивая руки и ноги, чѣо показываєшъ чрезвычайную слабость шѣла, особливо легкихъ.

Худо, если теплопа въ однѣхъ частяхъ шѣла болѣе, а въ другихъ менѣе. Причиною сего бываешъ великая слабость, неравномѣрное раздѣленіе жизненныхъ силъ и судороги.

Равнымъ образомъ худо, если въ наружныхъ частяхъ холодъ, а во внутрен-нихъ жаръ оказывается. Но пропивуположный случай, т. е. когда во внутрен-нихъ частяхъ холодъ, а въ наружныхъ жаръ примѣчаешься, еще хуже и показы-ваешъ большою частю присущіе ан-титона огня во внутреннихъ частяхъ организма.

Необыкновенная черпа въ лицѣ и внезапная значительная перемѣна онаго безъ доспашочныхъ причинъ, какъ то: силь-

наго испошенија и чрезмѣрныхъ испражненій, всегда предвѣщаюшъ опасносТЬ.

Оспрой и шонкій слухъ есть худой, шупой же напропивъ довольно хороший признакъ.

Весьма худо, если одинъ глазъ менѣе, а другой болѣе.

Сомнительно, когда глаза больного во снѣ бываюшъ полу-открыты или испускаюшъ непроизвольные слезы, либо покрываюшся жиру подобною машеріею.

То же самое показываюшъ капли крови, или пасоки, выпекающей изъ носа безъ послѣдующаго попомъ сильнаго кровопечения изъ онаго.

Скрежешаніе зубами не надежно.

Сильное біеніе шейныхъ аршерій (боевыхъ жиль) есть неблагопріятный признакъ и можетъ предвѣщать или бредъ и судороги, или воспаленіе мозга, исключая, когда за онымъ послѣдуешь обильное кровошеченіе изъ носу.

Продолжительное судорожное сжатіе въ горлѣ, безъ существующаго въ ономъ воспаленія, сомнительно. Весьма опасно, если при глошаніи слышенъ бываешь шумъ, чѣмъ доказываешь присущшіе паралича въ пищепріемномъ каналѣ и желудочномъ отверстіи или входѣ желудка.

Чѣмъ болѣе упруждено дыханіе, чѣмъ большая предстоитъ опасносТЬ.

Шумъ въ груди ничего не предвѣщаешь

хорошаго и бываєшъ двоякаго рода,
и. е.

а) Шумъ въ груди, сходствующій съ
шѣмъ, какъ будто, чѣпо кипишъ въ оной
и сей не сполько опасенъ, какъ

б) Шумъ въ груди, сходствующій съ
прескомъ и сопряженный при шомъ съ
ощущеніемъ чего либо шакого въ оной,
что трудно извергнуши; признакъ сей
большею частію предвѣщаєшъ смерть.

Безпрешанно перемѣняющаяся моча
показываєшъ или смертельное окончаніе
или слишкомъ продолжительное выздо-
ровленіе съ послѣдующею за онимъ хро-
ническою болѣзнию.

Раздушое, напряженное, оказывающее
бienie и при всякомъ легкомъ прикосно-
вении болящее брюхо, предвѣщаєшъ боль-
шую опасность.

Если при раздушомъ и чрезвычайно
напряженномъ брюхѣ вскорѣ извергаєшся
поносомъ или рвотою черная матерія
безъ всякаго облегченія припадковъ: то
изъ сего можно заключиши о накоплениі
гнилоспинныхъ веществъ въ желудкѣ и
кишкахъ.

Непроизвольное и безъ вѣденія боль-
наго происходящее испражненіе мочи и
кала, если оно не было слѣдствиемъ сно-
видѣнія или другой фантазіи, доказы-
ваєшъ присущивіе паралича.

Далѣе принадлежашъ еще къ худымъ
знакамъ: чрезмѣрная слабость и нечи-

спопа языка при началь горячки, пропицурѣчіе и чрезвычайная перемѣнчи-
вость во всѣхъ припадкахъ, безпреспан-
ный бредъ, щупаніе по одѣялу, сонли-
вость, быстрый и спрашный взглядъ,
дрожаніе языка и всѣхъ членовъ, выхож-
деніе мершыхъ глиссовъ, зеленая, чер-
ная безпреспанная рвота, клейкій холод-
ный попъ, упорный запоръ, судороги,
икота, обмороки, сильные кровопеченья
и пр. д.

Причины.

§ 6.

Подъ именемъ причинъ разумѣються
вообще пѣ вещества или вліянія, кои
способствующіе произведенію болѣзни.

Что касается до горячекъ вообще, то
все, что вредно здоровью и производить
болѣзни, при извѣстныхъ обстоятель-
ствахъ можетъ причинить и горячку.
Преимущественно же дѣйствующіе здѣсь:

а) Вредное вліяніе атмосферного воз-
духа, особенно влажный и холодно-влаж-
ный воздухъ, каковой встрѣчаешься все-
гда въ пасмурную осень и зимою, когда
нѣшь морозовъ; также чрезмѣрно жаркий
воздухъ или напитанный испареніями
тиущихъ расщепій и живописныхъ, како-
вой находишься въ лѣпнине время въ жар-
кихъ спранахъ и близъ болотистыхъ
местъ.

Часть I.

2



б) Неумъренно и безъ привычки употребленная очень пищательная, прудно перевариваемая и вообще нездоровая пища и питье.

с) Восприятие и всасывание шѣломъ ино-родныхъ зловредныхъ веществъ, каковы суть яды, прилипчивости, сообщаемыя либо посредствомъ воздуха, либо чрезъ прикосновеніе здороваго шѣла къ спра-жущему заразительной болѣзнію.

д) Насильственное, механическими вліяніями причиненное поврежденіе какой либо части шѣла, какъ то: раны, сильные ушибы, вывихи, переломы костей, ожоги и т. д.

е) Нарушенное или совсѣмъ пріостановленное испражненіе кишечнаго канала (упорный запоръ на низъ), кожи и легкихъ (проспуда), мочеваго пузыря (за-держаніе мочи).

ф) Всякое непомѣрное движение и напряженіе, какъ шѣлесныхъ, шакъ и душевыхъ силъ, слѣдовашельно сильное бѣганіе прошивъ пронзительного Восточно-Сѣвернаго вѣтра; долговременное умственное занятіе, продолжаемое не сколько дней и непрерываемое ночнымъ успокое-ніемъ; сильный спрасши, какъ то: гиѣвъ, испугъ, неожиданная величайшая радость и т. д.

Спосовъ лѣченія.

§ 7.

Не смотря на многоразличные роды горячекъ, и несходство ихъ между собою, можно однокожъ, соображаясь съ общимъ ихъ характеромъ, наблюдать по крайней мѣрѣ некоторые общія правила при лѣченіи всѣхъ вообще огневицъ, именно:

§ 8.

I. Вѣ разсужденіи пищи:

Въ горячкахъ больные обыкновенно не имѣющъ позыва на пищу и не должны ъсть, поелику пища въ шакомъ случаѣ не ихъ, а болѣзнь пишаетъ. Впрочемъ, если они имѣютъ настойчивѣй аппетитъ, то должно давать имъ пищу, но такмо въ маломъ количествѣ и при выборѣ ея, равно какъ и при приготовленіи надлежиша всегда на то обращать вниманіе, чтобы она

- 1) Не имѣла наклонности къ гниению.
- 2) Не причиняла бы задержанія въ испражненіи на низъ.
- 3) Не производила бы вѣлпровъ въ кишкахъ.
- 4) Не была бы очень питательна или сама по себѣ или чрезъ приготовленіе шаковою сдѣланная.

- 5) Не шрудно варимая для желудка.
- 6) Не была бы итверда и суха, но болѣе мягкая или жидкая.
- 7) Не имѣла бы горячипельныхъ, но болѣе прохладипельные свойства.

Слѣдующаго рода пищу можно принять за болѣе или менѣе полезную во всѣхъ горячкахъ:

а) Безъ прибавленія пряностей приготавляемое варенье изъ свѣжихъ плодовъ, какъ-шо: земляники, смородины, вишнѣ, ежевики, малины и проч.

б) Зрѣлыя огородныя овощи и прозябенія, лишенныя чрезъ вареніе или чрезъ другое приготавленіе производящихъ вѣши свойствъ, и изъ сихъ наиболѣе заслуживающъ одобреніе: морковь, свекла, салатъ, пурпурнѣкъ, шпинатъ, кервель, красная капуста съ уксусомъ, соленые или съ уксусомъ приготавляемые огурцы, очищенные отъ виѣшней кожицы, щавель, кислая бѣлая капуста и проч.

с) Слизистые, съ лимоннымъ сокомъ приготавляемые ошвары изъ саго, сарачинскаго пшена, ячной и овсяной очищенной крупы; похлебки изъ шравъ и корней, жидкая, съ весьма малымъ количествомъ не жирнаго мяса вареные щи и т. п.

Принимать пищу больному лучше всего во время послабленія горячки, что большую часцю бываешь по утру и въ-полдень. Онъ долженъ сполько кушать,

сколько апешишъ его позволяетъ, пришомъ медленно и хорошо пережевывать.

Иногда спраждущій горячкою имѣетъ особенный позывъ къ какой нибудь пищѣ. Позывъ шаковой вообще есть хороший признакъ — и весьма многіе, у коихъ оказывался онъ, благополучно выздоравливали. Если желаемая пища по выше означеннымъ правиламъ окажется безвредною, то можно охопшно позволить оную; буде же напрощивъ, то должно смотрѣть:

1) Продолжительное ли и сильное ли побужденіе у больного къ оной.

2) Въ какое время болѣзни оказывается оно? При выздоровлѣніи оно не споль важно, какъ въ первомъ періодѣ болѣзни, гдѣ вообще не бываешь апешита.

3) Нужно смотрѣть также на привычку больного, по причинѣ коей пища и питье бываюшь иногда безвредны и даже полезны (*).

(*) Одному преданному пьянству человѣку, получившему сопряженный переломъ кости, пользующіе его врачи запрещили пить водку; въ ранѣ, сопровождавшей переломъ, сдѣлался антоновъ огонь и пропивувоспалительная діапа назначена была еще спироже; однако болѣзнь приходила все въ худшее состояніе. Онъ началъ скрышно пить водку и антоновъ огонь уничтожился.

Рейль.

4) Наконецъ должно давать требуемой пищи сначала скромно малое количества и замѣтить ея дѣйствіе.

§ 9.

II. Въ разсужденіи питья.

Температура питья должна быть сообразна свойству и роду горячки, также особенному состоянію и привычкѣ больнаго; но вообще холодноватые напитки предпочтительны шеплымъ.

Что касается до количества онаго, то вообще больной, одержанный горячкою, долженъ пить часто, но скромно разомъ по немногу, и пѣмъ чаще и болѣе, чѣмъ сильнѣе у него жажда.

О качествѣ питья можно сказать что же самое, что и о выборѣ пищи упомянуто было. Сверхъ того въ горячкахъ заслуживающіе преимущество слѣдующіе кисловатые и слизистые напитки:

1) *Ячменное питье*, которое приготавляется слѣдующимъ образомъ: 6 или 8 лоповъ чистаго ячменя увариваются съ двумя булыжками воды до тѣхъ поръ, пока зерна довольно разбухнутъ, попомъ опваръ процѣживается чрезъ холстину и къ процѣженому прибавляется еще опъ 4 до 5 лоповъ уксусо-меда, т. е. смѣси, сославляемой, какъ показано подъ № 1. См. лѣкар. сосставы.

2) *Отваръ перловыхъ крупъ.* Къ получению оного надлежишъ 4 лопа перловыхъ крупъ варить въ продолженіи чеширти часа съ премя бушылками воды, попомъ процѣдитъ, выжать въ онай сокъ изъ цѣлыхъ двухъ лимоновъ и прибавить одинъ лопъ сахару или меду. Для большей пріятности вкуса можно примѣшивать къ оному еще 6 лоповъ малиноваго соку.

3) *Кремортарная вода.* На сей конецъ должно варить при золотника кремортарпару (чиспаго виннаго камня) съ одною бушылкою воды до тѣхъ поръ, пока въ онай ни мало непримѣтно будеть порошка сей соли, попомъ выжать въ оную сокъ изъ цѣлаго лимона и прибавить 5 или 6 золотниковъ сахару, либо и болѣе, смотря по желанію.

4) *Жидкое миндальное молоко.* Сие приготвляется слѣдующимъ образомъ: взявши свѣжихъ сладкихъ миндалей, положишь ихъ въ горячую воду, пока покрывающая кожца размѣгчишася; послѣ того должно ихъ вынуть, очистить, расположь въ каменной спупкѣ, и прибавляя по немногу обыкновенной воды, перешь дополь, пока произойдетъ жидкое молоко, которое попомъ нужно процѣдить сквозь холстинку и для пріятности вкуса прибавить сахару.

Молоко сие скорѣе можно получить, растворяя ложку хорошаго приготвлен-

наго миндального сырода въ спаканъ воды.

5) Клюквенный сокъ. Для сего берутъ фунтъ клюквы, выжимаютъ ее въ одну кваршу воды, прибавляютъ чешверть фунта сахару, мѣшая до шѣхъ поръ, пока онъ совершенно растворится, пошомъ процѣживаютъ чрезъ цѣдильный мѣшечекъ и держашь въ прохладномъ мѣстѣ. Приготовленный такимъ образомъ сокъ прибавляютъ къ водѣ, коштрую долженъ пить больной сполько, сколько по потребно для пріяпности вкуса.

Симъ же самымъ образомъ соспавляешься и употребляешься сокъ изъ брусники, смородины, и земляники, шокмо къ послѣднимъ, двумъ для большей кислоты, можно примѣшивашъ уксусъ.

6) Молотная сыворотка. Особливо приготавляемая слѣдующимъ образомъ: взяши две бушылки хороаго свѣжаго молока, поспавиши на огонь, и когда оно начнешъ закипашъ, то прибавиши къ оному большую споловую ложку креморпаршару или лимоннаго соку, помѣшивая деревянною ложкою до шѣхъ поръ, пока оно совершенно спворожится. Пошомъ сняши съ огня и опѣливъ жидкость опъ швогра чрезъ процѣживаніе сквозь тонкую и чистую холстинку, поспавиши ее въ холодное мѣсто на чешверть часа. Послѣ сего сбивши въ пѣну бѣлокъ изъ чепырехъ лицъ, смѣшашъ его съ сыворонкою

и поспавиши опять на огонь шакъ, чтобы оно покипѣло еще четыре или пять минутъ. Наконецъ просушивши ее впрочемъ, нужно процѣдить сквозь волосяное сито и пропускную бумагу, и шакимъ образомъ получится чистая, имѣющая прозрачность лучшей ключевой воды, сыворотка. Къ ней можно также прибавлять медъ и другія приличныя вещества.

7) *Пахтанье*, впрочемъ свѣжее и ни мало не содержащее въ себѣ жиру.

8) *Наконецъ обыкновенная тистая вода*. Сія однако жъ не всегда и не во всякое время года, равно какъ и не во всѣхъ мѣсяцахъ находящаяся чистою и къ питью способною. По сей причинѣ здѣсь предлагается способъ, по которому можно весьма легко и безъ всякихъ издержекъ не чистую, или совершенно гнилую воду сдѣлать чистою и для питья способною.

Къ шаковому намѣренію берется сосудъ, заключающій въ себѣ мѣру пол-ведра или ведро и болѣе, и наполняется до двухъ прешей водою, которую нужно очистить; попомъ всыпается въ онъ, смотря по количеству воды, 4, 8, 12, 16 и болѣе лопатъ хорошо сожженныхъ и попачась попомъ въ порошокъ превращенныхъ углей; послѣ закупоривъ плотно сосудъ, надлежитъ крѣпко пряспи онъ, какъ обыкновенно поспупаютъ при очищеніи. Между тѣмъ должно

испытывать, много ли вода поперяла уже худаго своего запаха; въ пропивномъ случаѣ можно еще прибавить нѣсколько углянаго порошка. Наконецъ смѣсь сія процѣживается чрезъ холстяную, внутри пропускною бумагою, выложенную воронкообразно свернувшую трубку, и такимъ образомъ маловажный трудъ вознаградился весьма чищою здравою водою.

При недосшапкѣ угля, употребленный уже одинъ разъ порошокъ сей можетъ еще служить къ шаковому намѣренію, споишь шокмо высушить его надлежащимъ образомъ и, пошомъ въ открытихъ, на горячій песокъ положенныхъ, спеклянныхъ сосудахъ, впорично накаливать. Впрочемъ, если упомянутые угли очень не чисты, то операциѣ шаковая болѣе часцію бываешь неудачна, и пошому лучше въ семъ случаѣ накаливать ихъ въ плавильномъ горшкѣ, хотя ошь сего и произойдетъ значительная поперя оныхъ.

§ 10.

III. Въ разсужденіи воздуха.

Температура и чистота воздуха со-
ставляютъ необходимѣйшія условія при
лѣченіи горячекъ. По сему, болѣе всего
надлежитъ спарашиться, чтобы первая
определаема была:

1) *По тъствованію и привыткѣ больнаго.*
 2) *По свойству огневицѣ.* Горячки, сопровождаемыя сильною дѣятельностію (спеническія) и большимъ жаромъ, требуютъ прохладной температуры воздуха; напропивъ штого горячки, оказывающіяся слабымъ жаромъ, для поддержанія дѣятельности тѣла требующіе болѣе теплоты.

3) *По времени огневицѣ.* Въ началѣ огневицѣ вообще нуженъ прохладный воздухъ, а послѣ перелома теплый, поелику въ сіе время теплопла въ тѣлѣ менѣе бываетъ.

4) *По термометру.* Температура воздуха въ комнатѣ больнаго, рѣдко должна превышать 16 и 17 градусовъ по Реомюру, или 60 и 65 по Фаренгейту.

Зимою избирается комната для больнаго къ Югу, нагревающаяся при умѣренномъ холода посредствомъ камина, а при сильномъ посредствомъ печки и пришомъ лучше всего дровами.

Лѣтомъ комнату шаковую должно опровергнуть къ Сѣверу и Востоку, въ низкихъ прохладныхъ теплищахъ мѣстахъ, спавши въ оной сверхъ штого сосуды съ водою или льдомъ, который при плаваніи и испареніи своемъ поглощаетъ нарочитое количество теплоты.

Вообще нужно наблюдать, чтобы воздухъ былъ болѣе сухой, нежели влажный. При мокрой погодѣ и во влажныхъ

спранахъ болѣй долженъ жиць въ верхніхъ покояхъ. Въ сухихъ, песчаныхъ спранахъ, при сухой и жаркой погодѣ, въ горячкахъ, соединенныхъ съ жаромъ, сухостю и напряженіемъ, нужно овла-жашь воздухъ, окропляшь полъ въ ком-натѣ водою, спавшишь въ оной сосуды съ водою; днемъ прошиву солица выспав-ляшь на окошкѣ большія листистыя вѣшви изъ вербы, липы, березы и проч. въ сосудахъ наполненныхъ водою. Вѣшви сіи дѣлающь шѣнь и прохладу, очища-юшь воздухъ, поглощая неспособныя къ дыханію часпи его и испаряющь здоро-вый водяной паръ.

Чистота воздуха. Пріобрѣшающа ся про-стѣйшимъ образомъ, чрезъ то, если всѣ непопрѣбносни для больнаго шопчасъ при появлениіи ихъ опклонающа, ком-ната не очень шепло напапливающа, осашки опъ пищи, пилъя и неупо-пребишельныхъ лѣкарствъ, безполезные люди, равно какъ и живопнныя, какъ шо: собаки, кошки и проч. удаляюща; вы-сушиваніе бѣлья, гореніе многихъ свѣчъ, куреніе ароматическими порошками и смолами (поелику сіе послѣднее ни мало не очищающь воздуха, а умаляющъ шок-мо дѣйствіе зловонныхъ веществъ на нервы обонянія) воспрещающа; иѣсколько разъ въ день при хорошемъ мѣстополо-женіи и погодѣ отворяюща окна и пр. Впрочемъ, если комната для больнаго

будеши находиши на болотишномъ или близь шакого мѣста, гдѣ всегда освобождаюшся вредныя испаренія, шо сіи способы очищенія воздуха еще недостаточны, и въ шакомъ случаѣ опимънную оказываюшъ пользу уксусные пары. Для сего вскипятивъ сначала перегнанный надлежащимъ образомъ уксусъ, поспавивъ среди комашы, въ открытомъ глиняномъ или спеклянномъ сосудѣ, на разгоряченной до красна желѣзной плишкѣ, и попачась перемѣнявъ плишку, коль скоро пары изъ онаго пріоспановятся. Обыкновеніе же лишь уксусъ на раскаленный камень, должно бысть испреблено: ибо ошъ сего уксусъ совсѣмъ иначе разлагается и производишъ шакіе пары, кои болѣе портишъ воздухъ, нежели очищаюшъ.

Слѣдующія куренія весьма хорошо уничижжаюшъ гнилость въ воздухѣ; но по причинѣ производимаго ими раздраженія въ легкихъ должны бысть употребляемы съ большою осторожностию и токмо при угрожающей заразѣ:

1) *Куреніе солянокислыми парами.* Для произведенія онаго всыпаешся въ чайную чашку споловая ложка обыкновенной поваренной соли; попомъ мало помалу приливаецца къ оной до двухъ лопшовъ купороснаго масла, давая освобождающемуся пару распроспраиняться по ком-

напъ и повшоряя сie нѣсколько разъ въ день.

2) *Куреніе парами пресыщенной соляной кислоты.* На сей конецъ для окуриванія большой комнаты берешся пять лоповъ поваренной соли, одинъ лопъ марганцу въ порошкѣ, два лопа рѣчной воды, и все сie смѣшиваешся въ спекляномъ судѣ, попомъ приливаешся по каплямъ при лоппа купороснаго масла.

При куреніи вообще не должно подходить близко къ освобождающимъ парамъ и къ купоросному маслу не прикасаться ни руками, ни плашьемъ.

§ II.

IV. Вѣ разсужденіи собственнаго содержания больнаго.

Горячкою одержимый больной долженъ наблюдать все возможное спокойствіе душевныхъ и тѣлесныхъ силъ.

Страсти, особливо сильныя и непріятныя, вообще весьма вредны въ горячкахъ; онѣ возбуждаюшъ сильнѣйшимъ образомъ мозгъ и нарушаюшъ ходъ напуры къ цѣлильному дѣйствію.

Надежда есть единственная спаснь, которая по цѣлильности своей должна быть возбуждаема и поддерживаема въ горячкахъ.

Страхъ болѣе всѣхъ способствуетъ

прилипчивости во время повальныхъ и заразительныхъ болѣзней.

Продолжительное повсемѣшное движение тѣла производиши успалосиши, раздражаешъ и ускоряешъ еще болѣе шече-
ніе крови, и попому въ горячкахъ не должно быти производимо.

Бѣда вѣ каретѣ въ горизонтальномъ по-
ложении не вредна. При перевозѣ боль-
ныхъ во время похода замѣчено, что ча-
спо самые опасные больные выздоравли-
вали.

Сонъ бываешъ цѣлишень въ тѣхъ наи-
болѣе горячкахъ, въ коихъ безсонница,
бредъ и судороги обнаруживаються.

При нѣкоторыхъ горячкахъ, соединен-
ныхъ наипаче съ воспаленіемъ горла, слюношеченіемъ и чрезмѣрною сонливо-
стью, надобно иногда воздерживаться отъ
сна.

Положеніе больнаго не должно быти
совершенно горизонтально; ноги его не
должны висѣти внизъ, голова же и грудь
должны всегда имѣти болѣе возвышенное
положеніе.

Постель больнаго должна быти покой-
ная и на шакомъ мѣстѣ поспавленная,
гдѣ ночью свѣчи, а днемъ солнце не
слишкомъ освѣщали бы оную. Подушки
и одѣяло каждый день перемѣняши нуж-
но, выбивая и вывѣшивая ихъ на воз-
духѣ. Лѣтомъ, при сильномъ лихорадоч-
номъ жарѣ, лучше всего больнаго класинь

на шюфякъ. Сіе чрезвычайно уменьшаешъ жаръ, вредъ онаго и спраданія больнаго.

Чистота тѣла больнаго ешь такжे важный пунктъ при лѣченіи горячекъ, по сему надлежишъ а) спарапшъся всегда о чистопѣ бѣлья и плащъя, прильжно перемѣняя оное, особенно бывшее уже на пошномъ тѣлѣ и нагрѣваваѧ его прежде надѣванія. б) Тѣло, если можно, каждый день омывашъ теплою мыльною водою и водкою, все сіе производишъ должно шокмо во время послабленія горячки, т. е. послѣ лихорадочнаго параксизма; равнымъ образомъ и бѣлье перемѣняшъ нужно всегда въ поспели. Еспыли послѣ перемѣны пріоспановишъ попъ и большой почувствиешъ ознобъ, что должно пошеплѣе окушашъся и выпить чашку шеплаго чаю.

§ 12.

V. Вѣ разсужденіи діэты во время выздоровленія.

Выздоравливающій долженъ єсть часпо и разомъ не много, но между всяkimъ упошребленіемъ пищи оспавляишъ сполько времени, сколько пошребно для отдохновенія желудка. Онъ долженъ єсть медленно, хорошо пережевывашъ и опинюдь не обременяишъ желудка.

Сначала надлежишъ упошребляишъ ему просшую легкую и жидкую, не очень

прянную пищу, какъ шо: супы изъ крупы, саго, сарачинскаго пшена, огородныхъ овощей, картофелей, щавеля, моркови, рѣпы, молочную пищу, если онъможешъ переносить ее.

Обыкновенно рекомендуюшь выздоравливающему распищельную пищу. Однакожъ, если онъ очень ослабленъ, часпо зябнешь, спраждешъ кисломпами въ желудкѣ, имѣешъ аппепитъ къ мясной пищѣ и привыкъ къ оной, то можно позволишь ему и сю послѣднюю. Въ шакомъ случаѣ давашь ему мясные похлебки безъ жира изъ цыплятины, шеляшины, говядины, раковъ и проч.; спудень изъ шелячихъ ногъ, которая, кромѣ пишанія, укрепляешь еще желудокъ посредствомъ холода своего; равнымъ образомъ кисель изъ смородины, малины, брусники и пр. Иногда можно употребляешь ему лица въ смятку, свѣжую рыбу, особливо карпы, щуки, семгу и пр.; жаркое изъ шелячьяго, курина го мяса, рябчиковъ и пр.; шелушныхъ плодовъ, какъ шо: орѣховъ и пр., соленаго и копченаго мяса, ушина го, гусина го мяса и свинины избѣгашь онъ долженъ.

Изъ напишковъ позволяешь ему красное и бѣлое вино, чай и кофе безъ молока и не болѣе одной чашки, хорошо выбродившее пиво и проч.

Выздоравливающій можешъ дѣлать сообразныя силамъ его движенія шѣла,ѣздишь верхомъ, въ экипажахъ и ходишь

пъшкомъ; шокмо при семъ никогда не долженъ онъ напрягашь себя до совершенной усшалосши. Лучше всего, если позволяешь время года, производишь движение на свободномъ воздухѣ. Солнечная теплопла и свѣжій воздухъ оказывающъ благотворныя дѣйствія на душевныя и шѣлесныя силы. Однакожъ онъ долженъ остерегаешься холода и влажности, утренняго и вечерняго воздуха, Сѣвернаго и Восточнаго вѣпровъ.

Онъ долженъ спасть много и покойно, кромъ ночи, еще и послѣ спола. При большой слабосши надобно усыпляшь его часто, но на короткое время.

Нужно шакже спарашься о развлечениіи и увеселеніи выздоравливающаго. На сей конецъ можетъ служишь перемѣна компаны, въ которой лежаль онъ и копорая напоминаешь ему прежнія спраданія.

Всѣ ослабляющія вещества, напряженія душевныхъ и шѣлесныхъ силъ, спрасли, ослабляющіе напишки, слабительныя средшива, кровопусканія и любовныя наслажденія, весьма вредны для выздоравливающаго.

Раздѣленіе горячекъ.

§ 13.

Всѣ извѣспныя огневицы, судя по свойству ихъ, можно раздѣлить на при главные рода:

I) На Стенитескія (сильно-дѣйствующія) или такія, кои обнаруживаюся сильными дѣйствіями шѣлесныхъ органовъ, особенно сердца и біющихся жиль, какъ то: скорымъ, полнымъ и швердымъ пульсомъ, большимъ жгучимъ жаромъ, сильною, сухою жаждою и проч., напримѣръ: воспалительная горячка. — Сему роду горячекъ подвергаются здоровые, шрудящіеся всегда на свободномъ воздухѣ и употребляющіе проспную пищу люди.

II) На Астенитескія (слабо-дѣйствующія) горячки или такія, кои оказываются по большою, по малою и медленною, но всегда слабою дѣятельностію органовъ, по есть, по скорымъ и слабымъ, по малымъ и медленнымъ пульсомъ и шаковымъ же дѣйствіемъ всѣхъ оправлений. Сіи горячки иногда соединены бывають съ особеною наклонносію къ разложенію жидкихъ и швердыхъ частей шѣла и пр. Гнилые горячки, либо безъ наклонности къ разложенію живопиной машеріи, но съ явнымъ поврежденіемъ нервовъ и происходящимъ ошь того неправильнымъ обнаруживаніемъ дѣйствія ихъ, какъ то: бредомъ, судорогами и проч. напримѣръ: нервныя горячки. Аспеническія горячки первоначально произраождаются покмо у слабыхъ людей, изнуренныхъ чрезмѣрными шрудами, голодомъ, сидячею въ запертомъ воздухѣ жизнію и проч., а у здоровыхъ крѣпкаго сложе-

нія людей, послѣ сильныхъ спеническихъ болѣзней.

III) На шакія горячки, кои происходять опѣ умноженного или нарушенного дѣйствія въ какихъ либо особенныхъ органахъ тѣла, какъ шо: печени, желудкѣ, кожи, волосныхъ, кровеносныхъ сосудахъ и проч. Сюда принадлежатъ: желтая, желудотная, простудная ревматическая или ломотная горячка, мѣстныя воспаленія, острья накожные сыпи и проч. Всѣ сии роды огневицъ, смотря по сложенію и расположенію больнаго и вредоносныхъ веществъ, могутъ быти шакіе Спеническаго или Аспеническаго свойства.

Изложивши сіе, мы прислупимъ наконецъ къ описанію горячекъ въ особенностяхъ; и соображаясь съ цѣллю сочиненія его, опишемъ такмо слѣдующіе главнѣйшіе роды огневицъ.



I.

ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ГОРЯЧКА (*).

(Стеническая, сильно - действующая горячка.)

§ 14.

Подъ именемъ воспалительной горячки разумѣется то болѣзненное лихорадочное состояніе, которое сопровождается поперемѣннымъ ознобомъ и жаромъ, также умноженнымъ, скрытымъ, шердымъ, сильнымъ и не рѣдко полнымъ жилобиеніемъ.

(*) Хотя вообще горячка сія называется воспалительной, вѣроятно потому, что определенные оной явленія въ большемъ или меньшемъ числѣ, въ числѣ или сложномъ видѣ оказываются при многихъ воспалительныхъ недугахъ; однако здѣсь упоминаемая горячка, какъ особенная порода, будучи принятая сама по себѣ и безсложна, не сопровождается воспаленіемъ. Ещѣли сіе послѣднее находится, то оказывается всегда въ какомъ либо мѣстѣ чувствительно боли, чѣмъ однако не при всякой, такъ называемой воспалительной горячкѣ случается.

Сверхъ сего характерически отличается она чрезъ слѣдующія:

Явленія и родъ теченія.

§ 15.

1) *Предъ наступленіемъ.* Очень часто горячка сія не имѣшь ни какихъ предъшествниковъ, или они бываюшь такъ малозначущи и крашковременны, что наступленіе ея, кажется, почти неожиданно безъ малѣйшей, предшедшей нездоровости случается. Обыкновенно же предвозвѣщающемся оно легкими и скоропроходящими припадками озноба и холода, также успалостю во всемъ шѣлѣ, наипаче особеною пягостью въ головѣ.

2) *Во время наступленія.* Сначала оказывается сильный ознобъ, пошомъ обыкновенно слѣдуещъ продолжительный по всему шѣлу жаръ, который однако при ощупываніи, кажется, не имѣшь такой степени, каковую чувствуешь самъ больной; въ другихъ напротивъ того горячкахъ примѣчаемый нами при осажданіи жаръ не рѣдко производитъ ключее чувство въ перстахъ нашихъ.

Сверхъ этого жилобіеніе дѣлается умноженнымъ, сильнымъ, твердымъ, скорымъ, а иногда и полнымъ, всѣ шѣлесный и душевныя оправленія возвышены и усилены. Въ слѣдствіе чего, оказывается

боль въ головѣ, хребтѣ, глошкѣ, въ вѣкахъ и почки во всѣхъ членахъ, увеличенная живость въ дѣйствіяхъ больного, блестящіе глаза, преимущественно красное, горячее и нѣсколько раздутое лицо, сухой, сребристымъ цвѣтомъ покрытый, а иногда весьма красной языкомъ, пощеря, или по крайней мѣрѣ уменьшеніе обонянія, величайшая жажда съ сильнымъ желаніемъ воды и кислыхъ напитковъ, жаркое выдыханіе, сухая, пергаменішю подобная, кожа, шемнобурая и жгучая моча, сухое и рѣдкое испражненіе низомъ.

У дѣшней и очень вспыльчивыхъ особъ, случаючися иногда подергиванія сухихъ жилъ и небольшія судороги.

Огневичный жаръ при шаковомъ со-
стояніи днемъ находицся въ равной
силѣ, къ вечеру и ночи увеличивающіяся, а
къ ушру нѣсколько уменьшаются.

Все сіе обыкновенно продолжается опѣ
одногого до четырехъ, семи, а не рѣдко и
четырнадцати дней.

3) При достижениіи высокой степени.
Голосъ больного, какъ бы подобно ме-
шаллу, дѣлается звонкимъ, при величай-
шемъ жару и совершенной сухости во
рту; жажда шеряется вовсе, обнаружива-
ющейся кровавый кашель, безпреспанное
бодрствованіе, бредъ, блѣдная моча, въ
наружныхъ частяхъ холода, а во внут-
реннихъ жаръ, появляющаяся и скоро

исчезающая опухоль шейныхъ железъ и наконецъ крапкое и скорое дыханіе.

4) *При чмаленіи горячки* примѣчаемъ мы влажныя, попныя руки, жидкія, желшыя воюючія испражненія низомъ, кровотеченія различнаго вида, особенно кровошеченіе изъ носа, блѣдиную мочу, копорая при томъ покрывающія слизистымъ облачкомъ, мокрый языкъ, не споль сильную жажду и свободное дыханіе.

5) *При перемѣнѣ*, что есть, когда горячка сія перемѣняется всеобщій свой характеръ и воспринимается другой, что есть Аспеническій гнилой или нервный.

Сію перемѣну воспалительной горячки вообще узнатъ можно изъ того, что, или пульсъ дѣлается менѣе, скорѣе и не равномѣрнѣе, или лицо мгновенно перемѣняется, спадаетъ и блѣднѣетъ, или руки и ноги разомъ хладѣютъ начинаются, или дыханіе еще болѣе упруждено и крапчче прежняго, или является совершенно водяниспѣй поносъ съ рѣзью въ животѣ, или обнаруживается холодный клейкій и изнуришельный потъ, или испражненіе низа и мочи непроизвольно происходитъ, или больной получаетъ икоту, подпрыгиваніе сухихъ жилъ, блѣдиную просу и сонную немочь, и наконецъ, когда онъ потеряетъ произвольность всѣхъ своихъ силъ.

Р А С П О З Н А И Е.

§ 16.

Къ опличищельнымъ признакамъ сей горячки принадлежатъ:

1) Что она наступаеитъ всегда вдругъ безъ всякой предшествовавшей нездоровости; напротивъ Аспеническая горячка обнаруживается медленно.

2) Появляетсяъ большею частію зимою въ холодное время, наипаче при Сѣверномъ и Восточномъ вѣтрѣ.

3) Поражаетъ преимущественно сильныхъ, полнокровныхъ и здоровыхъ людей и

4) Что пульсъ при ней всегда бываетъ полной, твердой и ускоренный, кожа сухая и жесткая, языкъ чистъ и сухъ, дѣйствія мышицъ сильныя и всѣ испражненія, какъ шо: кала, мочи и проч. до уменьшенія горячки бывають малоколичественные и сгущенны.

И с х о д ы.

§ 17.

Обыкновеннѣйшіе и большею частію доброкачественные переломы воспалительной горячки, сушь:

1) Потѣ и мота. Смоп. § 4.

2) Кровотеченіе изѣ носа. Смоп. § 4.

Часть I.

4

5) Харкомина. Однако сія всегда должна быть вмѣстѣ съ криптическимъ побоемъ и мочею; въ прошивномъ случаѣ можно заключать, что при имѣющейся воспалительной горячкѣ находящаяся и воспаленіе легкихъ.

Вообще горячка сія рѣдко продолжается болѣе 14 дней, обыкновенно оканчивается уже въ 7 дней.

Впрочемъ при несчастливомъ теченіи оной, исходы ея бывающій, или

a) *Болѣзниенные*, какъ то: воспаленіе груди, либо легкихъ, или легочная чахотка, которую однако еще излѣчить можно, или воспаленіе кишекъ, или воспалительная опухоль шуляшь, или жаба, или нервная горячка, или нарыва, или исходъ бывающій.

b) *Смертельный*, который можетъ послѣдовать частію опь антепова огня легкихъ, или другихъ брюшныхъ внутренностей, частію опь поспрѣла, сонной немочи, задушенія, и т. д.

Предсказание.

§ 18.

Вообще можно сказать, что воспалительная горячка без опасніе всѣхъ прочихъ родовъ огневицъ. Она весьма склонна къ переломамъ и споль же легко допускаетъ вспомоществованіе искусства.

Только преимущественно требуется при семъ скорая помощь, и чтобы больной не имѣлъ никакой болѣзненной, или ослабленной части.

Важнѣйшее предсказаніе основывающееся на дыханіи. Чѣмъ проспѣе воспалительная горячка и чѣмъ менѣе поражаешь какую либо часть тѣла въ особенности, тѣмъ безопаснѣе. И такъ проптивное выходитъ само собою.

Сильнѣйшему бываетъ она зимою и въ началѣ весны, слабѣе лѣтомъ, а еще слабѣе, хотя не попому и безопаснѣе осенью.

Чѣмъ крѣпче сложеніе одержимаго ею больнаго, тѣмъ сильнѣе бываетъ горячка; однакожъ для шаковаго не споль опасна она, какъ для слабѣйшихъ особъ, поелику у послѣднихъ легко переходить она въ упомянутые болѣзненные исходы.

Хороши признаки супъ: разномѣрная теплота въ тѣлѣ больнаго, влажная кожа и языкъ, моча, образующая облачко на четвертый день горячки; — все сіе можетъ предвѣщать хороший переломъ.

Худыя признаки:

- а) Недоспашокъ жажды въ высокой степени горячки.
- б) Голосъ, имѣющій сходство съ звѣнящимъ мешалломъ.
- с) Появленіе кроваваго кашля.

d) Когда больной жалуется на великий жаръ, а при ощупываніи наружныхъ частей его, кажется холодноватымъ.

e) Если боевые жилы на шеѣ распухаютъ, горячка при томъ облегчается, и таковая опухоль скоро опять исчезаетъ.

f) Когда брюхо больного очень раздуто и къ плому же присоединяется сильная колика.

Смертельные признаки супъ:

a) Блѣдная, свѣтлая водяниспая моча въ высокой степени горячки.

b) Частый и водяниспый поносъ, если онъ происходитъ, или прежде перелома, или при высокой степени сей огневицы.

c) Большой попъ въ самомъ началѣ болѣзни.

Признаки близкой и неизбѣжной смерти доказываютъ то:

a) Есмыли пульсъ сдѣлается вдругъ малымъ и мягкимъ.

b) Есмыли руки и ноги хладѣють и дыханіе дѣлается безпрепятственно трудное и кратчайшее.

c) Есмыли выпущенная гдѣ нибудь кровь не сверпывается.

Причины:

§ 19.

Вредные влиянія, производящія сюю болѣзнь, супъ:

а) Особенное состояніе воздуха и климата. Сюда относится продолжительный холода, сухой и суровый воздухъ, особенно при Сѣверномъ или Восточномъ вѣтрѣ, и когда ртупть въ барометрѣ споинь очень высоко.

б) Родъ жизни: чѣмъ болѣе человѣкъ занимается тѣлеснымъ движениемъ, напаче въ свободномъ воздухѣ и при упомянутомъ онаго качествѣ, чѣмъ удобнѣе можетъ вспастъ въ воспалительную горячку.

с) Возрастъ. Люди отъ 18 до 40 лѣтъ наиболѣе подвергаются сей болѣзни.

д) Сильныя душевныя возмущенія, какого бы онъ рода ни были.

е) Задержаніе обыкновенныхъ кровотечений, какъ шо: почечуя, кровоизлияний изъ носа, мясичныхъ кровоочищеній и т. д.

ф) Диэта, особенно, когда больной предаетъ большому излишеспту въ очень питательной пищѣ и спиртныхъ напиткахъ.

Лѣченіе.

§ 20.

При лѣченіи сей горячки необходимо соблюдать слѣдующую диэту и употреблять ниже означенныя домашнія средства:

I) Діэта. Къ сему намѣренію потребно:

a) Спокойшивіе шѣлесныхъ и душевныхъ силь; посему удаленіе всякаго шума, многочисленныхъ собраній и возможное уменьшеніе беспокойныхъ при служниковъ непремѣнно нужно.

b) Темноща комнапы.

c) Горизонтальное положеніе шѣла, однако шакъ, чтобы голова и грудь нѣсколько выше лежали; также очень полезно сидѣть больному прямо и временно бывшъ безъ поспели.

d) Воздержаніе опь всякой периной поспели; лучше шюфякъ съ прослеганнымъ или перстянымъ одѣяломъ.

e) Избѣжаніе всѣхъ случаевъ къ пропасть.

f) Чистый и прохладный, но не холодный воздухъ. Таковыми можно его сдѣлать, ешьши въ ясную погоду при зашворенныхъ дверяхъ и опущенной занавѣсѣ надъ окошкомъ, опирориши на день одну окончину, орошать комнату уксусомъ, и спавшишъ гдѣ нибудь въ оной съ обширною поверхносцию сосудъ, наполненный чистою холодною и часпо перемѣняемою водою.

g) Воздержаніе опь пищи, преимущественно пищательной, равно какъ и опь спиртныхъ напитковъ всякаго рода. Приспойнѣйши въ семъ случаѣ супъ жидкие, прохладительные кисловатые напитки и распительная пища, упо-

пребляемая болѣе въ жидкому, нежели пивердомъ видѣ. Сверхъ того слѣдующія:

II) *Домашнія средства* съ преимущественною пользою могутъ бытъ употребляемы. Подъ назаніемъ же домашнихъ средстѣ разумѣються здѣсь шѣшько вещества, кои находятся во всякомъ домѣ или хозяйствѣ и при болѣзняхъ могутъ служитъ къ врачебному употребленію. Таковыя суть:

1) Квасъ, кислые щи, клюква, или Кисловодскія Кавказскія воды, обыкновенная вода, пахшанье, сыворотка, съ виннымъ камнемъ приговленная, (§ 9 подъ № 6), ячменное питье (§ 9), лимонной сокъ вмѣстѣ съ нацишками, или лимонадъ.

Принимая большее количества сихъ нацишковъ, можно скорѣе и удобнѣе достигнуть своей цѣли.

Между шѣмъ не должно пить ихъ холодными, но болѣе тепловатыми, равнымъ образомъ въ началѣ горячки въ маломъ количествѣ, а пошомъ всегда побольше принимать ихъ должно.

2) Употреблять временемъ лимонные кружки, сахаромъ посыпанные, вареную и приправленную овощь, печеныя яблоки съ сахаромъ, поджаренный хлѣбъ, съ изюмомъ вареная хлѣбная похлебки; сверхъ этого соспавъ, подъ № 3 означенный.

3) Полоскать почаще ротъ смѣсью, состоящею изъ воды, уксуса и меда,

или опваромъ смоквъ въ ячменной водѣ.
Смоп. Лѣкарст. сосп. № 2.

Нѣкоторыя особенные замѣтнія:

А. Частое купаніе рукъ и ногъ въ теплой водѣ больному шакого рода, очень много подаєшъ облегченія. Важно и полезно купаніе ногъ въ шаковой водѣ при сильномъ прилишіи крови въ головѣ.

В. При появленіи предвѣстниковъ какого либо изъ вышеупомянутыхъ переломовъ, надлежитъ поспушать съ больнымъ очень осторожно и беречь его отъ всего, чѣмъ можешь помѣщашь перелому, особенно отъ проспуды, душевныхъ беспокойствъ и погрѣшиостей въ дѣлѣ.

С. Когда горячка имѣетъ наклонность къ криническому пошту, что можно узнать изъ предвѣстниковъ онаго (смоп. § 4), то спраждущій долженъ содержать себя въ теплой шемперашурѣ, и въ сіе время употреблять болѣе вышесказанныхъ напишковъ.

Если уже попѣтъ дѣйствительно выспутиль и пришомъ примѣчаешся нѣкоторое послабленіе горячки: то нужно пить почаше, но по немногу бузиннаго, или ромашковаго чаю.

Д. Между шѣмъ шаковый попѣтъ иногда чрезмѣрно усиливается и большой шепляетъ чрезъ сіе очень много своихъ сковъ.

Въ семъ случаѣ весьма полезно употреблять шалфейный чай, впрочемъ бо-

лѣе холодновашый, нежели теплый, принимая при или четыре раза въ день опь одной до двухъ чашекъ.

Буде шаковой чай окажется недоспаннымъ къ шому, что можно на четыре лопа шалфея наливашь бузылку спараго ренского вина; спавиши все сіе днія на два въ теплое мѣсто, почаше мѣшать, попомъ процѣдипъ чрезъ хол спинку и давашь больному по ушру, послѣ обѣда и въ вечеру по полчашкѣ.

Е. Еспыли примѣчається какой нибудь предвѣсникъ рѣшишельного кровопеченья изъ носа, безъ скораго появленія онаго, что въ семъ случаѣ впускающемся въ носъ спрѣждущаго теплые пары посредствомъ губки.

Когда же кровопеченье изъ носа оказывается надлежащимъ образомъ, и. е. ни очень сильно, ни очень часто, тогда препятствовать ходу напуры не должно.

Но при сильномъ и долгопродолжительномъ кровопеченьи дѣлаются холодные примочки на лбу и на запылкѣ изъ виннаго уксуса и воды. Особенное дѣйствіе оказываютъ шаковыя примочки тогда, еспыли продолговатая хол спинка, шириной въ два пальца, обмоченная виннымъ уксусомъ и водою опь впадины, находящейся сзади и снизу лѣваго уха, поперечно надъ запылкомъ до шаковой же впадины праваго уха, прикладывается.

Межу шѣмъ, почишая иногда необыкновенно сильное, или долго продолжающееся кровошеченіе изъ носа, за вредное и опасное, можно легко предпринять употребленіе выше предложенныхъ холодныхъ изъ уксуса примочекъ, и чрезъ то самое умершвишь больнаго. По сей причинѣ, кровошеченіе изъ носа можно тогда только остановливашь, когда поель онаго не послѣдуешь ни облегченія больному, ни послабленія горячки, и при шомъ, еспыли больной чувствуешь, что дыханіе его дѣлаешся пруднѣе, обнаруживаешся препешаніе сердца, мракъ предъ глазами, звонъ въ ушахъ, блѣдный цвѣтъ лица, и наконецъ, когда пульсъ перемѣняется въ слабый, малый и перемѣжающійся.

F. Поелику кровопусканіе въ нѣкоторомъ отношеніи можетъ быти признано за домашнее средство, что для предоспѣреженія отъ нѣкоторыхъ случающихся при семъ вредныхъ погрѣшиносстей, нужно предложить здѣсь слѣдующія замѣчанія:

Еспыли при воспалительной горячкѣ нужно кровопусканіе (что узнатъ можно изъ жестокоспии и степени оной), то надлежитъ тошнить и смѣло открывать кровь; не доводя впрочемъ чрезъ то до обморока, но коль скоро жилобиение сдѣлаешся мягкимъ и примѣшно будеТЬ нѣкоторое послабленіе припадковъ

шо вдругъ прекращишъ должно ищечеи
крови.

Иногда же случается, что послѣ кровопусканія, припадки не только не прекращаються, но еще усиливаются.

Въ семъ случаѣ должно повториши оное съ такимъ условиемъ:

а) Когда послѣ первого кровопусканія припадки не споль уже злокачественны, какъ прежде были, однакожъ еще сильны, шо менѣе пущающейся крови, нежели за первымъ разомъ.

б) Есшьли же они хуже, нежели прежде были, шо болѣе пусшиши должно.

с) Будушъли еще хуже, шогда еще болѣе; однако при семъ нужно наблюдать большую осторожность и умеренность, въ прошивномъ случаѣ можно подвергнуть величайшей опасности, или здоровье больнаго, или даже саму его жизнь. Способѣйшее и наилучшее время къ кровопусканію, сушь шри первые дни воспалительной горячки, а позже сего должно уже болѣе остерегаться.

Тамъ, гдѣ кровопусканіе сдѣлашь прудно, напримѣръ: у дѣтей, или при великому спремлении крови къ головѣ, можно приспавлять піявки къ шеѣ и рукамъ или кровососные рожки и проч.

Опыты многихъ новѣйшихъ врачей доказали оптимальную пользу наружнаго употребленія холодной воды въ сей и въ другихъ огневицахъ. Лучшее и выгод-

и́йшее время, въ которое можно окроплять и обливать больного холодною водою, еспь то, когда ожеспоченіе горячки находится въ высшей степени или въ самомъ началѣ послабленія; при чемъ однажъ необходимо нужно соблюдать слѣдующія предоспорожности: 1) чтобы больной не чувствовалъ ни малѣйшаго внушрення озноба; 2) жаръ въ шѣль былъ бы ощущителенъ; 3) чтобы больной не былъ въ пошу или уже долгое время попѣль, — въ семъ случаѣ гораздо лучше подвергнуть его вольному воздуху. По употреблениіи холодной воды съ шакою предоспорожностію, послѣдуешь благопврная испарина, ободреніе и покойной сонъ. Чѣмъ жгучѣе жаръ, тѣмъ холоднѣе должна быть вода и напропивъ, 4) чѣмъ ранѣе употребляется она, тѣмъ лучше; 5) особенно полезна она въ горячкахъ, произшедшихъ отъ заразы; б) вредна же при мѣсячныхъ воспаленіяхъ, воспаленіи легкихъ, напужномъ (кровавомъ) поносѣ и пр. и при онѣмѣломъ (безчувственномъ) свойствѣ болѣзни. Слѣдствіемъ шаковаго употреблениія оной всегда было скорое облегченіе пягостныхъ припадковъ и сюорое выздоровленіе.

П.

АСТЕНИЧЕСКАЯ ГОРЯЧКА.

(Слабодѣйствующая горячка).

А. Гнилая горячка.

§ 21.

Подъ именемъ гнилой горячки разумѣвшаяся ша непрерывная или послабляющая горячка, при которой всѣ жидкія и твердые части тѣла, или клонящаяся къ ихъ разрѣшенію, или дѣйствицельно уже въ ономъ находящаяся.

Если причина сей горячки не зависитъ отъ пронзительной пагубной заразы, то горячка сія имѣетъ слѣдующія:

Явленія и родъ теченія.

§ 22.

1) *Предъ наступленiemъ.* За нѣсколько времени еще до наступленія сей горячки обнаруживается недоспашокъ позыва на пищу, гнилой вкусъ во рту и гнилой за-

пахъ вокругъ больнаго, пягостъ въ членахъ, беспокойный сонъ съ непріятными сновидѣніями, боли въ поясницѣ, ногахъ и рукахъ и пусшоша въ головѣ.

2) *Во время настулленія.* Сначала оказывается сильный ознобъ, послѣ кошораго бываешь сперва умѣренный, но не равномѣрный по всему тѣлу жаръ, сообщающій приложенной рукѣ здороваго человѣка жженіе. Вскорѣ за симъ появляется дрожаніе рукъ и ногъ, головокруженіе, неспособность къ движенію, малодушіе и равнодушіе, или совершенное отвращеніе опять пищи.

3) *Во время совершеннаго развитія соратки,* оказывается оглушеніе чувствъ, давящая боль въ головѣ, особенно на основаніи черепа, помѣщашельство въ чувственныхъ и бредѣ. Жилобіеніе бываешь малое, мягкое, волнисшое и часное. Жажда не очень велика, часпо однажды бываешь неуполимая. Языкъ сначала бѣлый, пошомъ дѣлаешься синеватымъ, сухимъ, темнокраснымъ, бурымъ, чернымъ, пошрескавшимся, иногда же влажнымъ и весьма нечистымъ. Глаза, губы, зубы и вся полость рта, покрываются шелстою нечистою корою. Въ горлѣ ощущаешься сухость и жженіе; глопаніе бываешь шрудное, голосъ пихъ и не вняшень, а иногда совершенно перлеши. Дыханіе и испаренія больнаго имѣютъ дурной, гнилой, шрудной запахъ. Моча

мушина, гусша, шеколадного, или шемно-красного, бураго, черного цвѣта, съ сѣрымъ опсыдомъ и вонюча. Испражненія низомъ сперва прекращающіяся, пошомъ непроизвольно извергаються въ видѣ черныхъ кровяныхъ, гноеподобныхъ, весьма вонючихъ жидкостей. Животъ сначала бываєтъ мягкъ, пошомъ раздувающійся съ сильнымъ ворчаніемъ и шумомъ. Изъ различныхъ мѣстъ, какъ то: изъ носу, глазъ, десень, задняго прохода, дышородныхъ частей и засшарълыхъ язвъ выпекающій жидкая разрѣщенная кровь. На седьмой, рѣдко одинакожъ на пятнадцатый день появляющійся на губахъ, груди, внутренней сторонѣ рукъ и бедеръ, за ушами и на вѣкахъ малыя, плоскія блѣдныя, розовыя, пурпуровые, черноватыя или свинцоваго цвѣта пятна, иногда же большія полосы и подкожные кровоизлѣянія, смѣшанные съ малыми пятнами; либо кожа получаетъ мраморный видъ. Съ сими спраданіями иногда соединена бывающій молочница во рту, распространяющаяся мало по малу на пищеварительное горло, желудокъ и кишкі.

Распознаваніе.

§ 23.

По вышеописаннымъ явленіямъ весьма несложно определить гнилую горячку

опъ прочихъ родовъ. Разрѣшеніе и наклонность къ гнѣнію жидкіхъ и твердыхъ частей тѣла, обнаруживающіеся чрезмѣрнымъ упадкомъ силъ, шупоспію чувствъ, смраднымъ, мерцвичиннымъ запахомъ опъ болыаго, а наипаче испражненіи его, изнуришельными кровошечніями изъ разныхъ даже необыкновенныхъ пушей, удобно опличающіе гнилую горячку опъ всѣхъ прочихъ.

И с х о д ы.

§ 24.

Продолженіе гнилой горячки вообще проспирается до двадцати одного дня.

Рѣшается она обыкновенно попомъ и мочею, рѣдко поносомъ, слюнопечениемъ, высыпаніемъ на тѣло просо-образной сыпи и опухолью шейныхъ железъ.

Однакожъ оказывающіеся даже попомъ и мочею переломъ рѣдко можетъ быть совершеннымъ, и попому горячка принимаетъ различные другіе исходы, каковы сушь, или:

а) Болѣзненные, именно: глухота, шупоспія чувствъ, помѣшательство ума, потеря памяти, параличное состояніе цѣлыхъ членовъ, всеобщіе судорожные припадки, исперика и гипохондрія, гнойные нарывы, кровавые вереды, антноновъ огонь въ наружныхъ частяхъ, чахотка легкихъ, продолжительный поносъ; или

б) Смертельный, послѣднимъ опь неудержимаго разрѣшенія всѣхъ соковъ шѣла, или опь помертвѣнія, наипаче какой либо внутренности, или опь поспрѣла.

Предсказаніе.

§ 25.

Предсказаніе основывається преимущественно на состояніи силъ больнаго.

а) Чѣмъ больше примѣчаешься признаковъ недоспашка силъ, и чѣмъ ранѣе они появляются и умножаются, тѣмъ хуже предсказаніе.

б) Чѣмъ скорѣе оживляющія средства восстанавливающъ и укрѣпляющъ угнетенные силы страждущаго, тѣмъ счастливѣе предсказаніе, и напропивъ

Весьма многошакже зависитъ и опь другихъ обстоятельствъ больнаго, именно, ешьли напримѣръ: гнилая горячка развивается уже въ нѣсколько, или въ совершенно болѣномъ субъектѣ, то гораздо опаснѣйшее бываешь, нежели какъ здоровое состояніе оною поражено будешъ. Вообще та гнилая горячка, которая изъ другой болѣзни образуешься, всегда опаснѣе, нежели чистая и первоначальная, какова описывается здѣсь.

Не мало зависитъ здѣсь и опь того, можешь ли бысть выполняемо все къ лѣ-

ченію болѣзни неоходимое, какъ то: чистопла, свѣжій воздухъ въ комнатѣ, короче сказашь, всѣ попребности къ шому.

Худо, ешшили глаза больнаго воспаляются: онъ безпрерывно бредиши, заикаешься, поспѣшино говориши и имѣши непроизвольное испражненіе на низѣ.

Когда больной не можешъ высунуть языка изъ рта, безпрерывно обнажаетъ грудь, выщаскиваешь ноги изъ постели и хочешъ сойти съ оной, также безпрерывно о шомъ фаназириуешь, чио онъ умереть долженъ: то все сие служитъ признакомъ смерти.

Къ смершнимъ признакамъ относятся также: гнилое воспаленіе легкихъ, раздущіе живота, съ вонючимъ и проливнымъ поносомъ, красныя пятна (*petechiae*) на шѣлѣ, съ вышесказанными припадками, трудное глошаніе, сопряженное съ звукомъ при опусканиіи жидкости въ желудокъ, слѣпота, желтуха съ повсемѣшвеннымъ дрожаніемъ всѣхъ членовъ, соединенная со скорымъ и малымъ пульсомъ, сильныя кровопеченья, совершенное оглушеніе головы и всѣхъ чувствъ, и увеличивающейся аппендинъ огонь въ какой либо наружной части шѣла.

Случающіяся при гнилой горячкѣ испражненія, всегда починаються весьма подозрительными явленіями, частію по шому, чио онъ еще болѣе усиливашъ горячку, частію пошому, чио доказыва-

юпъ высокую степень оной. Сюда причисляются преимущественно обильный постъ и моча, впрочемъ съ объемами иногда соединено бывающее уменьшение горячки, которое можно узнать изъ того:

а) Еспѣли онъ являющийся въ крипические дни.

б) Еспѣли при постъ возышаешься пульсъ и припадки оказываются въ лучшемъ состоянии.

в) Еспѣли не обнаруживается никакихъ пятенъ (petechiae) на пѣль.

г) Еспѣли съ таховыми испражненіями соединены при постъ и постъ.

д) Еспѣли оказываются въ мочѣ маленькие блоки, и блестящія, соляные кристаллы подобныя, крошки.

Ионость и кровоотечеіе всегда сомнительны и должны быть съ возможнотю скоропостию прекращаемы.

Хорошіе признаки сушь: глухота, кровавые вереды и опухоль шейныхъ железъ. Опухоль сю должно поддерживать, въ прошивномъ случаѣ весьма худо, еспѣли и чѣмъ скорѣе она опять исчезаетъ.

Причины.

§ 26.

Кромѣ всѣхъ тѣхъ болѣзней, кои имѣютъ способность переходить въ гнилую горячку, съ собственными своими причинами, есть еще особенные и непосред-

співения вліянія, споспѣшеспівующія къ произведенію такъ называемой чистой первоначальной, а не изъ другой, предшеспивавшей болѣзни, образовавшейся гнилої горячки.

Сіи непосредспівенные вліянія опличаються опять опѣшъ шѣхъ, которыя, дѣйствія на шѣло, въ гораздо крачайшее время производяще гнилую горячку.

Къ первымъ причисляються:

a) Всеобщая слабость жизненныхъ силъ.

b) Ослабленіе твердыхъ частей шѣла.

c) Цынготное расположение.

d) Частыя испражненія, слюноотечество и распустія въ любви.

e) Чрезмѣрное напряженіе тѣлесныхъ и душевныхъ силъ, какъ то: продолжительные труды, ночные мысlenныя занятія, особенно угнетающія, душевная спраски, (изъ сего весьма явлѣшающъ, опѣшъ чего при всеобщемъ бѣдствіи и угнетеніи гнилая горячка можешьъ сдѣлаться господствующею повальной болѣзнію).

f) Продолжительное, частое и чрезмѣрное употребленіе такъ называемыхъ ослабляющихъ и разрѣщающихъ средствъ, напримѣръ: меркуріальныхъ.

g) Недостатокъ въ питаніи и испорченная, либо неупорядоченная пища.

h) Сидачій родъ жизни, особенно въ заключенномъ воздухѣ, по сему же на корабляхъ гнилая горячка споль часто вспрѣчаєтся.

i) Частные, или не надлежащимъ образомъ врачуемые роды.

к) Бѣдноспѣ, не только по всеобщему изнуренію чрезъ недоспапокъ въ пипаніи, но и по неопрятности и горестни, въ кругу бѣдныхъ всегда вспрѣчающейся.

Ко впорымъ, кои въ несравненно крашайшее время и не рѣдко такъ скоро могущь произвеспи гнилую горячку, чи по наступленію оной не предеспивуешь никакихъ признаковъ, показывающихъ прімѣнной упадокъ здоровья, причисляющія исключительно гнилые вещества, приниамаемыя въ наше шѣло. Таковыя многочисленныя вещества по внутреннимъ ихъ свойствамъ и по особыенному отношенію на всякую порознь взявшую систему, или органъ человѣческаго тѣла, равно какъ и по виду, въ кошоромъ онъ могутъ переходиши въ шѣло, суть различны.

Важнѣйшія впрочемъ изъ оныхъ суть:

1) Гнилое заразительное вещество, переходящее въ наше шѣло чрезъ кожу и легкія, не смотря на то, освобождаеши ли оно изъ живыхъ, или изъ мертвыхъ веществъ, какъ то: изъ большаго количества штуповъ послѣ сраженій, и послѣ наводненія, гдѣ оспающіяся иль, рыбы и проч. переходиши въ гніеніе.

2) Тѣ гнилые вещества, кои воспринимающія нами чрезъ ротъ, какъ то: гнилые лица, гнилая рыба, гнилая вода.

3) Задержаніе такихъ веществъ въ шѣлѣ, кои въ здоровомъ состояніи къ поддержанію онаго должны бытъ отдалляемы, какъ шо: задержаніе испаренія кожи при продолжительномъ влажномъ воздухѣ, или въ сырыхъ жилищахъ, задержаніе мочи, или испражненія низомъ и т. д.

4) Произведеніе гнилыхъ веществъ въ самомъ шѣлѣ. Сие случается:

а) При гнилой желудочной и желчной горячкѣ, кои въ послѣдствіи могутъ произвесши гніеніе во всемъ шѣлѣ.

б) При внутреннихъ язвахъ, какъ шо: при чахошкѣ легкихъ, при гнилой оспѣ и мѣслиномъ гніеніи, напримѣръ: при антоновомъ огнѣ и ракѣ. Во всѣхъ сихъ случаяхъ отдаляющійся изъ язвъ гной, всасываясь внутрь шѣла, можетъ причинить гнилую горячку.

Лѣченіе.

§ 27.

Необходимо нужная при лѣченіи гнилой горячки средства суть слѣдующія:

I) Въ разсужденіи діэты, кроме предложенныхъ при воспалительной горячкѣ діэтическихъ правилъ, надлежитъ замѣнить здѣсь еще слѣдующіе пункты:

1) Діэта должна бытъ легкая, однако питательна и крѣпительна; по сему

мясных похлебки съ пряностями и яичнымъ желткомъ весьма похваляющейся здѣсь; равнымъ образомъ хлѣбная кашица, супъ изъ овсяной крупы, или ячменной кисель, съ нѣкоторымъ количествомъ вина, или лимоннаго сока, желе изъ смородины, и т. д.

2) Преимущественнаго употребленія въ сей горячкѣ заслуживающъ кислоты. Можно употреблять ихъ какъ въ пищу, такъ и въ питье лимоны, померанцы и винный уксусъ занимаютъ здѣсь ихъ мѣсто; что касается до формы, въ коей онъ могутъ быть принимаемы, то можно сказать, что прибавленіе къ онымъ соразмѣрнаго количества вина, дѣлаетъ ихъ еще болѣе дѣйствицельными, или иначе сказать, сердце крѣпчельными.

3) Температура комнаты всегда должна быть здѣсь очень умѣренна, а воздухъ самой чистѣйшей и свободный, словомъ ни въ какой горячкѣ не требуется шаковой чистоты воздуха, какъ въ сей.

4) Не менѣе надобно забочиншися и о надлежащемъ спокойствіи больнаго; — малѣйшій шумъ причиняетъ ему головную боль, а слабѣйшее напряженіе — обморокъ.

§ 28.

II) Домашнія средства. Превосходнѣйшими починающиима здѣсь:

1) *Вино.* Самое лучшее для сего есть ренское вино (рейнвейнъ), особливо въ шѣхъ случаихъ, когда сплы болнаго ослабѣли и шѣмъ болѣе, чѣмъ менѣе и скорѣе пульсъ бываетъ.

При недоспашкѣ вина можно употребить водку, разведенную съ водою.

Когда по употреблениіи вина бредъ увеличивается, глаза воспаляются, рѣчъ дѣлается скорою и сильною, самое вино причиняетъ жаръ, беспокойство, и т. д.; то заблаговременно надлежитъ удалить опое.

Ешьли при сей горячкѣ иѣть аппептида и весьма спраждепть пищевареніе, то полынная наливка съ корицею весьма полезна бываетъ. (См. Лѣк. сосп. № 4).

Когда обильное употреблениѣ ренского вина умножаетъ поносъ, кровотечениѳ и проч. испражненія, то можно замѣнить его, или краснымъ францвейномъ, или еще лучшемъ краснымъ портвейномъ.

Къ сему намѣренію служитъ также негусъ, равно какъ и бишофъ, наипаче по поламъ съ холодною водою.

2) *Калифора* весьма большое дѣйствіе оказываетъ:

а) При угнѣщеніи оправленій нервной сисищемы и многихъ при томъ болѣзняхъ явленіяхъ, каковы супъ: бредъ, подскакиваніе сухихъ жилъ и т. д.

б) При весьма маломъ и мягкому пульсѣ.

с) При очень впаломъ и смертельно блѣдномъ лицѣ спрѣждущаго.

д) При kleйкомъ пошѣ и накожныхъ сыпяхъ.

Пристойнѣйшая форма, въ которой даепся камфора, если распираніе оной съ яичнымъ желѣзомъ, полагая полскрупула (шестипушную часину золотника) камфоры на одинъ желѣзокъ лайца и б лоповъ воды, и давая сіе чрезъ полчаса по споловой ложкѣ.

3) Пластырь шпанскихъ мухъ (№ 5) и еортитникъ (№ 6), сушъ драгоцѣнѣйшия въ гнилой горячкѣ средства и дѣйствующіе часто болѣе, чѣмъ бушылка вина. Еспыли и сіи никакого дѣйствія не производяшъ, тогда уже вся надежда исчезла. Между тѣмъ при употребленіи ихъ надлежишъ бысть весьма оспорожнымъ, поелику нарываемыя ими мѣстами легко переходяшъ въ анионовъ огонь.

Дѣйствищими и употребленія доспойными оказываются онъ:

а) При великой чувствительности и шупости чувствъ.

б) Когда лицо красное и раздутое, больной сильно бредиши и скоро говориши.

с) Въ началѣ мѣстныхъ воспаленій, нерѣдко въ сей горячкѣ вспрѣчающихся, какъ то: воспаленія груди, брюшныхъ внутренностей, или мочевыхъ пушей.

Бредными же бывающими тогда, когда чувствительность слишкомъ велика,

разрѣшаемоспѣ соковъ чрезвычайно сильна и мѣстное воспаленіе доспигло уже высокой степени.

Однакожъ здѣсь предпочишається всегда горячное іѣспо, къ подошвамъ ногъ прикладываемое, предъ пласпыремъ шанскихъ мухъ.

4) Ванны такжѣ оказываюшь здѣсь оптѣнно хорошее дѣйствіе и особенно въ такихъ случаяхъ похваляюшся, гдѣ кожа спраждепъ болѣе, нежели кишечный каналъ.

Между тѣмъ при употребленіи ихъ нужно наблюдать слѣдующее:

а) Вообще ванна не должна бывать очень тепла, наипаче лѣпомъ, но средняя степень оной (*); то если такая ванна, которая бы не холодила, почишающія здѣсь наилучшую.

б) Впрочемъ, чѣмъ высшая степень горячки, тѣмъ теплѣе можетъ бывать ванна.

с) Къ ваннѣ нужно присоединять всегда ароматные травы, какъ то: шалфей волчецъ, лаванду, ромашку, тысячелистникъ, розмаринъ и касапикъ (ирный корень).

Оптѣнное таковая ванна оказываетъ дѣйствіе чрезъ прибавленіе попаша, или вина, или винного уксуса, или водки, особенно камфарного спирта.

(*) Консѣрвъ соѣтуется отъ 85 до 96 градусовъ Фаренгейтова термометра.

d) Больной не болѣе долженъ оспа-
вашься въ ваннѣ, какъ около получаса,
поелику силы его не въ состояніи болѣе
выдержать оной.

Въ случаѣ же паковыхъ ваннъ упо-
требляши не льзя, тогда предписываюшся
мѣшанія для рукъ и ногъ, по вышепред-
ложеному способу, нѣсколько разъ въ
день повторяемыя и продолжаемыя во
все теченіе болѣзни.

5) Ароматныя примочки и спиртныя
стиранія на брюхѣ, могутъ имѣтиздѣсь
место только при раздушности брюха,
или поносѣ.

6) Промывательныя необходимы и весь-
ма полезны:

a) Когда желудокъ гораздо чувстви-
тельнѣе, нежели сколько нужно для пе-
ренесенія принимаемой имъ пищи.

b) При раздушности живота, поносѣ и
высочайшей степени гнилости.

c) При запорѣ на низѣ.

Въ обоихъ первыхъ случаяхъ а) и б)
предписываюшся промывательныя изъ
вышеупомянутыхъ ароматныхъ распен-
ий съ нѣкошорымъ количествомъ крах-
мала, назначаемыя чрезъ 3, 4 часа по
чашкѣ.

Равнымъ образомъ чашка портвейна,
или краснаго францвейна, смѣшанного
съ небольшимъ количествомъ крахмала,
какъ промывательное, почаше употребля-
емое, доспавляешь превосходную услугу.

Въ препьемъ случаѣ можно дѣлашь промывашельное изъ ромашковой наспойки съ споловою ложкою льнянаго масла, а въ крайнихъ обспоятельспвахъ съ шаковою же мѣрою штолченаго сахару, или еще сильнѣе — поваренной соли.

Впрочемъ въ сей горячкѣ гораздо лучше, есмыли запоръ, нежели поносъ случающающійся.

7) *Размѣгтающія припарки.* Иногда, какъ выше уже упомянуто, распухающіе шейные железы. Въ семъ случаѣ должно спарапаться посредствомъ смягчающихъ припарокъ, напримѣръ: изъ ромашки, бузины и шафрана, съ мякишемъ бѣлаго хлѣба и молокомъ сваренныхъ, не только опухоль шаковую, сколько можно дольше поддерживашь, но не рѣдко даже способствовавши нагноенію оной. По сему, коль скоро памъ нѣсколько накопишся тноя, что надлежитъ опухоль открыть и опять прикладывать на оной смягчающія припарки.

ПРИБАВЛЕНИЕ.

§ 29.

А. Предосторожности, кои нужно наблюдать по оконтаніи гнилой горячки.

При семъ надлежитъ обратить вниманіе на два обспоятельспва, именно, чпо

должно дѣлать при выздоровлении больного, и чи по смерти его:

1) На пути чистенія, или при действительномъ выздоровлении шаковаго рода больного, надлежишъ:

а) Выполняшъ съ рачительносцю и въ почноспи вышепредложенную дѣлшу.

б) Спарашишъ припомъ о числомъ одѣяніи и бѣльѣ больного и употребляшъ поперемѣнно теплую мыльную ванну.

с) Перевесши тощась выздоравливающаго изъ прежней его комнаты въ другую чисшую и сѣплую.

д) Окуривашъ прилежно комнату больного и всю квартиру, вышеупомянутыми селишряной и пресыщенной соляной кислотъ парами (§ 10), омывашъ ее сначала холодною водою, а послѣ теплымъ щелокомъ.

Когда присматривающіе за больнымъ не могутъ вовсе оставить прежней его комнаты, то должны они, по произведеніи очищеніи, сколько можно пышательнѣе окуривать и опворять въ ней окошки, и т. д.

е) Бѣлье, бывшее на больномъ, тощась очистишь; сперва положишь его на нѣсколько дней въ холодную воду, попомъ многократно вымывашъ въ тепломъ щелокѣ, наконецъ окуривашъ и нѣсколько недѣль еще вывѣшивашъ.

ф) Такимъ же образомъ надлежишъ по-

спупать и съ прочимъ платьемъ, постелею, употребляемыми больнымъ, домашними приборами и со всѣмъ къ нему принадлежавшимъ.

2) *По смерти больнаго.* Здѣсь нужны другія предоспѣржности, именно:

а) Когда послѣ надлежаще учиненнаго изслѣдованія, или законнаго осмотрѣ умершаго, окажется, что бывшій больной дѣйствительно умеръ, то съ возможностью поспѣшною надобно вынести трупъ изъ прежней его комнаты, и въ другой отдаленной распиворить окна на дѣлья сушки.

б) Буде же сіе не возможно, то по крайней мѣрѣ присутствующіе должны изъ оной удалившись.

с) Нашедъ вѣрные признаки дѣйствительно наступившей смерти, надлежитъ спаравшись о возможно скромъ погребеніи трупа, не слѣдя даже общему и за правило принятому обыкновенію обмывать, аккуратно одѣвать и выставлять на показъ мертвое шѣло.

Само собою разумѣешся, что погребеніе при влажной и теплой погодѣ чѣмъ скорѣе можетъ быть предпринято, чѣмъ лучше.

д) Трупы шаковые должно погребать только ночью, и не позволять никакого торжественнаго провожанія при похоронахъ, для прекращенія удобной при семъ заразы.

е) Равнымъ образомъ запрещашь переносить ихъ людямъ, но гораздо лучше употребляшь къ сему drogi.

ф) Нужно также опушашь всякой изъ шаковыхъ труповъ въ глубокую, извеснюю усыпагную могилу, дабы симъ опеклонишь восхожденіе заразищельныхъ паровъ.

г) Наконецъ весьма полезно при очень заразищельной гнилой горячкѣ, сожигашь совершенно все бывшее на умершемъ плащье и бѣлье.

§ 30.

В. Правила, какими образомъ содержать себя тѣмѣ, кои обращаются съ страждущими гнилой горячкою.

1) Должно спаравашь наиболѣе о шомъ, чиобы воздухъ въ комнатѣ больнаго сколько можно быль чище. (Смоп. очищеніе его § 10).

Преимущественно же оправдашь все, чио поршишь его, особенно испражненія больнаго, перемѣняемое имъ бѣлье, и пр.

2) Не ходишь никогда нашощахъ къ шаковымъ больнымъ.

3) Избѣгашь всякой неумѣренности, особенно въ спириныхъ напишкахъ, а еще болѣе въ водкѣ.

Вообще умѣренность въ семъ случаѣ необходимо нужна; лучше всего безпрепятственно обращающемся съ больнымъ,

ввечеру, ложась спать, пить по двѣ рюмки хорошаго спараго рейнвейна, или по спакану негуса (*).

4) Не сплановишись прямо пропивъ дыханія спраждущаго, но лучше въ спорону, ешьли нужно чио либо сдѣлать ему.

Вредно шакже цѣловашь, или обнимашь больнаго; по сему какой бы ни былъ по водъ къ шому, остерегашся надлежишъ.

5) Киліанъ рекомендуешъ въ семъ случаѣ рачительное употребленіе шакъ называемаго *уксуса отъ заразы*, соспавляемаго слѣдующимъ образомъ: наливашся горячій уксусъ на ароматныя расшенія, какъ то: рушу, шалфей и мелиссу, лаванда, розмаринъ и сему подобные и наспаиваешься до охлажденія его. Симъ уксусомъ омывашъ лицо, орошашъ плащъ и выполоскиваешь ропѣть нѣсколько разъ въ сутки, при шаковыхъ обспояшельсвяхъ весьма полезно.

Сверхъ шого можешъ шакже служиши къ сему намѣренію смѣсь, соспоящая изъ трехъ частей шеплой воды и одной чаши виннаго уксуса.

6) Когда гнилая горячка очень прилипчива, что можно съ большею пользою

(*) Негусъ (*Negus*) есть вино, наспоенное послѣ вскипаченія его на разныхъ пряностяхъ, какъ то: на корицѣ, гвоздикѣ, кордамонѣ и проч.

шребляшь изъѣспныя, такъ называемыя, заразу разбивающія фляжки, изъ шлифованного стекла со стеклянною пробкою. Въ шаковую фляжку всыпается золотникъ въ порошокъ превращеннаго и пропѣяннаго марганца, попомъ наливающейся 5 золотника чистой и крѣпкой селиштранной кислоты и плопно запыхающейся; когда при посыщении спраждущаго гнилою горячкою больнаго открывается фляжка, то освобождается изъ оной совершенный селишрокислый гасъ, разбивающей всякое, вблизи больнаго находящееся, прилипчивое вещество, и чрезъ по препятствующей заразѣ. При каждомъ однако открытии шаковой фляжки надлежитъ наблюдать ту осторожность, чтобы не держать оной очень близко къ носу, поелику отъ сего легко причиняется сильный кашель, чиханіе и насморкъ.

7) Прислужники больнаго не должны надѣваться никакого шерстяного, или мѣхового плаща, но гораздо лучше холстяное.

Сверхъ сего имъ надобно прилежно перемѣнять свое плащье и бѣлье, окуривая ихъ сѣрою, а еще лучше вышеписанными парами, наипаче пресыщенной соляной кислоты, и попомъ надлежащимъ образомъ провѣтривать на свободномъ воздухѣ.

8) Весьма важно при семъ для всякаго
Часть I.

еслишь что, чтобы онъ, коль скоро, или въ самомъ себѣ, или въ другомъ примѣчаєшъ приближеніе, или дѣйствицельное уже начало гнилой горячки, шопчасъ проши-
вудѣйствовавъ.

Кращайшій, проспѣйшій и наилучшій способъ въ шакомъ случаѣ если: сперва принимашъ легкое рвотное средство, запивая прилежно ромашковымъ чаемъ; а ввечеру, ложась спасть, пить спаканъ негуса, или бишофса, по поламъ съ теплую водою, или нѣсколько рюмокъ спраго рейнвейна, и все сіе продолжашъ нѣсколько вечеровъ.

B. Нервная горячка.

§ 31.

Нервною горячкою называещія шопѣть родъ огневицы, копорый обнаруживающія преимущественно неправильнымъ дѣйствиемъ чувственныхъ жиль (нервовъ) какъ что: бредомъ, разнаго рода судорогами и другими припадками.

Здѣсь однакожъ упомянущо будемъ шокмо о простой, чистой и общей нервной горячкѣ, поелику прочіе, къ сему роду огневицъ принадлежащіе, виды весьма трудны въ разсужденіи распознаванія, и требующи для сего глазъ и глубокаго познанія образованнаго и опыщенаго врача.

Проспая шаковая нервная горячка
имъешь извѣснныя свои

Явленія и родъ теченія.

§ 52.

1) *Предъ наступленіемъ.* Топъ, кпо имъешь расположение къ сей горячкѣ, чувствуешь уже за нѣсколько недѣль слабость душевныхъ и пѣлесныхъ своихъ силъ, не имъешь бодрости и рѣшишельности, дѣлаешься легко забывчивымъ, не веселымъ, очень раздражительнымъ и чувствителльнымъ, сильно изнуреннымъ и усталымъ, особенно по ушру на щокахъ. По принятіи пищи и питья, дѣлаешься ему лучше; но коль скоро время впораго пищеваренія наступаешь, то оказывается прежняя дурноша, продолжающаяся до тѣхъ поръ, пока пройдешь пищевареніе.

Далѣе попомъ чувствуешь онъ великую тяжесть во всѣхъ членахъ, легкія ломоты боли поперемѣнно съ мягкою опухлостью одного какого либо, или многихъ членовъ, лещучій жаръ, переходящій скоро въ ознобъ. Моча его большею часпію водянистая, свѣплая, несовершенная, перемѣнчивая, пульсъ малый, нѣсколько твердый, а иногда скорый и полный. Однако сіе бываешь периодически, или такъ, что пульсъ опять мед-

ленивымъ и мягкимъ, а симъ и состояніе больнаго лучшимъ дѣлается.

Послѣ сего сильно начинаеть спрадашь пищевареніе и весь кишечный каналъ. Больной имѣетъ накопленіе слизи въ желудкѣ и кишкахъ, нечистый языкъ, недоспапокъ аппендица, дурношу, пошиношу, переходящую иногда въ собачій голодъ, рвоту, сухость рта, мутные глаза и пятна предъ глазами. Кожа его обыкновенно сухая и холодная, иногда большими холоднаго поса каплями покрытая; при всякомъ почки малѣйшемъ шѣлесномъ напряженіи затрудняется дыханіе, и потомъ слѣдуютъ судороги въ брюхѣ и головѣ.

Предъ самыми появленіемъ горячки больной получаетъ вечеромъ подираніе по кожѣ, или легкій ознобъ со слабостью, успалостію и беспокойнымъ сномъ. Пульсъ его вечеромъ всегда скрѣе и при томъ судорожный. Къ сему присоединяется чрезвычайная унылость, болѣзnenные припадки пищеваренія, не рѣдко холодный потъ на рукахъ и ногахъ, частое побужденіе къ испусканію мочи, а самая моча чрезвычайно водянистая и пѣнистая. Оказываются обмороки, или по крайней мѣрѣ расположение къ тому, наипаче частое головокруженіе, угрюмый видъ, склонность къ плачу съ постоянной сонливостію безъ крѣпкаго сна, болѣе и болѣе умножающеся

умаленіе сильъ больнаго, а съ сими и опаденіе наружной полношы шѣла.

2) *Во времія настушенія.* Въ сіе время горячка кажешся совершенно образовавшеюся и обнаруживаеся постояннымъ сильнымъ холдомъ и поперемѣннымъ жаромъ; къ чему присовокупляеся еще пошь, который однако скоро исчезаетъ. Пульсъ бываеатъ весьма неравный, дрожащій, то медленный, то напуральный, то опять скорый, то малый, то полный и большой. Периоды лихорадочныхъ припадковъ также неравны, какъ то: лихорадка наступаетъ то по упру, то вечеромъ и кажешся то послабленною, то ожесоченою. Сопровождающія явленія совершенно прошивурѣчаютъ одно другому, какъ то, напримѣръ: одна часть пупа и безчувственна, другая напротивъ чрезмѣрно раздражительна и чувствительна; и то же самое бываеатъ съ жаждою и жаромъ. Моча то свѣплая, прозрачная и съ болью въ мочевомъ пузырѣ при испусканиіи оной соединенная, то красная и мутная, то опять блѣдная и водянистая. Бредъ то малый, то сильный, до бѣщенства даже просыпающійся. Большой то унылый, то опять бодрый и живой бываеатъ.

3) *При достижениіи высокой степени.* Къ вышеупомянутымъ явленіямъ присоединяются еще обмороки, шрудное глопаніе, занканіе (мамляніе), щупаніе по

одѣалу, пуспая рвота, судорожные припадки, непроизвольное испражненіе кала и мочи, накожныя сыпи, опухоли паховыхъ и щейныхъ железъ, кровошеченія всякаго рода, анионово-огненныйя кое-гдѣ пяпна, попомъ самый анионовъ огонь безъ особыхъ боли.

Напослѣдокъ появляется какъ будто улучшенное состояніе и уменьшеніе всѣхъ сильныхъ припадковъ, но за симъ вдругъ слѣдуещъ и смерть.

Распознаніе.

§ 33.

Горячка сія развивается въ пѣль такимъ же образомъ, какъ и гнилая; по сему, дабы не смѣшиваться въ распознаваніи обѣихъ сихъ огневицъ, нужно знать, чпо при первной горячкѣ оказывается болѣе бредъ и разширеніе зрачковъ въ глазахъ, а при гнилой болѣе шуплость чувствъ и глухота, съ разрѣшеніемъ и наклонностию къ гнѣнію жидкихъ и твердыхъ частей тѣла.

Сверхъ этого опличительные признаки первной горячки составляютъ:

- 1) Величайшая слабость во всемъ тѣлу.
- 2) Бредъ и разнаго рода судороги.
- 3) Большое прошивурѣчіе припадковъ, какъ то: сильный бредъ, но пульсъ по-

хожъ на здоровый, жаръ и сухость языка, но безъ жажды.

4) Переходъ явленій изъ одной крайности въ другую, какъ то: шупость попеременно съ необыкновенною чувствительностью, сильный бредъ и бодрствование съ сонливостью, медленный пульсъ съ ускореннымъ, правильный съ беспорядочнымъ и проч.

Исходы.

§ 34.

Первная горячка можешьъ также чрезъ переломы переходишь или въ здоровое состояніе, или оканчивашся смертію. Сія послѣдня сверхъ того имѣешьъ что особеннаго, чи то весьма часто слѣдуешьъ отъ антепона огнѧ, и преимущественно въ мозгъ образующагося.

Переломы сей горячки трудно распознающиися и во многихъ случаяхъ бываюшъ несовершенны. Обыкновеннѣйшие изъ нихъ суть: просовидная сыпь, молочница и слюношеченіе. Они могутъ быть предузнаваемы слѣдующимъ образомъ:

1) Просовидную сыпь надлежитъ ожидать:

- * а) При сухой кожѣ.
- б) Когда больной съ самаго начала горячки покрывающиися обильнымъ пошомъ.
- с) Когда на 6, 7, 10 или 11 день, а

иногда и позже, обнаруживається скоро проходящая дрожь съ зѣвою, сухимъ и крашкимъ кашлемъ, шоскливостію, періодически шруднымъ дыханіемъ, шуплющю кожу, перемѣняющеся въ колопье и зудъ оной.

2) *Молотница* предстоитъ въ то время:

а) Кожа осваивается совершенно сухою.

б) Когда на 7 или 14 день появляется шоска.

с) Когда больной ощущаетъ сухость въ глубинѣ глошки.

д) Когда имѣется постоянная шоска со жженіемъ въ глошкѣ, безъ другихъ признаковъ спраданія кишечнаго канала.

3) *Слюнотетеніе* въ скоромъ времени произойдетъ:

а) При сухой кожѣ и водянистой мочѣ.

б) Когда въ криптические дни подчелюстные железы распухаютъ.

с) Когда глухота, головная боль и бредъ поперемѣнно наступаютъ и періодически возвращаются.

Впрочемъ, такъ какъ переломы сей горячки, дославляющіе выздоровленіе, расположавшись трудно, то нужно еще упомянуть здѣсь о нѣкоторыхъ другихъ явленіяхъ, которые, буде при нервной горячкѣ усматриваются вмѣстѣ, должны быть приняты, какъ вѣрнѣйшія доказательства и признаки дѣйствительного

и доброкачественного перелома. Къ симъ явленіямъ принадлежашъ:

а) Водянистая моча, въ большомъ количествѣ испражняемая, дѣлающаяся густоватою и мутною, и производящая опсѣдь.

б) Равномѣрный по всему тѣлу попѣхъ, и

в) При томъ уменіе жгучаго жара кожи, также сухости языка и рта.

Обыкновенные же здѣсь исходы сушъ:

1) Болѣзnenные: слюнопеченіе, просо-видная сыпь, молочница, кровавые вреда, параличъ какихъ либо въ особенностях членовъ, глухота и кожные сыпи различного рода.

2) Смертельные: судорожное спѣсненіе челюстей или сполбнякъ, поспрѣль, удушеніе, аппоновъ огонь легкихъ, цечени, или мозга.

Предсказаніе.

§ 35.

Предсказаніе при общей, или проспой нервной горячкѣ, неопределительно и весьма рѣдко бываешь благопріяшно.

Иногда при самыхъ лучшихъ знакахъ послѣдуешь смерть, а при весьма худыхъ выздоровленіе.

Вообще оно большею частію основывается на состояніи силъ больнаго.

Чѣмъ болиѣ и сильнѣе пульсъ и чѣмъ болѣе его частоспѣ къ натуральной приближается, тѣмъ лучше.

Также чѣмъ болѣе неправильноспѣ, прошивурѣчіе и перемѣнчивоспѣ имѣющихся припадковъ и явленій уменьшаются и болѣе восстановляется равновѣсіе и согласіе оныхъ, тѣмъ надежнѣе можно полагаться на выздоровленіе. Проспая первная горячка безъ особливыхъ мѣстныхъ воспаленій какой либо части тѣла, предвѣщающа лучшее предсказаніе, нежели напропивъ.

Онѣмѣніе и шупоспѣ чувствъ суть всегда худые признаки, и доказывающъ присущіе прилипчивой нервной горячки.

Чрезвычайно опасные признаки суть: чрезмѣрная слабоспѣ, дрожащій пульсъ, бредъ, беспреспанная перемѣна припадковъ, дрожаніе, судороги, частая пугливоспѣ большаго, сильнаго возмущенія сердца, плачъ и поперемѣнныи смѣхъ, подергиваніе сухихъ жилъ, корчи и параличъ какихъ либо членовъ въ особенности.

Скорое исчезаніе злокачественныхъ припадковъ очень сомнительно здѣсь и не рѣдко предшествуетъ антитонову огню.

Хорошій признакъ есть повсемѣстный теплый и не изнуришельный потъ.

Напропивъ того каплеобразный, или холодный потъ, скоро выходящій и

скоро опять исчезающій, показываещъ худое предсказаніе.

Чѣмъ болѣе судорожный явленія съ уменьшениемъ силы увеличиваются, темъ сомнительнѣе.

Смертельнымъ признакомъ почишающимъ продолжительная шупость чувствъ соединенная съ щупаніемъ одѣяла, подпрыгиваніемъ сухихъ жилъ и бредомъ.

Причины.

§ 36.

Всѣ при гнилой горячкѣ упомянутыя причины (см. § 26) могутъ также произвестіи и нервную, особливо, если подверженный онимъ человѣкъ имѣетъ нѣжное сложеніе тѣла, и при томъ очень раздражителенъ и чувствителенъ.

Впрочемъ есть еще особенные силы, причиняющія сю горячку ранше, скрѣе и непосредственнѣе. Таковыя суть:

1) Продолжительная, холодная, влажная погода; по сему-то на Сѣверныхъ морскихъ берегахъ, равно какъ и въ Англіи, нервная горячка весьма часто случается.

2) Зимы, не имѣющія частыхъ и сухихъ холодовъ.

3) Болотистый, заключенный и животными испареніями испорченный воздухъ.

- 4) Продолжительное ночное бодрствование вообще.
- 5) Продолжительные напряженія ума, особенно ночные учебных занятий.
- 6) Частые роды, наипаче, если машь всегда сама кормила грудью своихъ дѣтей.
- 7) Распутства въ любви, равно какъ и рукоблудіе (онанія).
- 8) Продолжительные испражненія, наипаче кровопеченья, частое и въ привычку обращенное кровопусканіе, частое испеченіе съмени, бѣли у женщинъ, продолжительное и частое слюнотеченіе, беспрестанный поносъ, и т. д.
- 9) Печальное возмущеніе сердца и вообще душевный спаси.
- 10) Всякая, прежде бывшая болѣзнь и болѣзненворная оной вещества могутъ также возродить нервную горячку, наипаче:
- а) Ешьли болѣющая особа имѣешь уже къ шому расположение.
- б) Ешьли всеобщая болѣзненная конституція есть уже нервозная.
- с) Ешьли шаковыя болѣзни совершенно несообразно и прошивно оными лѣчимы были.
- 11) Недоспашокъ крѣпкихъ пышательныхъ средстивъ, или пороки сныхъ т. е. бѣдствіенный голодъ, неурожай и употребленіе мяса больныхъ животныхъ.
- 12) Собственная зараза.

ЛЪЧЕНИЕ НЕРВНОЙ ГОРЯЧКИ.

§ 37.

Сему намѣренію спосѣпшесишаешь наи-
болѣе нижеслѣдующая діэша и домашнія
средства:

1) *Діэта.* Сверхъ упомянутаго при гни-
лой горячкѣ, касашельно діэши предпи-
санія (§ 27), нужно еще присовокупить
здесь слѣдующія правила:

1) *Пища.* Въ горячкѣ сей пищеваритель-
ные органы такъ ослаблены, что и удо-
боваримой пищи переносишь не могушъ;
припомъ больные рѣдко и пребываютъ
оной. Въ случаѣ же надобности можно
давашь имъ мясной съ пряностями при-
готвленный бульонъ въ малыхъ, чаще
повторяемыхъ, приемахъ, болѣе теплымъ,
нежели горячимъ.

2) *Воздухъ* въ комнатахъ требуетъ про-
хладный, всегда въ равной температурѣ,
чистый и сколько можно сухой.

3) Частое питье спрѣждущему сею
болѣзнію всего полезнѣе; нужно впрочемъ
наблюдать, чтобы оное разомъ не было
принимаемо въ очень большомъ количе-
ствѣ.

Приличнѣйше для сего напитки супы:

а) Винный панадъ, особливо со сла-
рымъ рейнвейномъ, или францвейномъ;
сверхъ того и сіи самыя вина, будучи
разведены нѣкоторымъ количествомъ

воды, составляющиъ весьма употребительное питье.

б) Зельшерская, или ячменная вода съ виномъ.

с) Померанцевая сыворошка (§ 141) преимущественно шѣмъ особамъ полезна и дѣйствительна, кои вели очень праздную и распутную жизнь, либо спрадали, или еще страждали весьма частымъ мѣсячнымъ очищеніемъ, или печеніемъ бѣлей.

д) Не молодое горькое пиво, хвалящъ.

§ 38.

II) Домашнія средства. Какъ при лѣчніи гнилой, шакъ и первной горячки оптѣнное оказывають дѣйствіе:

1) Вино, впрочемъ хорошее, старое и спиртомъ изобилующее, наприм францвейнъ, старый рейнвейнъ, ренское вино, наспоящая мадера, штейнвейнъ, шампанское и Венгерское (Токайское вино).

Не должно стокмо съ сими винами обходиться слишкомъ экономно, нащпаче, когда требуется отъ нихъ желаемый успѣхъ въ трудныхъ и къ антонову огню приближающихся случаяхъ. Киліанъ нѣсколько разъ имѣлъ случай видѣть скорое выздоровленіе у пѣхъ, кои хотя изнурены были первною горячкою и въ дни своего здравія, едва могли переносить одну рюмку вина, выпивали въ

сушки ошъ полушиоры до двухъ бузылокъ францвейна, съ половиной бушылки Токайскаго вина.

Сверхъ этого весьма хорошо употребляшь на сей конецъ вино, настоенное въ продолженіи 24 часовъ на сухой померанцовой коркѣ, корицѣ и ванили.

2) *Мскусъ* (Кабординская спруя, *muscus*). Хотя онъ есь средство аптекарское, и по сему не принадлежащее къ сей спашь; однако здѣсь упоминаешся объ ономъ не шокмо по тому, чпо онъ часпо въ обыкновенныхъ домашнихъ аптекахъ находится, но и попому, чпо онъ при лѣченіи всякой, особенно же чистой нервной горячки, всѣми починаешся за самое дѣйствительнѣйшее средство (*souverainste Mittel*), и содѣлываешъ при семъ подлинно чудеса. Только при употребленіи его требуешся всегда наблюдать слѣдующее:

a) Давашь мскусъ толчасъ при появлениі нервной горячки всякой часъ ошъ 2 до 3 гранъ, сперши съ небольшимъ количествомъ сахара.

b) Не должно быти никакихъ признаковъ аншонова огня въ пѣль.

c) Коль скоро нервная горячка доспигла уже высокой степени, то надлежишь принимашь онаго до 10 гранъ всякой часъ, а въ крайнихъ случаяхъ и чрезъ полчаса.

d) Особливо нужно употребляшь его

въ то время, когда мозгъ больнаго сильно пораженъ, пульсъ малый, твердый и судорожный, а пришомъ великая чувствительность находиться.

3) *Камфора.* Сія тогда имѣеть мѣсто при нервной горячкѣ, когда силы больнаго совершенно изнеможены, пульсъ малый, мягкий, медленный и перемежающійся. Форма, въ какой можетъ бысть даваема она, есть слѣдующая: распирается 20 гранъ камфоры съ яичнымъ желткомъ, приливающій шуда 10 лопцовъ воды и дающій больному всякой часъ по споловой ложкѣ, наилучше въ соединеніи съ вышеупомянутымъ, на распеняхъ наспояннымъ виномъ.

4) *Гортитники и шпанскія мушки* (см. № 5 и 6). Средства сіи болѣе полезны:

а) Въ высшей степени болѣзни, нежели въ началѣ.

б) Ешьши бредъ или судорожные приступки находящіеся вмѣстѣ съ малымъ, мягкимъ, медленнымъ, перемежающимъ или скорымъ пульсомъ.

с) При совершенномъ беззамишливѣ и безчувствіи.

д) При жестокой головной боли.

Шпанскія мушки должны ошавашася въ сей болѣзни до тѣхъ поръ, пока произведеніе пузырь, доказывающій надлежащее ихъ дѣйствіе.

При сильной головной боли и бредѣ обыкновенно прикладываютъ ихъ къ за-

шылку; при икопѣ и спѣсненіи въ груди на самую грудь и къ набрюшной спо-
ронѣ. Ежели непримѣнно никакого по-
правленія и силы больнаго значицельно
ослабѣваюшъ, то кладушъ ихъ на плечи,
икры и подошвы. Горчичники, пригопов-
ляемые изъ черной горчицы, хрену,
уксусу и кислаго шѣспа, причиняюшъ
сильнѣйшую боль, нежели шпанскія муш-
ки, по сему и дѣйствіе ихъ сильнѣ.

5) Промывательныя шакже иногда ну-
жны здѣсь, особливо:

а) На шопѣ конецъ, чтобы поддержать
дѣйствіе внушире принимаемыхъ лѣ-
карствъ.

б) Когда больной все принимающее имъ
внушире извергаєтъ вонъ, либо пошреб-
ныхъ большихъ пріемовъ не переносить
надлежащимъ образомъ.

с) Когда спраждущій къ какому либо
цѣлищльному средству имѣешъ опвра-
щеніе.

б) Потирание ромомъ, коньякомъ, кам-
форнымъ спиртомъ (№ 7), опваромъ гор-
ничныхъ сѣменъ, и обмываніе оними
рукъ, ногъ и спины, оказываюшъ здѣсь
споль же превосходное дѣйствіе, какъ и

7) Окутываніе фланелью, на коей сперва
расширяется камфора. Средство сие ре-
комендуешъ Киліанъ, какъ ошмѣнно и
скоро дѣйствующее здѣсь, и употребле-
ніе его шамъ преимущеспенно назна-
чаешь, гдѣ больной жалуетсѧ на ревма-

тическія боли, не рѣдко обременяющія сколько больнаго, сколько и врача.

Ванны. Тepлые ванны соспавляють здѣсь превосходное средство при сухой кожѣ съ жаромъ или безъ онаго. Онъ привлекаютъ соки къ поверхности тѣла, ошворяютъ накожные поры и умѣряютъ неправильныя дѣйствія нервенныхъ жилъ. При соспавленіи ваннъ нужно соблюдать то же, чѣмъ сказано при гнилой горячкѣ объ оныхъ (смоп. § 28).

Въ случаѣ большихъ неудобствъ, зависящихъ частію отъ самаго больнаго, находящагося иногда безъ чувствъ, а частію отъ затрудненія въ приготовленіи, съ пользою вмѣсто ихъ можно употребить фланель, суконки, намоченные горячою водою, прикладывая ихъ къ ногамъ, брюху и груди.

Холодные ванны. Еслѣ жаръ весьма сильный и кожа суха, то полезно въ продолженіи нѣсколькихъ минутъ мыть больнаго холодною водою, или обливать онаго, либо посадить въ холодную ванну. Сіе уменьшаешь непріятный жаръ и часто производить весьма полезное впечатлѣніе на кожу. При сильномъ бредѣ и боли головы прикладываются холодные примочки къ самой головѣ; удобнѣже, для соблюденія опріянности, употреблять бычачій пузырь, наполненный холодною водою, съ мелкоизрубленнымъ льдомъ. Тepлые ванны и припарки при-

личны около 9 дня и позже; а холодныя
и только въ первые дни болѣзни.

Нѣкоторыя замѣчанія.

§ 39.

А. Не рѣдко соединена бываєшъ съ нервною горячкою и просовидная сыпь (проказа). Иногда рѣшаешъ она болѣзнь, а иногда нѣшъ. Въ первомъ случаѣ надлежишъ спарапшься о шепломъ содержаніи, давашь больному ромашковый чай, вино съ водою, или зеленый чай съ виномъ, и остерегашь его отъ проспуды. Во второмъ случаѣ совершенно не нужно беспокоишься о ея лѣченіи, но продолжашь прежнее лѣченіе нервной горячки.

В. Появляющееся слюнотетеніе должно поддерживать, поелику оно бываєшъ иногда наилучшимъ переломомъ. Къ шаковому намѣренію нужно полоскать горло ромашковымъ и бузиннымъ чаемъ съ нѣкоторою примѣсью меда и уксуса, шею держать въ теплотѣ, и не пить ничего холодааго.

Буде же слюноотечееніе слишкомъ усилившеся, то надобно полоскать горло шалфейнымъ чаемъ, съ нѣкоторымъ количествомъ разведенныхъ въ ономъ квасцовъ, и прикладывать къ запылку нарывный пласциръ, а для ножной ванны употребляшь горчичный опваръ.

C. Крититескому сильному мотетегеню споспѣшевовашъ обильнымъ количествомъ пинья.

Д. Киліанъ иѣсколько разъ имѣлъ случай видѣть при нервной горячкѣ частыя и чрезвычайно разслабляющія испеченія сѣмени (pollutiones). Испеченія сіи, не бывъ въ скоромъ времени прекращены, причиняющіе или смерть, или по крайней мѣрѣ спинную сухошку.

Въ семъ случаѣ нужно давать всякіе два часа внуширу опь 4 до 6 гранъ камфоры, а снаружи почаще прикладывать примочки изъ камфорнаго уксуса (No 8) въ промежности, находящейся между дышородными частями и заднимъ проходомъ.

Наконецъ, что предложено въ прибавленіи при гнилой горячкѣ, то самое необходимо и при нервной, особенно, если она заразительного свойства.



III.

ЖЕЛЧНАЯ ГОРЯЧКА.

(*Желудочная горячка.*)

§ 40.

Желчною горячкою называется то болезненное состояніе, при копоромъ, кромъ общихъ признаковъ послабляющей горячки (*), примѣчающія еще всѣ шѣявленія, копорыя показывающія, есшьли не совершенное, то по крайней мѣрѣ болѣе или менѣе явственное нарушеніе сообразныхъ здравію оправленій желудка и другихъ органовъ, принадлежащихъ желчной системѣ и пищеваренію.

Явленія и родъ теченія.

§ 41.

1) *Предъ наступленіемъ*, т. е. за восемь или четырнадцать дней прежде, нежели

(*) Послабляющими горячками называются тѣ, кои въ извѣшнее время ожесточаются и дѣлаютъ послабленіе, но не имѣющія той перемѣжки, котою бывающій въ лихорадкахъ.

обнаружившися дѣйствительная болѣнь, пошѣ, копорый имѣеть уже расположение къ сей горячкѣ, чувствуєть умаленіе аппетита, частную пошношу, успа-
лосиь во всѣхъ членахъ и неохоту къ
обыкновеннымъ своимъ занятіямъ. Видъ
его измѣняется, цвѣтъ лица начинаетъ
желѣзистъ, вокругъ глазъ образуются синеватые кружки. Вкусъ во рту клейкий,
или соломъ подобный, моча мутная, руки
при ощущеніи чрезвычайно жаркія; при
наклонности къ поносу не рѣдко оказы-
вается клейкий пошъ по въ шой, что въ
другой части тѣла.

2. Во время же самаго наступленія, ко-
торое начинается умѣреннымъ ознобомъ
и жаромъ, цвѣтъ лица дѣлается болѣе
и болѣе блѣднымъ, а иногда пшеникотрас-
нымъ; языкъ покрываются желтаго или
буровато-желтаго цвѣта слизью, или
только по спорнамъ, или весь до кон-
чика, или даже и на самомъ кончикѣ.
Слюна бываетъ горьковатая, или сладко-
вата, вкусъ измѣняется, или дѣлается
горькимъ; глазной блокъ, наипаче части
вокругъ рта желѣзистъ, моча перемѣ-
ниается въ шафранную, или желтоватую.
Къ сему присовокупляется еще боль во
всѣхъ членахъ, особенно въ ляжкахъ и
спинѣ, пошъ на головѣ и лицѣ, чувство
тяжести и давленія въ желудкѣ, пере-
ходящее попою въ пошношу, горькую,
жгучую, или кислую отрыжку, наклон-

носить къ рвотѣ, и наконецъ въ самую рвоту, коею извергаются различные вредоносные вещества. При томъ болѣй имѣешъ великое спѣсненіе въ ложечкѣ, чрезвычайное беспокойство, болѣею частію желтая, частыя, но въ маломъ количествѣ выходящія испражненія низомъ, также безпресианное желаніе кислыхъ, прохладительныхъ напитковъ и свѣжаго свободнаго воздуха. Пульсъ ходя казеется полнымъ, какъ и въ здоровомъ состояніи, однакожъ не швердъ, но болѣе мягокъ и при томъ скорѣ.

3) *При достижениіи высокой степени.* Ешьши горячка еще болѣе усиливается, что оказывается болѣю сопровождаемое жженіе въ головѣ, бредъ, сверканіе предъ глазами, боли въ груди и брюхѣ, задержаніе мочи, или пѣнистая и жирия подобная моча, повсемѣшанный изнуришельный и клейкий попѣтъ, сначала красная, а скоро пошомъ бѣлая просовидная сыпь, не рѣдко съ молочницею во рту; рожа, изнуришельный поносъ, или совершенное задержаніе испражненія на низѣ; и наконецъ самая горячка переходитъ или въ гнилую, или въ нервную.

4) *При циалиніи.* Всѣ вышеупомянутые спраданія мало по малу исчезаютъ, новыхъ никакихъ не примѣчаются, и болѣй получаетъ прибавленіе своихъ силъ и аппепитъ.

Но

5) При перемѣнѣ, или обнаруживается жгучій жаръ съ неуполимою почною жаждою, сухость шѣла, головная боль, ускоренное дыханіе, малоколичественная, но весьма красная моча, нѣсколько прверже и полнѣе пульсъ, ш. е. такъ называемая воспалительная желтая горячка, или признаки имѣющаго въ послѣдствіи еще случившися воспаленія легкихъ, печени, мозга и изнуришельной лихорадки.

Распознаваніе.

§ 42.

1) Опѣрь воспалительной горячки опличающейся желчная шѣмъ:

а) Чѣмъ жилобіеніе во время пароксизма не такъ сильно и скоро, какъ при шой.

б) Чѣмъ больной уже за нѣкоторое время, не рѣдко за 8 или 14 дней до наступленія ея, чувствуетъ нѣкоторый упадокъ своего здоровья, чѣмъ при воспалительной горячкѣ рѣдко случается, а если и бываетъ, то по крайней мѣрѣ очень не долго продолжается.

с) Чѣмъ ознобъ и жаръ гораздо умѣреніе, не такъ силенъ и попрясающъ, да и не столь долго продолжается, какъ при воспалительной горячкѣ.

d) Наконецъ, чпо больной преимущеспвенно на слабоспь жалуешся, между тѣмъ въ воспалительной горячкѣ гораздо сильнѣе себя чувствуетъ.

2) Опѣшакъ называемой *желудотной горячкѣ*, копорая еспь ни чпо иное, какъ только собраніе предвѣспниковъ желчной горячки, отличающія сія послѣдняя наиболѣе тѣмъ, чпо въ желудочной въ первомъ ея продолженіи кожа блѣдна и не споль тепла, какъ въ желчной, при копорой она гораздо возвышенѣе, при томъ желтая и горячая бываешъ.

3) Опѣшакъ называемой *слизистой горячкѣ*, отличающія желчная тѣмъ, чпо въ первой слизѣ, а въ послѣдней желчь преимущеспвенно господствующа; сверхъ тогого слизистая горячка гораздо продолжительнѣе, — часами рша и горла болѣе или менѣе покрывающіяся при ней слизью.

Преимущеспвенного вниманія заслуживаетъ въ желчной горячкѣ пульсъ и по всемъ спвеннамъ особенная слабоспь большаго. Первый всегда бываешъ мягкой, нѣсколько сжатой и скорой.

Чистая желудочная горячка почишающа предвѣспіемъ желчной попому, чпо она не можешъ долго продолжаться въ тѣлѣ, особенно у вспыльчивыхъ черноволосыхъ людей, безъ иного, чтобы вся желчная сиспема не была поражена ею.

И с х о д ы.

§ 43.

Надежныхъ переломовъ желчная горячка, по настоящему никакихъ не имѣшъ.

Еспыли таковые и обнаруживаются, шо рѣдко могутъ быти доброкачественными и совершенными, ибо послѣ ихъ болышею частію рождающа просовидная сыпь, поигъ и молочница.

По сему та же потъ и мота рѣдко здѣсь бывающи криптическими, по крайней мѣрѣ трудно переломъ совершающи.

Сильное кровотечение изъ носа, кровавый кашель, усиленное лѣситное отишненіе, или гемороидальное теченіе, не только не рѣшающи горячки, но и почитаются чрезвычайно вредными, поелику много способствуютъ переходженію оной въ гнилую горячку.

То же самое разумѣшся и о слюнощечніи, хотя оно можетъ иногда разрѣшить какое либо мѣстное скопленіе, і чрезъ шо доспавитъ больному нѣкоторое облегченіе; однако настоящій переломъ трудно посредствомъ его совершающи.

Что касается наконецъ до прочихъ исходовъ сей горячки, то они суть слѣдующіе:

а) Болѣзненные, какъ шо: или гнилая первная горячка, или воспаленіе легкихъ

мозга, кишечка, шулапъ, или рожа, просо-видная сыпь и другія воспаленія и вереды на кожѣ, или опухоли железъ, какъ то: опухоль крыльцовыхъ и шейныхъ железъ, или совершенное почти бездѣйствіе кишечнаго канала и печени, или запоръ печени и селезенки, или изнуришельная первая лихорадка.

b) Смертельные, каковы супъ: гнойная чахошка легкихъ, неизлѣчимое органическое поврежденіе какихъ либо брюшныхъ внутренности, антитоновъ огонь мозга, пострѣль, сонная немочь, удущливый капаръ и проч.

Предсказание.

§ 44.

Желчная горячка гораздо опаснѣе воспалительной.

Болье или менѣе счастливое предсказание зависиши здѣсь преимущественно отъ того, въ какомъ состояніи находилось прежде горячки оправленіе брюшныхъ внутренности, сила пищеваренія и пищанія. Чѣмъ болѣе то разспроено, а сіи ослаблены были, тѣмъ хуже, и напрощивъ —

Чѣмъ менѣе и умѣреннѣе спраданіе брюшныхъ внутренности въ сей горячкѣ, тѣмъ лучше.

То же самое бываешъ, елико горячка не сопровождается ни какимъ мѣсшимъ

*

въ пѣль спраданіемъ, напримѣръ: воспаленіемъ и проч., исключая шокмо нѣкоторое поврежденіе желчной системы.

Зимою, весною и въ началѣ лѣта, горячка сія не споль опасна, какъ во время самаго лѣта и въ началѣ осени.

Дѣшамъ, спарикамъ и вообще людямъ слабаго желчнаго temperamentа гораздо опаснѣе, нежели юношамъ и мужамъ.

Чѣмъ болѣе лихорадочный пароксизмъ дѣлаешь перемежки, тѣмъ лучше предсказаніе, а чѣмъ раньше онъ возвращается, темъ хуже.

Чѣмъ болѣе страждущій имѣетъ по зывъ на пищу, темъ лучше; но чѣмъ болѣе онъ умаляется, и чѣмъ болѣе оказываются явленія поврежденнаго пищеваренія, темъ хуже.

По сему

Очень сильная жажда, чувство жженія въ кишечномъ каналѣ, постоянная боль въ правомъ боку, или въ другомъ мѣстѣ, красная моча въ маломъ количествѣ, раздущое брюхо, съ бредомъ — чрезвычайно опасные признаки.

Смерть починается неизбѣжною, когда явленія сіи уже обнаружились; но боль и чрезвычайная жажда начинаютъ умаляться, хотя при томъ языкъ осипается сухимъ и бредъ безпрерывно продолжается. Къ шаковому состоянію весьма близокъ аптоновъ огонь.

Равнымъ образомъ сухій и жгучій

жаръ, такжे частый проливный попъ, и случающіяся шопчась при появлениі горячки накожныя сыпи не благопріяш-
спвующъ предсказанію.

Чѣмъ менѣе признаковъ приближенія къ гнилой, первной и воспалительной желчной горячкѣ, тѣмъ счастливѣе предсказаніе.

П р и ч и н ы.

§ 45.

Обыкновенныя вліянія, преимуще-
ственno располагающія и при продолжи-
тельномъ или сильномъ или совокуп-
номъ съ другими причинами дѣйствіи,
производящія желчную горячку, суть:

1) Жаркій климатъ и жаркій воздухъ,
а особенно, когда онъ напичканъ влаж-
ными и гнилыми испареніями.

2) Весьма непостоянnyй, особенно хо-
лодно-влажный климатъ и осенне время
года.

3) Повальные заразы.

4) Продолжительные душевые возму-
щенія, какъ то: печаль, спрахъ, вражда,
гнѣвъ, досада, домашнія беспокойства.

5) Чрезмѣрное напряженіе шѣлесныхъ
и душевыхъ силъ, напримѣръ: долго-
продолжительное ночное бдѣніе.

6) Чрезмѣрная попечность шѣлесныхъ со-
ковъ, послѣдуемая огнь кровопусканія,

слабительныхъ и проносныхъ, слюнотечения и кровошечения.

7) Голодъ, худая и испорченная или вовсе неупотребительная пища.

8) Всѣ сильные болѣзненные припадки въ шѣль, наипаче сильно болящія раны, или съ болью сопряженный ревматизмъ, либо ломоша.

Лѣченіе.

§ 46.

При лѣченіи желчной горячки должно обратить вниманіе на слѣдующія показанія:

А. Въ началѣ горячки и при умѣренной спѣчи оной избѣгая произведенныхъ ее причинъ, нужно соблюдать въ щечности показанную при воспалительной горячкѣ діету и употреблять расширенную пищу, кисловатые напитки и проч.

Б. Если горячка давно продолжается или сдѣлалась сильною и вредоносными веществами въ большемъ или меньшемъ количествѣ накопились въ брюшныхъ внутренностяхъ, то надлежитъ сперва испражнить оные.

Для сего нужно имѣть щечное пониманіе о признакахъ, по которымъ можно различить и узнать, содержащіяся ли вредоносные вещества.

а) Въ желудкѣ, для чего нужно рвотное или онъ

б) Въ кишкахъ уже заключены, въ какомъ случаѣ должно употребиши слабительное.

§ 47.

1) Признаки вредоносныхъ веществъ въ желудкѣ, сущь слѣдующіе: чрезвычайно нечистой, желтой, буроватой, сѣребурый или черноватой языкомъ. Покрывающая его нечистота, рыхлая. Вкусъ весьма горький, или гниловатой, и испускаемые вѣпры необыкновенного рода. Большой имѣеть отвращеніе отъ всякой пищи, наклонность къ рвотѣ, а не рѣдко даже и самую рвоту. Онъ чувствуетъ также или головную боль, или напряженіе во лбу, или головокруженіе. Въ ложечкѣ примѣчаются различные непріятныя чувствованія, какъ-то: чувство полноты въ оной, не рѣдко съ болью, съ чувствительными желудочными судорогами и жестокою тискою соединенное. Моча обыкновенно имѣеть цвѣтъ шафрану подобный, и сверхъ великаго беспокойства, спрѣждущій чувствуетъ себя крайне обезсиленнымъ. Средства, нужные для сего, сущь рвотные, и изъ домашнихъ наиболѣе рекомендуемыя.

а) Крѣпкий настой ромашки, всякую четверть часа пленный и съ нѣкоторымъ количествомъ коровьяго масла, по одной

чашкѣ до шѣхъ поръ пить, пока воспослѣдуешь рвота. Сей наспой заслуживаешь преимущество предъ всѣми другими средсивами, въ шѣхъ наипаче слуяихъ, гдѣ въ желудкѣ накопившіяся вредныя вещества очень головы уже къ изверженію, и по тому въ семъ случаѣ другое сильнѣйшее рвотное болѣе вреда, нежели пользы причиняешьъ. Можно также употреблять средсивы, означенныя подъ № 9 и 10.

б) Когда вредоносныя вещества въ желудкѣ не очень подвижны и не успупаютъ выше упомянутымъ средсивамъ, то вѣрнѣе можешьъ подать помощь въ семъ бѣлой купоросѣ, коего по грану (величиною въ ячменное зерно) всякую четверть часа раза три, или четыре принять должно, запивая шептымъ ромашковымъ наспоемъ.

с) Но иногда случается, что при всѣкомъ даваемомъ больному рвотномъ средсивѣ, не происходитъ рвота, хотя всѣ признаки къ тому имѣются. Причина сему находится въ болѣзненной бездѣйственности желудка, которую сколько возможно скорѣе надлежитъ уничтожить. Къ сему съ большою пользою можешьъ служить шпанскихъ лукѣ пластырь, прикладываемый къ желудочной сторонѣ (ложечкою называемой). Когда сей пластырь на приложенномъ мѣстѣ начнешь причинять жженіе, то въ сie

время давашь подъ б) упомянутое рвотное изъ бѣлаго купороса.

д) Показанное въ послѣднемъ случаѣ рвотное, можно сдѣлать также скорѣе и сильнѣе дѣйствующимъ чрезъ то, еспѣли бѣлой купоросъ будешь принимаемъ съ нѣкоторымъ количествомъ крахмала (наприм. съ 10 гранами).

§ 48.

2) Признаки вредоносныхъ веществъ въ кишкахъ. Здѣсь чувствуешь спраждущій напряженіе и боль вокругъ пупка, колику и раздутие брюха; при чемъ часто исходягъ вѣпры, кои, шакъ какъ и испражненія низомъ, имѣющія шемной цвѣтъ, чрезвычайно испорчены и вонючи; моча мутная и слизистая, болезнѣй чувствуешь боль въ бедрахъ, колѣнахъ и спинѣ; а особенно въ спиронѣ кресица съ чрезвычайною слабостію въ ногахъ и преимущественно въ колѣнахъ.

Необходимыя здѣсь средства должны быть слабительныя, и изъ шаковыхъ наиболѣе полезны слѣдующія:

а) Винный камень. Свари два ложа винно-каменной соли (креморшаршара) въ одной бушылкѣ воды и попомъ давай больному сего опвара въ день по чашкѣ, въ началѣ горячки и при умѣренныхъ пріпадкахъ оной. Или давай слабительное подъ № 11.

б) Еспыли сіе недоспашочно, шо расшвори два лоша Глауберовой Аспраханской или Сибирской соли въ половинѣ бушылки воды, и давай больному пить по одной чашкѣ сего расшвора чрезъ шри, или чешыре часа.

с) Еспыли же и сіе неудовлешиоришельно, шо расшвори два лоша Глауберовой или другой соли и шри лоша изъ черносливъ пригоповленного киселя въ половинѣ бушылки воды, и давай онаго больному всякой часть по получашкѣ, до шѣхъ поръ, пока воспослѣдуешь надлежащее испражненіе.

д) Когда и сіе средство не окажеть ми какого дѣйствія, въ то время возми Александрійскаго листа і лопть, Глауберовой соли и изъ черносливъ пригоповленного киселя, каждого по два лоша, налей на оные полбушылки кипячей воды и давь посюдѣи полчаса, процѣди; все сіе больной долженъ принять въ день.

С. Испразниши такимъ образомъ вредныя вещества, должно приспупиши къ укрѣплению внутренности для воспрещенія новаго накопленія оныхъ веществъ, чио удобно можешъ бысть выполнено.

а) Употребленіемъ полыннаго отвара, пригоповляемаго слѣдующимъ образомъ: ввечеру ложась спать, налиши одинъ лопть полынной травы двумя чашками холодной воды, въ слѣдующее утро воду сию слизиши, пошомъ сю же траву съ полови-

ною бушылки воды варить и, по охлаждении, употребить весь сей отваръ въ день, давая больному по получашкѣ; или

б) *Настойкою горькихъ и пряныхъ средствъ*, какъ-то: вахты прилисшиной, верхушекъ золотопысячника, ромашковыхъ цветковъ, померанцовой корки безъ внутренней белой ея части и семень Волосского укропа, коихъ каждого должно взять по одному ложку, срѣзать все сіе вмѣстѣ въ малые кусочки, налишь пошомъ бушылку кипячей воды на оныя и наспаивать въ продолженіи 12 часовъ, а послѣ болѣй долженъ принимать сіе чрезъ два часа по получашкѣ.

с) Къ сему намѣренію можешь также служить наливка кудряваго волчца, ш. е. одинъ ложкъ сухихъ листьевъ сей привети и золотникъ корицы, налишь половиною бушылки холодной воды, наспаивать все сіе вмѣстѣ опять 6 до 8 часовъ, попомъ процѣдиши. Все сіе долженъ употребить больной въ одинъ день.

Нѣкоторыя замѣчанія.

§ 49.

Если рвота и поносъ усиливаются въ сей горячкѣ до чрезмѣрности, что оные должно остановить.

При чрезмѣрной рвотѣ оказывають пре-
восходное дѣйствіе припарки, составлен-

мые изъ разныхъ частей проскурнячного корня, ромашки и льняныхъ семянъ и прикладываемыя къ шому мѣсту, гдѣ лежитъ печень (къ правому подреберью) и желудокъ (къ грудной ложечкѣ), также теплые ванны и промывашельные изъ настоя ромашки и овсяной крупы съ добавленіемъ льнянаго масла и меду.

Ешьли показанныя средства не доспавляющъ ни какогѡ облегченія, то совершенное воздержаніе отъ пищи и питья можешь пріостановить такую рвоту.

Въ семъ случаѣ нужно покмо дѣлать каждый день промывашельные изъ молока.

Чрезмѣрный поносъ удобно украшающъ всасывающія средства, к. п. мѣль или раковые жерновки, сперпые въ мелкій порошокъ и принимаемые чрезъ два часа по прѣшней части золопника съ однимъ граномъ камфоры, либо мушкапнаго орѣха.

Холодная или перемежающаяся лихорадка (шрясучка лихоманка).

§ 50.

Холодною или перемежающеюся лихорадкою называется по болѣзненнное состояніе, которое обнаруживается сперва болѣе или менѣе сильнымъ ознобомъ, пошомъ жаромъ, а за симъ повсемѣсян-

нымъ пошомъ, по окончаніи коего слѣдуетъ почти совершенно свободное со-
сполніе опь всѣхъ болѣзненныхъ припад-
ковъ, или какъ обыкновенно говорится,
свободное опь лихорадки между-время.

Симъ различающіяся перемежающаяся лихорадка опь всѣхъ предыдущихъ огне-
вицъ, и по шаковымъ свойствамъ при-
нимается за собственныій родъ оныхъ.

Пароксизмы ея, или порядокъ, наблю-
даемый лихорадочными припадками, или
свободные опь лихорадки промежутки
бывающіе очень различны, а именно:

1) Или лихорадочные припадки возвра-
щающіеся опредѣленно чрезъ всяkie 24 ча-
са, и тогда называемая лихорадка *одно-
дневною*.

2) Или приспупы ея (*paroxismi*) появ-
ляющіеся чрезъ день, и тогда называемая
она *третьедневною*.

3) Или лихорадка обнаруживающіе свои
припадки чрезъ два дня, и въ то время
именуемая *четвертодневною*.

Впрочемъ, хотя порядокъ наступленія
припадковъ сихъ лихорадокъ различенъ,
однако онъ имѣющіе опредѣленныя общія:

Явленія и родъ теченія.

§ 51.

1) Предъ наступленіемъ вообще примѣ-
чающія шѣ же припадки, какіе и при про-

чихъ лихорадкахъ: чувство пияжески, усталость, вялость, и т. д. Преимущественно же оказывается давление и чувство полношы въ ложечкѣ, худой вкусъ съ чувствомъ пустоты въ желудкѣ, нечистый языкъ, отвращеніе отъ пищи, особенно мясной, поперемѣнное чувство холода, называемое дрожью, при чмъ ноги и другія части синѣють.

2) *Во время наступленія.* Сie время перемежающейся лихорадки раздѣляется на при перемежки, заключающія въ себѣ все течение сей лихорадки.

а) *Первое время тетенія* ея начинается ознобомъ, который сначала оказывается постепенно въ членахъ, блѣдносью лица, посинениемъ ногтей, холодносью рукъ и ногъ, а постепенно переходитъ уже въ повсемѣшный ознобъ, при коемъ появляется дрожаніе членовъ, хлопаніе зубами, шупое чувство кожи, скорое и неровное дыханіе, напряженіе въ желудочной спиронѣ и сухость рта. Вкусъ бываетъ слизистый, или горький, жажда сильная, моча часовая и водянщая, пульсъ малый, твердоватый, скорый, или медленный, совершенно почно скрытый и не ровный. Иногда ознобъ переходитъ въ конвульсіи. Припадки сіи вообще продолжаются отъ одного до четырехъ часовъ.

б) *Второе время тетенія* есть досажденіе сей лихорадки высокой ея степени, и оказывается послѣдующимъ за озно-

бомъ жаромъ. При переходѣ озноба въ жаръ появляется рвота, головная боль, сильная боль въ спинѣ и пояснице, жгущая жажда, и большою часію жгучая, сухая шеплоша по всей поверхности тѣла. При томъ жилобеніе тошнитъ дѣлается ускореннымъ и равномѣрнымъ, жажда усиливается; дыханіе еще болѣе затрудняется и ускоряется; моча получаетъ темнокрасный цвѣтъ, и бываетъ мутнѣе, густѣе и пр. д. Сие время продолжается обыкновенно опять прѣхъ до шести часовъ.

с) *Третіе времена теченія*, или уменьшеніе лихорадки оказывается потоломъ, какъ собственнымъ переломомъ оной; при чёмъ кожа дѣлается влажною, жажда, сухость рта и языка уменьшаются, пульсъ бываетъ опять мягкий, полный, волнообразный; моча дѣлается кирпичного цвѣта опять; самый постъ клейкий имѣетъ кисловатый запахъ и проч. Сие время продолжается два или четыре часа; часто же и болѣе того.

Сверхъ сего прежде упомянутые по урочному возвращу (*typus*) раздѣленные роды перемежающейся лихорадки, опиццаются еще одинъ опять другаго нѣкошо-рыми особливыми ихъ свойствами, какъ шо:

1) *Однодневная перемежающаяся лихорадка* начинается обыкновенно по ушру, а иногда и подъ вечеръ; ознобъ ея умѣ-

рениѣе, жаръ жгучій и долго продолжающійся; случаешся наиболѣе весною и продолжающейся вообще 14 дней.

2) Третьюедневная обнаруживается обыкновенно въ полдень, имѣешь сильный ознобъ, большой и жгучій жаръ, великую жажду и головную боль, оканчивающейся пятымъ, седьмымъ, или девятымъ пріпадкомъ, легко дѣлаешь возвращены, рождающейся чаще всего весною и продолжающейся обыкновенно три недѣли, а не рѣдко и нѣсколько мѣсяцевъ, наипаче при неблагопріятствующей погодѣ.

3) Четвертодневная начинается обыкновенно подъ вечеръ, сопровождается чрезмѣрно сильнымъ ознобомъ и подобнымъ жаромъ, склонна къ возвращеніямъ, происходящимъ болѣею часію осеню при влажной погодѣ и продолжающейся шесть недѣль, нѣсколько мѣсяцевъ и даже цѣлый годъ.

Прочіе роды сей лихорадки, или раздѣленія оной, болѣе касающіяся до практическихъ врачей, опущающейся по основательнымъ причинамъ.

Р А С П О З И ВА Н И Е .

§ 52.

Существенные опличительные признаки перемежающейся лихорадки со-
ставляютъ:

1) Сильный ознобъ, сопровождаемый дрожаниемъ членовъ, хлопанiemъ зубами, посинениемъ ногшей и проч.

2) Послѣдующій за ознобомъ жаръ, который обыкновенно оканчиваеisя по всемъ спинымъ потомъ и

3) Болѣе или менѣе продолжительная перемежка, или свободное отъ лихорадки между-время.

И с х о д ы.

§ 53.

Собственныи и настоящій переломъ перемежающейся лихорадки есть сопровождающій ону попъ. При всемъ томъ однажды, если лихорадка ся не переходитъ въ здоровое состояніе, то оканчивается различнымъ образомъ. Обыкновеннѣйшее ея

1) Болѣзенные исходы супъ: водяная болѣзнь, завалы брюшихъ внутренностей, изнуришельная лихорадка, совершенная гипохондрія, накожные болѣзни, уменьшение зрѣнія, трудное слышаніе, спинная сухотка, медленное испощеніе тѣла.

2) Смерть послѣдуетъ или отъ поспрѣла, конвульсій, или отъ аппонова огня какой либо особенно при сей лихорадкѣ пораженной части тѣла.

П р е д с к а з а н і е.

§ 54.

Такъ какъ лихорадка ся или въ самомъ
Часть I.

началъ, или въ продолженіи своеи мозгъ воспринимашъ различныя свойства, какъ шо: она можетъ бысть, или воспалительного, или желудочнаго, желчнаго, или гнилого, или нервнаго рода, шо и предсказаніе ея, смотря на воспринятое ею свойство, можетъ бысть заимствовано изъ предсказаній, предложенныхъ уже порознь при вышеупомянутыхъ родахъ горячекъ.

А къ какому преимущественно изъ упомянутыхъ родовъ горячекъ относится перемежающаяся лихорадка, наилучше узнать можно по предложеніемъ при оныхъ и съ собственными признаками перемежающейся лихорадки соединеннымъ явленіемъ.

Впрочемъ лихорадка сія имѣеть еще собственныя свои предсказанія, именно:

Самое лучшее предсказаніе оной можетъ бысть въ шо время, когда она совершенно повсемѣсна, менѣе шого, если при ней какая либо часть особенно страждешь и шѣмъ менѣе, чѣмъ важнѣе и нужнѣе къ поддержанію здоровья и жизни таковая часть бываешьъ.

Трѣпъедневная лихорадка лучше, нежели ежедневная и четырехподневная. Ежедневная легко переходитъ въ горячки, а четырехподневная въ хроническія болѣзни. Еслили четырехподневная перемѣняется въ непрерывную горячку, то она обыкновенно смертельна.

Случающаяся во время весны перемежающаяся лихорадка, лучшее можешь имѣть предсказаніе, нежели во время осени.

Чѣмъ болѣе во время ея приспупа жаръ прибавляется, а ознобъ уменьшается, шѣмъ болѣе приближается она къ воспалительной лихорадкѣ; а напропивъ показываешь мало по малу увеличивающееся расположение къ изнуришельной лихорадкѣ.

Когда при лихорадочномъ пароксизмѣ не оказывается никакого поса, то сіе предвѣщаешь весьма продолжительное течение лихорадки.

Лихорадки съ чрезмѣрнымъ аппепитомъ и всегда въ опредѣленный часъ возвращающіяся, упорны къ излѣченію.

Лихорадки, правильное течение имѣющія, удобнѣе излѣчиваются, нежели неправильное.

Хорошимъ признакомъ служишь то, когда шаковая лихорадка всегда позже появляется, нежели ея предшедшій пароксизмъ былъ, а напропивъ худымъ.

Чѣмъ болѣе примѣчаешься неповрежденное пищевареніе больного, шѣмъ прежде должно ожидать всмощеспиванія.

Молодыя полнокровныя особы удобнѣе могутъ бысть излѣчивамы, нежели слабыя и преспарѣллы.

Опасность уменьшается, еслили ежедневная и четырехдневная переходашь въ трехъедневную лихорадку.

Перемежающіяся лихорадки легко дѣлаются злокачественными; слѣдственное предсказаніе чрезвычайно худое, когда онъ появляется въ жаркое и влажное лѣто, за коимъ послѣдуетъ сырая осень, и шотчасъ въ началѣ ихъ оказывается великое безсиліе, оглушеніе головы и признаки жѣлчной горячки.

Причины.

§ 55.

Хотя люди всякаго возраста и сложенія могутъ получить перемежающуюся лихорадку; однако же наиболѣе тѣхъ поражаестъ она, кои уже одинъ разъ имѣли ее, кои ведутъ болѣе сидячую жизнь, употребляющія клейкую пищу, живущіе въ нечистотѣ и влажномъ воздухѣ, подвергающіяся часто проспудѣ, спраждущіе накожными, или послѣ перемежающейся лихорадки оспавшимися болѣзнями. Женщины, спрадающія во время беременности чешыредневною лихорадкою, рождающіе дѣтей, подвергающихся также сей болѣзни.

Большая часть перемежающихся лихорадокъ свирѣпствующія повально, чаще весною и осенью. Но собственное, споспѣшеспившее къ тому свойство воздуха и погоды, намъ не извѣстно: случаящіяся онъ какъ при мокрой, такъ при жаркой и сухой, какъ при перемѣнчивой,

шакъ и при обыкновенной погодѣ. Наи-
чаще господствующій перемежающіяся ли-
хорадки въ влажныхъ и мокрыхъ спра-
нахъ, особенно шакихъ, кои наполнены
гнилыми испареніями, освобождающими-
ся изъ болотъ, озеръ и проч.

Наконецъ могутъ еще перемежающіяся
лихорадки произраждашься иногда отъ
сильныхъ напряженій душевныхъ и тѣ-
лесныхъ силъ, спраспей, часшаго крово-
пусканія, слабищельныхъ и другихъ осла-
бляющихъ средствъ, отъ проспуды,
вязкой и грубой пищи, сыру, рыбы,
свинаго мяса, отъ накопившейся въ же-
лудкѣ и кишкахъ слизи, желчи, глисповъ,
отъ вогнанныхъ виупрь сыпей, холод-
ныхъ и теплыхъ ваннъ, голоду и др.
под.

Свирѣпствующія повально, особенно
нервнаго и гнилаго свойства лихорадки
заразищельны и приспають наипаче отъ
попу больнаго. По сему въ шакое время
весьма опасно спать съ больнымъ, одер-
жимымъ перемежающеюся лихорадкою
подъ однимъ одѣяломъ, или надѣвать
бѣлье и плащье его, напишанное попомъ.

Лѣченіе.

§ 56.

Діэта. Сей въ перемежающихся лихо-
радкахъ вообще опредѣлишь не лѣзя: она

должна быть сообразна различнымъ об-
спошельствамъ. Еслыли лихорадка вос-
палишельного свойства (что можно у-
знать изъ распознаванія предложеннаго
при воспалительной горячкѣ § 16), то
діэша должна быть умъренная, иль-
сколько пишательная и прохладжающая;
если же она гнилого или первнаго свой-
ства, то и діэша должна быть шакая,
какова предложена при упомянутыхъ
родахъ горячекъ.

Ежедневная и претъедневная лихорад-
ка требуютъ умъренной, а четьверто-
дневная крѣпильной діэши. Полнокровныя, здоровыя и крѣпкія особы дол-
жны соблюдать голодную, а тощія и
слабыя болѣе пишательную діэшу. Над-
лежитъ сообразоваться также съ пище-
вареніемъ и аппепицомъ больнаго: гдѣ
сего послѣдняго ильть, тамъ пища болѣе
вреда, нежели пользы приноситъ. При
слабомъ желудкѣ, накопленіи мокроты
въ ономъ употреблять сельди, анчоусы,
пряности, перецъ, горчицу, хрень; а при
изобиліи желчи, покрытомъ желтыми
нечистопами языкѣ, давать кислую ве-
щества и распищательную овощь; при
большой слабости, холодѣ и недостат-
ки крови, мясо, яицы, пиво и вино.
Когда больной имѣетъ хорошій аппе-
тизъ и пищевареніе, то должно упо-
треблять ему до насыщенія легкую и
пишательную пищу, к.т. мясная похлеб-

ки, бѣлое мясо, легковаримыя огородныя овощи, хорошій хлѣбъ и чишь пиво и вино. Онъ долженъ єсть одно кушанье часишо, но мало, медленно пережевывашъ, не обременяшъ себя и послѣ кушанья спаши, сообразуясь при томъ съ обыкновеннымъ порядкомъ своимъ касательно принятія пищи. Если больной имѣшъ побужденіе къ какой нибудь пищѣ, то можно оную позволиши ему. Жиръ, пироги, шелушные овощи, сыръ, швердая и жирная рыба, копченое мясо, свиное мясо, гуси и утки, соспавляющъ здѣсь совершенно вредную пищу.

Больной долженъ находиться въ движениі, производя оное при худой погодѣ въ домѣ, а при хорошей на свободномъ воздухѣ. Въ разсужденіи одежды, поспѣли и комнапной теплоподачи, нужно ему предохранять себя надлежащимъ образомъ отъ холода, спаши умѣренно и не во время ожесточенія лихорадки.

Лѣченіе перемежающейся лихорадки должно быти двоякое: во время приступа лихорадки и внѣ онаго.

§ 57.

Лѣченіе во время лихорадочнаго приступа.

Предъ наступленіемъ лихорадки, больной не долженъ употребляшъ много и никакой трудноваримой или горячипель-

ной пищи и напитковъ. Полный желудокъ запрудняешь дыханіе въ лихорадкѣ и пища не перевариваешься; горячительные вещества умножаютъ жесшокость присступа и могутъ лихорадку перемѣнить въ горячку.

Во время озноба покрываешь больнаго шеплою одеждю. Часты, кои наиболѣе хладѣюшъ, наприм. ноги, можно нагрѣвать посредствомъ теплого сукна, мѣшечковъ, наполненныхъ опрубыми и со судовъ съ теплою водою. Однако же должно слишкомъ много нагрѣвать воздухъ въ комнатѣ больнаго.

Спраждущему даешь какой нибудь теплый нѣсколько пряній напитокъ, напримѣръ: чай изъ мелиссы, лимонныхъ корокъ и проч. въ малыхъ приемахъ. Иногда онъ имѣешь сильную тошноту и наклонность къ рвотѣ; въ такомъ случаѣ предписывается тепловатое питье и въ большомъ количествѣ.

При очень сильномъ и продолжительномъ ознобѣ, сверхъ показанныхъ средствъ, можно напирать больнаго фланелью или сукномъ.

Если ознобъ переходитъ въ жарѣ, то соразмѣрно умноженію его должно опинимашь теплую покрываала, плащѣ, постель и проч., а доставляешь спраждущему прохладный воздухъ и давашь пить въ обильномъ количествѣ прохладительного и холоднаго питья, какъ шо: лимонаду,

опвару ячменной крупы съ виннымъ камнемъ, уксусомъ или кисло-медомъ. Опъ сна, сколько возможно, надлежишъ опровергать болниаго.

Въ воспалительной лихорадкѣ, при со-
приженіи ея съ мѣстнымъ воспаленіемъ,
съ кровохарканіемъ, въ здоровомъ пол-
нокровномъ шѣлѣ, при очень сильной
шепени жара, можно во время при-
ступа лихорадки открыть кровь, а по-
томъ поспупашь шакъ, какъ сказано
при лѣченіи воспалительной горячки
(§ 20).

Когда наступитъ потъ, то больной
долженъ содержать себя иѣсколько шеп-
лѣ и пить чай изъ бузинныхъ цвѣтовъ,
наиначе, если пошь не очень обильный.
Англичане въ Западной Индіи пьютъ
для сего намѣренія разжиженный пуншъ.
Слишкомъ сильный пошь ослабляетъ
шѣло и требуетъ для уменія своего
прохладнаго содержанія и употребленія
настою шалфея.

По приостановленіи поша и по совер-
шенномъ окончаніи лихорадочнаго при-
ступа, выширается спраждущій шеп-
лою фланелью, надѣваешь сухое и шеп-
лое бѣлье и можешь спать, поелику сонъ
есть въ семъ случаѣ наилучшее успокои-
вающее средство.

§ 58.

Лѣченіе во времія перемежки.

Поелику перемежающіяся лихорадки могутъ имѣть шѣ же свойства, какими оказываются вообще горячки, какъ что онъ могутъ быть воспалительныя, желудочныя, гнилые и нервныя, то въ началѣ ихъ нужно разсмотрѣть, съ какимъ именемъ родомъ горячекъ сходствуетъ существующая лихорадка, и назначишь сперва по лѣченію и діашу, какія при каждой изъ упомянутыхъ горячекъ предложены; пономъ уничтоживъ главное ихъ свойство, если онъ не проходяшъ, прѣбѣгнешь къ уничтожающимъ лихорадку средствамъ. Изъ щаковыхъ вѣрнейшія и безопаснѣйшія сушь:

А) *Черный перецъ.* Средство сіе дается два раза въ день по 6 цѣлыхъ зеренъ, прибавляя каждый день по одному зерну и восходя такимъ образомъ до 18 и болѣе, смотря по упорности болѣзни. Изъ многочисленныхъ дословѣрныхъ опыта известно, что перечные зерна въ лихорадкахъ совершенно замѣняютъ хину, и что излѣченія ими лихорадки гораздо рѣже возвращаются, нежели вы-
пользоваемая хина.

В) *Желтникъ или желтое кожевенное деревцо (Rhus cotinus).* Сіе опечественное расщепленіе, употребляемое на

разных домашнія издѣлія, оказалось по новѣйшимъ наблюденіямъ врачей, весьма дѣйствительнымъ въ лихорадкахъ. Для сего намѣренія избираюся обыкновенно листья и корка сего деревца. При употребленіи ихъ нужно соблюдать слѣдующія правила:

1) Они должны быть исперты въ самыи мелкій порошокъ на подобіе муки или пыли.

2) Пріемъ шакового порошка для взрослыхъ людей не долженъ быть болѣе полузолотника.

3) Порошокъ шаковой надлежишь всегда употреблять съ водою или виномъ, слѣдующимъ образомъ: всыпавъ порошокъ въ рюмку или чайную чашку, налиши на оній Кизлярской водки или рому сполько, чтобы всего его смочишь; попомъ давши нѣсколько времени поспояши, прибавишь хорошаго винограднаго вина, сколько будешь нужно для разведенія его.

4) За 12 часовъ до лихорадочнаго пріступа больный опиодъ не долженъ ничего ни єсть, ни пить, съ шѣмъ намѣреніемъ, чтобы въ сіе время безпрерывно употребляя порошки,ничѣмъ не воспрепятствовашь надлежащему ихъ дѣйствію.

5) При пріемѣ сихъ порошковъ непремѣнно нужно наблюдать особенный порядокъ въ каждой перемежающейся лихорадкѣ, именно:

а) Вѣ ежедневныхъ лихорадкахъ порош-

*

ки сіи должно начинать за 12 часовъ до лихорадочнаго присступа и дать ихъ не менѣе 12, такъ чтобы послѣдній кончишь за одинъ часъ до лихорадки. Напримѣръ: если лихорадочный присступъ начинается въ началѣ впораго часа по полудни, то первый порошокъ давашь въ началѣ впораго часа по полуночи, а послѣдній кончишь въ началѣ 1 по полудни, безпреспанско употребляя оные чрезъ каждый часъ. Если же лихорадка возвращаешся ранѣе или позже, то, смотря постому, и порошки начинать давашь ранѣе или позже.

б) Въ третъедневныхъ лихорадкахъ должно давашь порошки на другой уже день послѣ ихъ присступа, до обѣда 6 и послѣ обѣда сполько же. Въ сей день позволяется больному обѣдать и ужинать. Постомъ въ лихорадочный день за 10 часовъ до присступа, надлежишь употребиши не менѣе 10 порошковъ и опинють уже не позволяшь ничего ни пиши, ни ёспи.

с) Въ четвертодневныхъ лихорадкахъ, въ 1-й и 2-й день послѣ присступа употребляшь до обѣда по шести и послѣ обѣда по спольку же порошковъ. Въ сіи два дни также позволяется обѣдать и ужинать. Постомъ въ лихорадочный день, смотря по времени присступа, начиная за десять часовъ до онаго, дать не менѣе 10 порошковъ, кончивъ послѣд-

ній за одинъ часъ до лихорадки и не позволяя уже въ сие время ничего ни пить, ни ъесть.

С) *Ползучая дубравка* (*Ajuga reptans*). Распространение сие, произрастающее въ нашемъ опечествѣ въ обильномъ количествѣ, со-дѣлалось по новѣйшимъ наблюденіямъ весьма-ма дѣйствительнымъ въ лихорадкахъ, особенно свирѣпствующихъ повально въ южныхъ странахъ Россіи послѣ неумѣреннаго дневнаго зноя и слѣдующаго за нимъ ночнаго холода. Главные припадки перемежающейся лихорадки, показующіе употребленіе сей шравы, суть: слабое сложеніе тѣла, усиленный жаръ или холдъ лихорадочный, слабый и малый пульсъ, сухость во рту и кожѣ. Впрочемъ люди, спраждущіе кровохарканіемъ, геммороемъ или мѣсячнымъ очищеніемъ, родильною горячкою, и женщины во второродной половинѣ своей беременности, должны наблюдать осторожность въ употребленіи сей шравы.

Видъ, въ какомъ можно давать средство сие въ лихорадкахъ, есть слѣдующій:

- 1) Возьми ползучей дубравки, изрѣзанной, два лота, налей на ону вскипаченной воды г фуншъ, дай постоянъ въ тепломъ мѣстѣ, чрезъ полчаса, попомъ процѣди и выпей теплое за полчаса или за часъ предъ присупомъ лихорадки.
- 2) Возьми ползучей дубравки, превращенной въ порошокъ, два лота, желѣзного купоросу ползолопника, Крымскаго или Донскаго

вина і фундъ, наспояшь въ тепломъ мѣстѣ въ продолженіи шести часовъ и пишь въ свободное отъ пароксизмовъ время по рюмкѣ чрезъ два часа.

Для дѣшней, кои по значительной горечи не могутъ принимашь внутрь сего средства, можно употребляшь съ пользою теплые ванны, приготовляемыя изъ сей шравы, или вмѣсто ванны выширашь все шѣло теплымъ наспоемъ оной.

D) Животная студень или сполярный клей. Пропиву лихорадочная сила спущени во многихъ странахъ Европы подтверждена безчисленными дословѣрными опытами. Ее употребляюшь слѣдующимъ образомъ: 2 съ полов. лопса живопицкой студени или сполярнаго клею растворяюшь на особомъ огнѣ въ чешырехъ лопахъ воды, попомъ прибавивъ для вкуса какихъ либо пряностей и сахару, раздѣляюшь сие количесшво на три части и даюшь первую часть до наступленія лихорадки, а впоруко по прошествіи десятии, преплю же по прошествіи 20 минутъ послѣ лихорадки. Впрочемъ можно давать всѣ сіи при приема чрезъ чепверть часа во время перемежки, а не во время присступа. Вмѣсто сполярнаго клея можно употребляшь студень изъ шеляшины, говядины, курицы и костей.

E) Стѣнной мохъ *Lichen parietinus*. Мохъ сей расщепить на пняхъ деревъ, особливо на спарыхъ черепичныхъ кровляхъ. Со-

бравъ оный, надлежиши выслушаши, преврашиши въ порошокъ и употребляши почно такъ, какъ желтое кожевенное деревцо.

F) Ромашковый тай, почаще употребляемый, наилучше съ нѣкоторымъ прибавлениемъ вина.

G) Хорошее, горькое, на растеніяхъ настоящое вино, къ коему можно еще прибавляши корицу, горчичный порошокъ, гвоздику и кардамомъ (см. лѣк. сосн. № 12).

Если наконецъ лихорадка оставиши, то всячески надлежиши остерегаться ея возвращовъ. Лучше продолжашь нѣсколько недѣль употребленіе штого средства, комъ врачуема была лихорадка или вышеописанного вина, и хотя бы больной чувствовалъ себя совершенно здоровымъ, не полагашься на то, но употребляши прежнее средство. Если уже послѣ сего не окажется ни какихъ признаковъ возвраща, то посполитно можно согласиши на послѣдовавшее выздоровленіе. Однодневной лихорадкѣ нужно по крайней мѣрѣ семь дней, трехъдневной чешыринарадашь, а чешвершодневной чешыре, или шесть недѣль, прежде, нежели можно думашь совершенно безопасно о ихъ возвратѣ.

О ВОСПАЛЕНИЯХЪ ВООБЩЕ.

§ 59.

Воспаленіемъ называється особенное болѣзньенное состояніе какой нибудь части тѣла, сопровождаемое красношою, опухолью, жаромъ и болью съ горячкою или безъ оной.

Примѣтаніе. Сіи однакожъ явленія не при всякомъ воспаленіи показываются, а часто даже и совсѣмъ ихъ не бываєтъ, напримѣръ: при воспаленіяхъ внутренностей, гдѣ не рѣдко находишся шокмо не большое давление и необыкновенное чувство въ воспаленномъ мѣстѣ. Даже и въ наружныхъ частяхъ воспаленіе иногда лежитъ споль глубоко, что непримѣшно ни красноты, ни опухоли, а только чувствуешься жаръ и біющая боль.

Воспаленія раздѣляються вообще на

1) *Стенитескія* (сильнодѣйствующія) и *Астенитескія* (слабодѣйствующія); первыя содержатся къ послѣднимъ такъ, какъ спеническія горячки къ аспеническимъ.

2) На *скоротетныя* и *продолжительныя*. Первые оканчиваются въ продолженіи семи дней, а послѣднія продолжаются иногда и нѣсколько мѣсяцовъ.

3) На внутрення и поверхностные. Сии последние находятся на поверхности, а первые проникают дальше в существо чашей и обыкновенно переходят в нарывы.

Местопребывание воспалений сосудов, особенно волосные сосуды, т. е. окончания артерий или сосудов, разносящих кровь от сердца ко всем частям тела, и начала вены или сосудов, воспринимающих кровь от всех частей тела и приносящих обратно к сердцу.

Произхождение припадков воспаления можно изъяснить следующим образом:

От раздражения, причиненного в какой-либо части тела, припекает кровь к ней гораздо в большем количестве, и, наполнив волосные сосуды, дает ее красное ~~одинакового~~ (краснота).

Опухоль есть следствие большого притяжения и застопорения крови и рождающегося чрез него разширения воспаленной части.

Жар в воспалении происходит по химико-физическим законам от усиленного жизненного действия и паковой же перемены живой материи.

Боль рождается от растяжения чувственных жилочек, находящихся между волосными сосудами.

Горячка есть следствие умноженного раздражения волосных сосудов. Известно, что волосные сосуды имеют связь с кровеносными сосудами, и умно-

женное раздражение сихъ послѣднихъ со-
ставляєшь существенный припадокъ ог-
невицъ. Слѣдовательно раздражение волос-
ныхъ сосудовъ удобно можетъ сообщить-
ся кровеноснымъ сосудамъ и произвести
горячку. Сие же скорѣе происходитъ,
чѣмъ ближе находящаяся воспаленная часть
къ большимъ кровеноснымъ сосудамъ, на
прим. воспаленіе легкихъ, печени, желуд-
ка и проч. скорѣе причиняетъ горячку,
нежели воспаленіе глазъ, ушей и проч.

§ 60.

*Причины воспаленій соизвѣствующіе раз-
наго рода раздраженія.*

1) *Механическія:* ушибы, проколы, раз-
рѣзы, ущемленія, прижатія, давленія,
шренія и проч. Сии насилия дѣйствуютъ
на нервы и чрезъ то умножаютъ раздра-
жительность сосудовъ. Еспѣ однакожъ
примѣры, что оспрыя вещества находи-
лись въ пѣтль довольно долгое время, не при-
чиняя никакого воспаленія. *Готьеरѣ* раз-
сказываетъ дослопримѣчательный при-
мѣръ объ одномъ молодомъ человѣкѣ, у ко-
тораго вырѣзанъ былъ изъ руки продол-
говатый оспрый кусочекъ спекла, ши-
риною въ нѣсколько линій, который ос-
тавался у него въ продолженіи пяти
лѣтъ, не причинивъ воспаленія. *Фрейерѣ*
вырѣзали изъ груди у одной семидесяти
шестипи лѣтней женщины пять иголокъ,

кошорыя она, будучи еще шесчинадцати лѣтнею девушкою, въ припадкѣ съумасшествія вошкнула въ грудь и шею десять лѣпъ носила ихъ безъ всякой боли.

2) Химіческія раздраженія, к. п. кислоты, щелочи, оспрыя расщепленія, живопиные яды, к. п. укушенія пчель, осъ, змѣи и проч.

3) Воздухъ: холодной, сухой, сквозной воздухъ, съверный и вос точный вѣтеръ послѣ предшествовавшаго разгоряченія тѣла, соспавляющъ главнѣйшую причину воспаленія.

4) Холодъ, особливо, если онъ действуетъ на разгоряченное тѣло.

5) Жаръ умножающъ раздражительность и малѣйшая ожога причиняющъ воспаленіе. Сюда относится также солнечный зной, производящій воспаленіе мозга, жаркій климатъ и жаркое время года, причиняющія удобно воспаленіе брюшныхъ внутренностей.

б) Спрасиши всякаго рода, особливо, сильный гневъ, испугъ, нечаянная радость и проч.

И с х о д ы.

§ 61.

Исходы воспаленій вообще сушь: разрѣшеніе, нагноеніе, опровергніе, водянная болѣзнь и анпоновъ огонь или помертвѣніе.

1) *Разрѣшеніе* есть благополучнѣйшій исходъ воспаленія. Въ здоровомъ тѣлѣ и при умеренной горячкѣ, оно слѣдуетъ послѣ 6 или 14 дней.

2) *Нагноеніе*. Если уменьшеніе горячки и боли окажется, а прочіе припадки остаются въ одинаковой силѣ, то можно ожидать нагноенія. Когда же гной дѣйствительно образовался, то появляется легкая горячка, сопровождаемая ознобомъ, послѣ обѣда. Къ вечеру горячка сія вывѣситъ сильнѣе, сопровождается сухостію во рту и жаждою, а по упру послѣ поша опять послабляется.

3) *Отвердѣніе* нарушаетъ свободное кровообращеніе и всякое оправленіе воспаленной части. Она дѣлается холодною и нечувствительна, увеличивается въ свой объемъ или превращается въ твердое вещества, отъ чего появляются различные болѣе или менѣе шагоспные припадки. Сей исходъ чаше случается въ железистыхъ воспаленныхъ частяхъ, въ флегматическомъ шемпераментѣ, у женщинъ и проч.

4) *Водяная болѣзнь*, съ появлениемъ оной пресѣкаются боли и все прочіе припадки воспаленія. Сей исходъ случается чаше у роженицъ при воспаленіи брюшины (перепонки, одѣвающей брюшный внутренности), а еще чаше при воспаленіи легкихъ; отъ чего происходитъ коропкое

дыханіе, чувство давленія въ груди, поска и припадки удушливости.

5) *Антоновъ огонь и полумертвѣніе*, обнаруживающееся охладѣніемъ, недоспашкомъ чувствительности, упругости и движения, синимъ черноватымъ цвѣтомъ, зловоннымъ запахомъ и увяденіемъ спрѣдущей части.

Лѣченіе воспаленій.

§ 62.

При лѣченіи воспаленій нужно удалишь причины, произведшія ихъ, и спаравшися привесши опяшь въ еспесивное состояніе неправильное жизненное дѣйствіе.

Главное средство соспавляющъ здѣсь

Кровопусканіе. Если больной полнокровенъ, крѣпкаго сложенія, воспаленная часть лежитъ близъ сердца или другихъ важныхъ органовъ, или сама по себѣ важна, воспаленіе ея сопряжено съ сильнымъ жаромъ, напряженіемъ, сухостію и болью, пульсъ швердый, моча малоколичество и красна, то дѣлается общее кровопусканіе изъ руки или изъ ноги.

При проспыхъ наружныхъ воспаленіяхъ можно употреблять мѣстныя кровопусканія изъ самаго воспаленія или вблизи онаго, посредствомъ піявокъ, кровососныхъ банокъ, рожковъ и проч., спосѣвшесивя испеченію крови шепловатыми примочками.

Наружные средства прошиву воспаленій должны быть теплые, влажные и размягчающиеся. Сюда относятся: бузинные цвѣты, проскурничные листы, полченые льняные съмена, маковые головки, овсяная крупа, белый хлѣбъ, винные ягоды, сухія яблоки, свѣжее деревянное или льняное масло, молоко и проч. Вещества сіи кладутся непосредственно на спраждущую часть или близь оной, напримѣръ: при воспаленіи легкихъ, печени, кишекъ и проч. Видъ, въ какомъ употребляются они, избирается по обстоятельствамъ, какъ то: въ видѣ тепловатыхъ припарокъ, ваннъ, паровъ при воспаленіи легкихъ и заднепроходной кишки, въ видѣ полосканья при жабѣ, въ видѣ глазной воды при воспаленіи глазъ, въ промывательныхъ при воспаленіи кишечкъ и проч. Степень теплоты должна быть самая умѣренная и равномерная, по сему лучше употреблять сіи средства въ поспели или покрывая ихъ фланелью.

При нѣкоторыхъ воспаленіяхъ, особенно слабыхъ губчатыхъ частей, послѣ сопряженія, соединенныхъ съ большими изліяніемъ, при воспаленіи мозга, ушибахъ, ожогахъ, холодъ дѣйствуетъ определеннымъ образомъ. Впрочемъ нужно спрашаться о умѣренной спленѣ его, исключая, когда онъ долженъ быть употребляемъ не на самой воспаленной части, на-

прим. въ воспаленіи мозга, гдѣ онъ можетъ быть по сильнѣ.

ВОСПАЛЕНИЕ МОЗГА.

§ 63.

Горячка, соединенная съ неспершимымъ болѣзненнымъ чувствованіемъ свѣта и звука, сильною головною болью, безсонницею и бѣсноватымъ бредомъ, называемая воспаленіемъ мозга.

Оно обыкновенно бываєтъ слѣдствиемъ какой либо другой болѣзни, особенно нервной горячки, впрочемъ можетъ быть также и самостоятельною болѣзнью, при каковой оказываются слѣдующія

ЯВЛЕНИЯ И РОДЪ ТЕЧЕНІЯ.

§ 64.

1) Предъ наступленіемъ еще больной, находясь впрочемъ при хорошемъ здравіи, дѣлается бледнымъ и недовѣрчивымъ, спитъ беспокойно, часто пробуждаясь и содрогаясь, жалуясь на всякаго рода явленія и предшавляющіяся ему привидѣнія и — имѣетъ большую частію печальные сновидѣнія. Во всемъ шѣлъ его примѣчающееся дрожаніе и беспокойство,

не рѣдко онъ дѣлается чрезмѣрно веселымъ и въ движеніяхъ своихъ сильнымъ, глаза его кажутся иногда косыми, недвижимыми, дикими и свирѣпыми, а иногда шемными. При томъ болѣй спрашдаешь головокруженіемъ, а въ ложечкѣ чувствуешь жжение; состояніе сіе продолжается долѣе, или крашче, наконецъ

2) *При наступлениі обнаруживаются уже обыкновенные припадки сей болѣзни, именно: сперва оказывается скоропреходящая дрожь, за кою слѣдуешь необыкновенный жаръ и воспалительного рода боль въ суставахъ, въ спинѣ, глошкѣ и около груди. Потомъ болѣе и болѣе умножается головная боль, страждущій перелеиваетъ всю чувствительность, впадаетъ въ сильное бѣшенство, и при семъ оказывается невѣроятную мышечную силу. Глаза его бываютъ блестящіе, дикіе, недвижимые, или быстро поворачивающіеся, налипшіе кровью и выпученные, лицо красное; ко всякой пищѣ имѣешь онъ опирщеніе, а иногда и рвоту слизистою и зеленоватою матеріею.*

3) *При достижениіи высокой степени бѣшенство усиливается болѣе и продолжается безпрерывно, слухъ дѣлается шруднымъ, языкъ и боевые жилы дрожатъ. При томъ болѣй беспрестанно плюетъ, скрежещетъ зубами, обрываешь или обчищиваешь одѣяло и ловишь мухъ.*

Моча его прозрачна и чиста, какъ обыкновенная вода, а испражненія низомъ имѣюшъ избѣла-сѣрый цвѣтъ. Наконецъ появляющіеся еще подскакиваніе сухихъ жилъ.

4) При умаленіи бѣшенія въ жесщокости и продолжительности уменьшающіяся, соведеніе и присущество духа мало по малу возвращающіяся, кожа дѣлающіяся влажною, моча шемнѣеша и по немногу окрашивается, при томъ оказывается и небольшой позывъ на ъду. Въ сіе время обнаруживающіеся также кровопеченія изъ носа и поносъ.

5) При перемѣнѣ примѣчающіяся преимущественно параличные припадки, обмороки, малый пульсъ, шокса и рвота зеленою, яри подобною машерію; напопытанные глаза, разширенные и совершенно не съуживающіеся зрачки въ оныхъ, слабость во всемъ тѣлѣ, безпрестанное лежаніе на спинѣ, глубокая сонливость, параличъ какихъ либо членовъ, продолжительное сумазбродство, или безчувственность; при томъ болѣйной безпрестанно жуещъ и пускающъ пѣну изо рта.

Р А С П О З Н А ВАНИЕ.

§ 65.

Оптические признаки воспаленія мозга сославшись: а) необыкновенная

ЧАСТЬ I.

чувствительность опть всякого внезапного и скораго прикосновенія и б) же спокая безпрепанная головная боль съ сильнымъ бѣсноватымъ бредомъ и горячкою.

Опть сумасшествія отличающееся воспаленіе мозга шѣмъ наиболѣе, чѣмъ первое не сопровождающееся горячкою и продолжающееся очень долгое время.

И с х о д ы.

§ 66.

Тамъ, гдѣ воспаленіе сіе бываетъ слѣдствиемъ другой болѣзни, особенно нервной горячки, исходы его совершаются сообразно исходамъ существующей при немъ горячки.

А гдѣ воспаленіе сіе оказывается первоначальною болѣзнью, тамъ рѣшающееся оно наиболѣе чрезъ мочу, попѣтъ, кровошеченіе изъ носа, поносъ или геморроидальное шеченіе.

а) Болѣзненные же его исходы суть: глупость, сумасшествіе, меланхолія, шуплость чувствъ, слабоуміе. Лимфатическія опухоли, гнойный накопленія въ какой-либо части тѣла, и

б) Смертельные: пострѣль, анионовъ огонь мозга, сполбнякъ и смертельный судороги.

Предсказание.

§ 67.

Вообще воспаление мозга есть всегда сомнительный и опасный припадокъ; однако же въ семъ случаѣ много зависить отъ рода и возможности излечения той болѣзни, при коей бываеетъ оно припадкомъ.

Обыкновенными признаками смерти могутъ быть здѣсь слѣдующія явленія:

а) Рвота зеленою, яри подобною мацеріею.

б) Безпреспанное течение слюны изо рта, особенно при беспамятии.

в) Дрожаніе или всѣхъ членовъ, или поочерѣнно то въ шомъ, то въ другомъ обнаруживающемся.

г) Рѣдкое испражненіе мочи и кала и блѣдный цветъ обоихъ сихъ экскрементовъ.

д) Совершенно потупленные, напопырщенные неравные глаза.

е) Весьма разширенный при дѣйствіи свѣта не съуживающійся зрачекъ въ глазахъ.

ж) Безпреспанное жеваніе и пѣна вокругъ рта, также временное скрежещаніе зубами.

з) Наконецъ еще сонливость, присоединяющаяся къ сему воспаленію.

Причины.

§ 68.

Сверхъ тѣхъ причинъ, по коимъ воспаленіе можетъ присоединяться къ обыкновеннымъ болѣзнямъ въ видѣ припадка, есть еще особенные, причиняющія самостоятельное воспаленіе мозга. Къ шаковымъ описаніямъ большой солнечный жаръ, особенно при обнаженной головѣ, сильная возмущенія сердца, преимущественно гнѣвъ, злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ и частое пьянство, наружныя насилия, скорая перемѣна холода въ теплому, продолжительное бодрствованіе и значительная степень воспалишельной горячки.

Всѣ сіи вредности гораздо удобнѣе могутъ навлечь воспаленіе мозга итѣмъ людямъ, кои весьма много опьягаютъ себя мыслями, или учебными занятіями, также молодымъ, полнокровнымъ, или опь онаний сдѣлавшимся очень слабыми.

Способъ лѣченія.

§ 69.

Когда воспаленіе мозга приключится опь пьянства, сильного солнечнаго жара, душевыхъ возмущеній, наружныхъ насилий и при томъ у здоровыхъ крѣпка-

го сложенія людей, что необходимо ну-
жно шопчашь сдѣлать

1) *Обильное кровопусканіе*, просшираю-
щееся отъ одного до двухъ фунтовъ, по-
томъ припушшишь къ вискамъ

2) *Піявки*, числомъ отъ 12 до 15, или
поспавиши нѣсколько рожковъ между ло-
пашками и употребляши

3) *Холодные примочки* къ головѣ, лучше
всего изъ шолченаго льда, завязаннаго въ
пузырь. При недоспашкѣ же льда мож-
но обмачивать голову холодною водою,
либо слѣдующимъ расшиворомъ: возьми на-
шашыря и селишры поллоша, разведи въ
бушылкѣ воды и прибавь спаканъ уксу-
са. Примочки сіи оказываюши еще луч-
шее дѣйствіе, если въ то же время при-
вязывашь къ подошвамъ ногъ согрѣшые
кирчи, завернутые въ суконку. Сверхъ
сего должно сдѣлать ему

4) *Промывательное* изъ одного фунта
ромашковаго наспоя и двухъ золотни-
ковъ мыла и поваренной соли, расшво-
ренныхъ въ немъ; а внушишь давашь

5) *Селитру* въ порошкѣ черезъ три ча-
са по 10 гранъ съ ошваромъ перловыхъ
крупъ (см. § 9).

Если по прошествіи 12 часовъ припад-
ки не уменьшашся, то надлежишь повло-
риши кровопусканіе до 1 фунта и болѣе,
смотри по надобности, а послѣ сего при-
ложишь между плечами шпанскихъ мѣхѣ
пластырь и вмѣстѣ къ подошвамъ ногъ

горчичное пѣсто, не оставляя холодныхъ примочекъ къ головѣ и внутренняго употребленія селишры до тѣхъ поръ, пока припадки уменьшаются и спарайся, сколько возможно, о прибытии врача.

Когда же причиною шакового воспаленія описушившая ломота, скрывшіяся сыпи, прекратившійся внезапно гемморой или мѣсячное очищеніе, что надлежишъ, сверхъ употребленія вышеуказанныхъ средствъ, поступить еще шакъ, чтобы онъя болѣзни восстановлены были на первобытныхъ своихъ мѣстахъ. Для сего должно дѣлать шакъ, какъ предложено при лѣченіи воспаленія желудка (см. § 95, № 7).

Если же воспаленіе сіе поразитъ человѣка весьма слабаго, испощенаго, либо одержимаго гнилою или нервною горячкою, то нужно употреблять вышеозначенный способъ лѣченія; но къ кровопусканію и внутреннему употребленію селишры опинюдъ приспупашъ не должно безъ совѣща врача.

Онъ долженъ также наблюдать спротивную діэспу. Особенно надлежишъ ему избѣгать всего, что производитъ сильное впечатлѣніе на мозгъ, какъ то: трогательной музыки, чтенія книгъ о разительныхъ предметахъ, большаго жара и холода, равно какъ и плошскаго совокупленія.

Сверхъ этого не оставлять шаковыхъ

больныхъ безъ присмотра, поелику легко
могущъ происходить возвращеніе болѣзни.

ВОСПАЛЕНИЕ ГЛАЗЪ.

§ 70.

Воспаленіемъ глазъ называется то болѣзненное состояніе, которое оказываетъ большою или меньшою краснотою на глазномъ бѣлкѣ, опухолью вѣкъ, болью и беспрепятственнымъ слизепеченьемъ.

Явленія.

§ 71.

Во все продолженіе воспалительного состоянія спраждущій чувствуетъ въ глазахъ болѣе или менѣе сильную боль, жаръ, зудъ и давленіе, происходящее какъ бы отъ постороннихъ шель, лежащихъ подъ вѣками; съ сими обнаруживается также беспрепятственное усиление закрытия глаза, покрасненіе бѣлка въ глазу, обильное испеченіе слезъ, опухоль вѣкъ, несносное чувство вскакого свѣща; а въ высшей степени присоединяется къ сему еще головная боль и воспалительная горячка.

Исходы.

§ 72.

Исходы сей болѣзни суть: разрешеніе

и нагноеніе, пятна на глазу, уменьшеніе или уничтоженіе способности зре́нія и другіе пороки зре́нія.

При разрѣшениіи всѣ упомянутые припадки мало по малу исчезающъ и глазъ получаетъ здоровое состояніе.

Нагноеніе обнаруживается послѣ же-
спокаго воспаленія, если первое время
болѣзни было пренебрежено, или причина
произвела потерю существа въ глазѣ.

Предсказаніе.

§ 75.

Легкія простыя наружныя воспаленія разрѣщаются часто безъ всякихъ послѣдствій. Воспаленія покрововъ глазныхъ проходяще по большой части медленнѣе, нежели воспаленія самаго глаза. Вообще предсказаніе здѣсь бываешъ различно и зависиши отъ спепени воспаленія, отъ разности произведшей его причины, а частію и отъ шего заблаговременно, или уже поздно подана врачебная помощь. Воспаленія, объемлющія все глазное яблоко, какъ сіе случается послѣ глубокихъ раненій, почши всегда переходяще въ нагноеніе или даже и въ померцвѣніе.

Причины.

§ 74.

Болѣзнь сія можетъ происходить какъ

опъ наружныхъ, шакъ и опъ внутреннихъ причинъ.

Наружные: сильный зной, нечистой воздухъ, дымъ, беспрестанно дѣйствующій на глаза, напримѣръ: въ курныхъ избахъ, также инородная пыль, попадающая случайно между вѣкъ и глазного бѣлка, загнутые ресницы, яркій свѣтъ, или скорая перемѣна свѣта со пылью; сильные напряженія глазъ, членіемъ мелкихъ буквъ или мелкою работою, безъ нужды употребляемые очки и лѣкарства, особенно глазные мази, шугое подвязываніе шеи, жашіе брюха и пр.

Внутреннія: Остановленные привычные кровоизлияния изъ носа, почечуй, мѣсячные крови, раздраженіе, причиняемое прорѣзывающимися зубами, приливъ къ глазамъ вредныхъ мокротъ, особенно венерической, чесоточной, осенней и ломотной.

Лѣченіе.

§ 75.

Легкое проспое воспаленіе, произшедшее опъ наружныхъ причинъ, требуетъ удаленія оныхъ и употребленія примочки изъ проспой холодной воды, или изъ воды, смѣшанной съ малымъ количествомъ уксуса, либо слѣдующей примочки:

Взять квасцовъ два золотника, бѣлаго купоросу и золотникъ, распиворишь въ 1-мъ штофѣ

Часть I.

воды и омочивъ холстяные вешочки, прикладывать къ глазамъ, возобновляя при каждомъ высыханіи, или

Взять два свѣжихъ яичныхъ бѣлка, положить въ глиняную тарелку, либо плошку и перешть оныя кускомъ квасцовъ до пѣхъ поръ, пока они сгустятся на подобіе пшеницы, попомъ приготовивъ изъ оной смѣси даѣлешки, прикладывать на больные глаза, перемѣняя ихъ тогда, когда высохнутъ.

Сія спосѣпеніе воспаленія глазъ пшеничнымъ употребленіемъ предложенныхъ средствъ благополучно излѣчивається.

Ежели воспаленіе глазъ сильное, сопровождающееся горячкою, головною болью, спрѣждущая особа полнокровная и здоровая, то надобно пустить изъ руки надлежащее количества крови, а внутрь давашь чрезъ три часа по десяти гранъ очищенной селишки, продолжая сіе до пѣхъ поръ, пока головная боль и горячка пройдешь.

Когда при воспаленіи глазъ оказывается сильная нестерпимая боль, то употребляй примочку.

При повсемѣшенній же слабости большаго, вместо кровопусканія изъ руки, надлежитъ припустить къ вискамъ по двѣ или по три пявицы, а попомъ воспаленные глаза лѣчишь вышеупомянутыми примочками или яичнымъ пшеницомъ.

Сверхъ сего послѣ кровопусканія и пі-

явицъ, можно приложиши къ запылку или за ушами пласпрырь шпанскихъ мухъ и дѣлать каждый день шеплую ножную ванну.

Воспаленіе, произшедшее опть попавшихъ подъ глазныя вѣки инородныхъ тѣлъ, не прежде можетъ быть излѣчено, какъ по вынуждѣніи оныхъ. По сему спопчасть нужно запвориши глазъ и повязашъ его полопенцомъ, опть чего всегда инородное тѣло переходитъ во внутренній уголъ глаза и изгоняется слезами, ошѣляющимися изъ онаго.

При воспаленіи глаза, произшедшемъ опть осипановленнаго кровопеченія изъ носа, мѣсячнаго очищенія или почечуя, всего лучше производиши испражненіе крови изъ мѣста происхожденія болѣзни, и. е. припущашъ піявки къ крыльямъ носа, къ губамъ дѣшородныхъ частей или къ заднему проходу.

Діэшу при семъ нужно соблюдать шапку же, какая предложена при воспалительной горячкѣ и употребляши зеленую не лакированную глазную ширму.

ВОСПАЛЕНИЕ ГОРЛА, ИЛИ ЖАБА.

§ 76.

Жабою называемое воспаленіе горла и сосѣдственныхъ его частей, соединен-

ное съ шруднымъ глошаніемъ и съ болью, а не рѣдко съ запруднишельнымъ дыханіемъ и горячкою.

Бользнь сія имѣшь правильныя свои

Явленія и родъ теченія.

§ 77.

1) *Предъ наступленіемъ оказывающіяся всѣ извѣстныя предзнаменованія воспалительной горячки.*

2) *Во время наступленія обнаруживаются сперва ознобъ, жаръ, жажда, и пр. д. За симъ слѣдуещъ жаръ, опухоль, красноша и боль въ спраждущихъ частяхъ горла. Больной можетъ шокомъ съ шрудносцію и болью говорить, глошать и дышать, рѣчь его глубокая и сиповатая и изо рта безпрестанно испекаеть слюна. Иногда случается при семъ еще обморокъ, шошноша, красноша глазъ, разверстіе рта, храпѣніе въ глошкѣ, большое количество слизи во рту, или вообще никакой, раздувшость головы, сонливость, бредъ и безчувствіе.*

3) *При достижении высокой степени. Проглатываніе почки совершенно не возможно; является повсемѣженная слабость и воспаленіе груди; спраждущій находится въ безпрерывной опасности задушенія, въ груди у него безпрестанный шумъ, цвѣтъ лица дѣлается синимъ, а жилобіеніе совсѣмъ почки непримѣшно.*

4) *При чмаленіи* оказывается пошъ, умноженное опдѣленіе слюны и мочи, кашель съ харкопиною, а съ симъ умѣряется и жестокость припадковъ.

5) *При перемѣнѣ*, жаръ, опухоль, красноша и грудное воспаленіе, вдругъ спа-новятся непримѣшными; появляется сонливость, и всѣ припадки приближающагося задушенія; дыханіе дѣлается храпливымъ и свиспящимъ и наконецъ на-спупаетъ смерть.

Вонъ испоря общей, или соединенной съ горячкою жабы. Иногда же она бываешь покмо мѣсциною болѣзнию, при которой рѣдко, или по крайней мѣрѣ въ весьма малозначущемъ спасении находишься горячка. Сюда принадлежашь:

1) *Воспаленіе языка*, при коемъ онъ сильно распухаетъ, дыханіе и глошаніе за-шрудняется и происходитъ часное ис-щеченіе слюны.

2) *Воспаленіе гортанныго язытика*. Сие лег-ко примѣшишь можно во время прижа-шія внизъ языка. Глошаніе и дыханіе при немъ хотя прудно, но все еще воз-можно.

3) *Воспаленіе миндалевыхъ желѣзъ* (*). При семъ усматриваешься опухоль какъ

(*) Миндалеобразные железы находятся въ по-
лости зева, по сторонамъ его между перед-
нихъ и заднихъ дугъ нѣбной занавѣски.

во рту, такъ и снаружи, глошаніе трудинно, дыханіе же менѣе запруднишельно.

4) *Воспаленіе дыхательного и пищеварительного горла.* Признаки его сушь слѣдующіе: пронзительный, какъ бы звенящій, свистящій голосъ; крашное, тоскливое и болѣзненное дыханіе; красный и распухшій ротъ; сопровождаемое величайшею болью проглашиваніе; безпримѣнной снаружи опухоли около воспаленныхъ частей; усирепленіе крови къ головѣ; однако жъ дыханіе здѣсь не слишкомъ запруднишельно бываєтъ.

Сие воспаленіе если наипасиѣшее, оно поражаетъ большою частію дѣтей около 12 лѣтъ, и, если въ скоромъ времени не дана будетъ помощь, умерщвляєтъ обыкновенно въ 48 часовъ.

И с х о д ы.

§ 78.

- Обыкновенные и при томъ совершенные переломы жабы сушь: пошъ, моча, а не рѣдко и харкошина. Послѣдняя случается по большей часпи при воспаленіи дыхательного горла.

а) *Болѣзnenные исходы* ея сушь: опровергніе, или нагноеніе воспаленныхъ частей, или рожа; а

б) *Смертельные:* задушеніе и анпоновъ огонь спраждущихъ частей, который од-

нако въ чисто воспалительной жабѣ весьма рѣдко вспрѣчаєшся, но чаще въ гнилой. Сверхъ этого при воспаленіи дыхательного горла смерть можетъ послѣдовать отъ того, что чрезъ выпошѣніе лимфы образуется въ ономъ горлѣ перепонка, препятствующая прохожденію воздуха въ легкія.

Предсказание.

§ 79.

Жаба сама по себѣ не есть очень опасная болѣзнь, но мѣстоположеніе воспаленія и удобность задушенія дѣлаютъ ее тяжелой.

По сему, чѣмъ болѣе она угрожаетъ задушеніемъ, чѣмъ болѣе дыханіе хриплое и свистящее, особенно, если воспаленіе легкихъ, и наконецъ еще сонная немочь присоединяется къ ней, тѣмъ опаснѣе.

Опасность тяжелая хотя зависитъ и отъ степени воспаленія горла, однако задушеніе очень рѣдко происходитъ отъ воспаленія, и большою частію отъ судороги горловой щели. Зная сіе, гораздо вѣрнѣе можно руководствоваться при лечении сей болѣзни, нежели предполагая одно воспаленіе.

Причины.

§ 80.

Все, что причиняешь воспаленіе груди,

можетъ произвеспь и жабу. Сверхъ шо-
го наиболѣе участвующа въ произведеніи
сего недуга:

- а) Мгновенная проспуда шеи, равно
какъ и ногъ.
- б) Холодное чипье во время разгоряче-
нія тѣла.
- в) Сильное движение прошибъ холодна-
го воздуха съ ошверзпымъ ртомъ.
- г) Собственныя болѣзнепворные, или
прилипчивыя вещества, каковы супъ: корь,
красуха и гнилая горячка.

Лѣченіе.

§ 81.

Воспаленіе сіе надлежитъ лѣчить, смо-
щря по свойству существующей горячки;
въ случаѣ же оной не находящіяся, то по-
спущашь шакъ, какъ пребуещъ шоего осо-
бенное свойство воспаленныхъ частей,
напримѣръ:

Когда воспаленіе горла легкое, поверх-
носное и есть шокмо слѣдствіе одной
проспуды, произшедшей при сильномъ
разгоряченіи и изпопѣніи шеи, въ то вре-
мя могутъ быть удовлетворительными
слѣдующія проспѣйшия средства: умѣ-
ренная наружная и внутренняя теплоп-
лаша, пребываніе въ поспели, окущивание
шеи фланелью, или шелковымъ плашкомъ,
щеплая вода, или ошварь винныхъ ягодъ,

почаще во рту держимый, также двѣ чашки бузиннаго, или обыкновеннаго чаю, принимаемыя на ночь, съ прибавлениемъ къ каждой изъ нихъ по ложкѣ рому, или вина и теплая для ногъ ванна.

Когда больной чувствуешь во всемъ тѣлѣ жаръ, головную боль и горячку, то нужно давать внутрь средства, сообразяясь при семъ съ существующею горячкою, а сверхъ этого избирашь еще и теплая лѣкарства, кои могли бы действовать и мѣстно, т. е. на шеѣ, какъ внутри, такъ и снаружи оной.

Если жаба болѣе простуднаго свойства, то надобно поступашь такъ, какъ при капаррѣ (§ 136) предложено — и жаба изчезнетъ.

Но гораздо чаще бываешь она чисто воспалительного или стенитескаго свойства, и влечешь за собою скорую опасность, наипаче, когда пищепрѣемное и дыхательное горло подвержено оной. Въ семъ случаѣ Киліанъ совѣтуешь предосперегаться отъ обыкновенной горлополоскашельной воды и подобныхъ шому впрыскиваний, поелику она очень часпо бываешь причиною нагноенія, обнаруживающагося иногда послѣ, или во время воспаленія, и такимъ образомъ изувѣчивающаго больныхъ.

Напропивъ этого гораздо выгоднѣе приступашь въ семъ случаѣ, съ возможнотю однако скросшію, къ кровопусканію, ко-

шорое, смотря по обстоятельствамъ и
сложенію больнаго, можешъ бысть и по-
вторено.

А шамъ, гдѣ мы опасаемся, дабы кро-
вопусканіе изъ руки слишкомъ не ослаби-
ло спраждущаго и не причинило бы ху-
даго исхода жабы, или гдѣ въ скороспѣ
пребуешься мѣстное облегченіе сего при-
падка, приличнѣе всего, смотря по воз-
раситу, сложенію и пр. больнаго, приспа-
вляши вокругъ шеи отъ 4 до 12 піявокъ.

Сверхъ этого спарашься о прохладной
температурѣ во всякѣмъ отношеніи; со-
вѣтовать больному сидѣть прямо, а если
можно, по немногу прохаживаться, или
давать носить себя, употреблять про-
хладительные налишки, держать почаше
во рту холодную воду, и поступать
впрочемъ совершенно такъ, какъ при
воспалительной горячкѣ.

Наконецъ, когда воспаленіе спраждущихъ частей нѣсколько дней уже про-
должаєтся, — больной чувствуешь пре-
имущественно біеніе, увеличенную опу-
холь и беспокойство въ оныхъ: что изъ
сего можно заключашь, что части сіи
перейдутъ въ нагноеніе.

Въ семъ случаѣ надлежитъ дѣлать сна-
ружки теплые припарки изъ просвир-
нячнаго корня, ромашки, бузины и мы-
ла; вдыхать теплые пары изъ мо-
лока, или изъ опвара винныхъ ягодъ,
пшеничныхъ опрубей и бузинныхъ цвѣ-

и повь, пить по нѣсколько чашекъ въ день настою, составленного изъ сихъ веществъ, а иногда можно держать ихъ во рту; — и сie продолжашь до тѣхъ поръ, пока мѣсто, содержащее гной, вскроется, или можешь быть вскрыто; послѣднее есть дѣло Хирурга.

Если воспаленіе занимаетъ дыхательное горло, то ни мало не медля, попчась припускай около шеи піявки, — и, когда произведешь опь сего нѣкоторое мѣстное облегченіе, то вдругъ прикладывашь вокругъ всей шеи холстинку въ два пальца шириной, покрышую нарывнымъ пласкыремъ, или шакой же шириной кусочки пересушня, оставляя до нарыва пузырей, кои постепенно надлежишь разрѣзашь и поддерживашь сie мѣсто нѣсколько дней въ нагноеніи капусными листами, а послѣ заживляшь прикладываніемъ свѣжаго не соленаго масла.

Иногда гортанный язытикъ и миндалевидные железы такъ сильно распухаютъ, что больной не въ состояніи проглатывать слюны и находится въ опасности задушенія.

Въ такомъ случаѣ весьма скорое оказываетъ дѣйствіе, если больной или

а) соль и перецъ, или

б) опь 3 до 4 гранъ въ порошокъ превращенныхъ квасцовъ, съ нѣкоторымъ количествомъ сахара смѣшанныхъ, кладешь себѣ на языкъ, оставляя на ономъ

до распворенія, попомъ продолжишелио проглашываешъ, — и сie опъ 4 до 6 разъ въ день повтораешъ.

Весьма хорошо также для больнаго выполоскивать почаще горло ошваромъ изюма, опъ спебельковъ очищенаго, или слѣдующимъ полосканьемъ:

Возьми ошвара ячменныхъ крупы полщора фунша, выпѣненнаго меду и уксусу, каждого по двѣ ложки, смѣшай и употребляй вмѣсто полосканья.

- Такимъ же образомъ поступашь и при одномъ опадении гортаннаго язытика и происходящемъ опъ сего препятствіи въ дыханіи и глопаніи.

Иногда жаба дѣлается антоново-огненою. Въ семъ случаѣ надобно поступашь шакъ, какъ при гнилой горячкѣ; а сверхъ этого можно еще слѣдующіл домашнія средства употреблять съ пользою:

а) Бродяще пиво, или ошваръ просвирокъ и шалфея, смѣшанный съ виномъ и медомъ, будучи употребляемы вмѣсто горлополоскальной воды, или для вспывгиванія въ горло, доспавляющъ здѣсь хорошую услугу.

б) Припарки изъ ароматныхъ расшепній, съ виномъ прикладываемыя около шеи, опимѣнно полезны.

с) Частое употребленіе внутрь вина, наипаче краснаго, также шеплая ванна изъ ароматныхъ шравъ, съ прибавленіемъ вина или водки.

d) Обмываніе теплымъ виномъ всего тѣла, особенно шеи, грудной ложечки и спины.

Очень часпо присоединяется къ жабѣ молочница, копорую должно лѣчишь такъ, какъ сказано во впорой части, при описаніи дѣшскихъ болѣзней.

ВОСПАЛЕНИЕ ГРУДИ ИЛИ КОЛОТЬЕ ВЪ БОКУ.

§ 82.

Воспаленіемъ груди называється по болѣзненное, съ горячкою сопряженное, сосппованіе, при копоромъ оказывается шуная или колючая боль, давленіе и спѣсненіе въ груди, съ шруднымъ, крашкимъ дыханіемъ и кашлемъ, сначала сухимъ, а пошомъ сопровождаемъ мокрошою, смѣшанною съ кровяными полосками и при глубокомъ вдыханіи, легко возвращающемся.

Сверхъ этого воспаленіе груди узнань можно по нижеслѣдующимъ еще

ЯВЛЕНІЯМЪ И РОДУ ТЕЧЕНИЯ.

§ 83.

1) *Предъ наступленіемъ* примѣчається за нѣкоторое время болѣе или менѣе сильное спѣсненіе въ груди и поперемѣнно колючая, переходящая боль.

2) Во время наступлениі сперва оказывается дрожь и ознобъ, продолжающейся не рѣдко около часа, попомъ слѣдуещъ повсемѣштенный болыпой жаръ, шупая, сопряженная съ давленіемъ и спѣсненіемъ боль въ груди, занимающая разныя спроны оной. Крашкое, скорое, трудное, наипаче при глубокомъ вдыханіи, или другомъ поприскеніи шѣла, великою болью сопровождаемое, горячее и соединенное съ большимъ беспокойствомъ и тошкою дыханіе. Къ сему присовокупляется еще сначала сухой, а попомъ съ слизистою и кровью окрашенною мокротою кашель. Рѣчь больного крапка и прерывиста. Пульсъ большею часщю въ началѣ болѣзни швердый, полный, скорый и сильный, а иногда мягкий и волнообразный бываешь. Сверхъ этого находящаяся также и прочие припадки воспалительной горячки.

3) При достижениіи высокой степени дыханіе чрезвычайно запруднительно, грудная боль дѣлающа сильнѣйшею, колючею, или какъ бы сверлящею. Языкъ совершенно сухой, жажда неуполима, а проглашаніе весьма трудно, пульсъ шверже и сильнѣе. У нѣкошорыхъ воспаляется и глотка. Еспѣли воспаленіе еще болѣе увеличивается, то дыханіе бываешь глубокое съ свистомъ и храпѣніемъ, пульсъ малый, скорый, неровный, перемежающейся. Усталость и без силіе чувствуешьъ

больной во всемъ тѣлѣ. Всѣ произвольные органы находятся въ величайшемъ бездѣйствіи.

4) *При циалиніи.* Боль бываешь менѣе оспрая, нѣсколько шупѣе и сноснѣе; пульсъ хопя еще сильный, однако не сполько, какъ въ началѣ; дыханіе легче и свободнѣе; изверженіе мокроты менѣе трудно, самая мокрота вязче, чаще и болѣе окрашена; кожа и языкъ влажны, и пр. д.

5) *При перемѣнѣ.* Харкошина уменьшаешься и соспояимъ только въ шонкой водяной жидкости; дыханіе всегда бываешь кратче и спѣсненнѣе; больной безпрерывно удушаешься и долженъ болѣею часшю сидѣть прямо. Глаза его мутны, лицо блѣдно и впало, голосъ совершенно исчезаетъ, разумъ теряется, руки и ноги хладѣютъ; на головѣ, груди и шеѣ оказывается холодный клейкий попѣт и спраждущій совершенно освобождаешься отъ болей.

Вотъ собственно описание воспаленія груди. Впрочемъ здѣсь еще должно обратить вниманіе преимущественно на два пункта, именно:

1) Спрашивается, кошорая часть груди воспалена, грудная ли перепонка, или существо самыхъ легкихъ. Всякой изъ сихъ случаевъ имѣетъ собственныя отличительные свои признаки:

а) *При воспалении грудной плевы* (*), пульсъ всегда бываєшъ твердый, припомъ безпреспанная колючая боль, преимущественно въ боку обнаруживающаяся и при каждомъ вдыханіи умножающаяся. Лежаціе на боку шағоспно; кашель, болью сопровождаемый, сначала сухой, попомъ мокрый и не рѣдко кровавый.

б) *При воспалении самого существа легкихъ* (**), пульсъ обыкновенно бываєшъ малый, скорый и мягкий, грудь хотя спѣснена, но безъ боли; дыханіе однако шоскливѣе, крапче и шруднѣе, припомъ головная боль, переходящая послѣ въ сонливость, блестящіе глаза и красное лицо.

Иногда воспаленіе легкихъ случается вмѣстѣ съ воспаленіемъ грудной плевы, а иногда соединено оно и съ воспаленіемъ грудо-брюшной преграды (***)

Первый случай, сверхъ предложенныхъ подъ а) признаковъ, узнашь можно еще изъ того, что разсматривая обнаружен-

(*) Грудную плеву называется па перепонка, которая успилаестъ внутреннюю поверхность грудной полости.

(**) Легкие составляютъ органъ дыханія и кровотворенія и находятся въ груди.

(***) Грудо-брюшная преграда есть большая мышица, опредѣляющая грудный внутренности отъ брюшныхъ и лежащая между грудью и брюхомъ.

ную грудь больного, кажешся, дыханіе его совершається однимъ осажденіемъ внизъ грудо-брюшной преграды; а во впоромъ случаѣ, спрѣдущій дышашъ, приподнимая большою часпію однѣ ребра и при шомъ болѣе въ прямомъ положеніи; сверхъ шого около нижнихъ реберъ чувствуетъ онъ боль, подобную шому, какъ будто около шого мѣста веревкою спянуто.

2) Второй пунктъ заключаетъ въ себѣ то, что воспаленіе груди, хотя большою часпію сопрягающееся съ воспалительною, однако же можетъ присоединяться къ желчной, гнилой, первной горячкамъ и перемежающимся лихорадкамъ.

Въ каждомъ изъ сихъ случаевъ замѣчаются всегда явленія особенной горячки, въ соединеніи съ припадками воспаленія груди.

Опять сего-то наиболѣе зависитъ и то, что не всякое вспрѣчающееся воспаленіе груди одинакового бываетъ рода, и что въ одномъ случаѣ поистинѣ то, а въ другомъ опять иное лѣченіе, сообразуясь большою часпію съ сопровождающей горячкою или лихорадкою.

Р А С П О З Н А ВАНИЕ.

§ 84.

Кашель, шрудное дыханіе и колотье
Часть I. 14

въ груди, соединенныя съ горячкою, суть такіе признаки, изъ коихъ всегда можно заключать о воспаленіи груди.

Въ настоящемъ же свойствѣ его можно быть увѣреннымъ изъ слѣдующаго:

1) Если воспаленіе обнаружилось вдругъ безъ предшествовавшей прежде горячки или другой болѣзни, спрѣждущій средняго возрасла, крѣпкаго сложенія, полнокровенъ и имѣющъ пышнательную пищу: то воспаленіе сіе всегда бываешьъ спеническаго свойства и соединено съ воспалительною горячкою.

2) Напропивъ што, когда воспаленіе сіе присоединяется къ гнилой желудочнай или нервной горячкѣ, ш. е. оказывается уже послѣ нарочитаго продолженія сихъ и другихъ болѣзней, спрѣждущая особа преклонныхъ лѣтъ, или ведешъ сидячую жизнь и имѣющъ слабое сложеніе шѣла: то воспаленіе сіе ешь аспеническаго или слабодѣйствующаго свойства.

Воспаленіе груди можешьъ быть также смѣшиваемо

1) Съ воспаленіемъ петени; но сіе послѣднее можно отличить итъмъ, что боль здѣсь бываешьъ въ правомъ подреберии, увеличивающаеся опь давленія. Кашель сухой, дыханіе менѣе затруднительно, положеніе на лѣвомъ боку почши не возможно. Больной имѣющъ желтый цвѣтъ лица, шоиному, а иногда и рвоту.

2) Съ воспаленіемъ селезенки, при копоромъ боль бываешьъ въ лѣвомъ подреберъ, отъ давленія увеличивающаѧся, а дыханіе менѣе спрѣждаешьъ.

3) Съ ревматическою болью груди. Боль сю можно опличить тѣмъ, что она чувствуешьъ болѣе снаружи, отъ прижатія и движенія среднихъ реберъ увеличивается, и горячкою большою часпію не сопровождается. Иногда снаружи примѣшина красноша и опухоль.

4) Съ колотьемъ въ груди отъ вѣтровъ, при копоромъ кашля и горячки не бываешьъ.

И с х о д ы.

§ 85.

Болѣзнь сія благополучно рѣшається по-
томъ и мотею. У дѣшой сія послѣдняя къ
шесстому дню испекаешьъ въ большомъ
количество, и весьма часто имѣешьъ блѣд-
ный цвѣтъ.

Къ совершеннымъ переломамъ принадлежишь также и харкотина. Хотя бы воспаленіе было только мѣсивное, то все харкошина необходимо нужна къ совершенному выздоровленію, если мы же лаемъ совершенно освободить легкія отъ болѣзни.

Кровотеченіе изъ носу и проса, рѣже болѣзнь сю рѣшаюшъ.

Когда же при воспаленіи груди не ока-

зываеется никакого совершенного перелома, то оно оканчивается слѣдующими

1) *Болѣзнями исходами*, каковы суть:

а) Водяная болѣзнь груди и клепчашой плевы легкихъ.

б) Сращеніе легкихъ съ грудною плевою и ребрами.

в) Продолжительная одышка.

г) Бугры въ легкихъ, или *бугрестая тахотка*. Сей послѣдней преимущественно въ шакомъ случаѣ надлежишь опасаться, когда грудная полость спрѣждущаго худо успроена, ската или сросшаяся; родивши его чахопнаго сложенія; воспаленіе легкихъ при всемъ употребленіи сообразныхъ средствъ, опѣ чешырехъ до пяти дней, безъ малѣйшаго облегченія продолжается; въ криптическое время болѣзнь хощя приходишь въ лучшее состояніе, но не имѣешь совершенного перелома; въ дыханіи оспаешься безпрерывная нѣкоторая запруднительность; пульсъ, напаче къ вечеру, бываетъ частый, скорый и твердый; иногда безъ всякой причины наступаетъ хрипота, весьма часто кашель, долго продолжающійся и возвращающійся съ умѣреннымъ колопьемъ въ легкихъ, — и больной не можетъ ни бѣжать, ни громко говоришь безъ кашля и боли въ груди.

д) Нагноеніе въ легкихъ, или *гнойная оныхъ тахотка*. Приближеніе его можно

узнать изъ слѣдующаго: болѣзнь приходиць въ лучшее сосстояніе безъ особливаго перелома и кринической харкоти-
ны; въ рѣшищельномъ продолженіи времени спраждущій получаешьъ не большіе припадки озноба; часное, мгновенно и съ великою силою оказывающеся чиханіе, колопье въ груди совершенно перяешся, лихорадка переспаешь, больной дѣлаешься бодрымъ, возвращаешься аппетитъ; но нѣшь свободнаго дыханія, всегда оспаешься не большой сухой кашель, наипаче при глубокомъ дыханіи. При малоусилленномъ даже движеніи всего тѣла, или одной шолько руки, вдругъ дыханіе больнаго затрудняешься и дѣлаешься удушающимъ. Онъ не можетъ хорошо лежать ни на какомъ боку, хотя и не чувствуешь опредѣленной боли. Пульсъ при томъ всегда раздраженный и частный.

Когда паковое сосстояніе еще долѣе продолжается, т. е. образуешься уже дѣйствительно тирей въ легкомъ, въ то время носъ и губы дѣлаются блѣдными, а щеки и языкъ весьма красными. Послѣ обѣда вспупаешь жаръ въ руки и щеки; — послѣднія сверхъ этого получаюшь красныя пятна, силы исчезаютъ, тѣло очевидно испощаешься, къ вечеру оказывается не большой ознобъ, пошомъ жаръ въ рукахъ и ногахъ, а къ ушру обильный, большую слабость наводящій пошъ, словомъ скажи: изнурительная лихорадка. Наконецъ

кашель болѣе и болѣе увеличивается и при неоткрытомъ еще чирьѣ бываетъ сухой, при вскрывшемся же съ мокропою и гноемъ.

2) Смертельные исходы суть: антоновъ огонь легкихъ, задушеніе и посирѣль.

Предсказание.

§ 86.

Предсказание при воспаленіи груди преимущественно основывается:

а) *На состояніи пульса.* Чѣмъ болѣе увеличивается онъ въ твердости и полнотѣ, тѣмъ болѣе доказываетъ умноженіе болѣзни. Малый же и мягкий пульсъ, при продолжающихся признакахъ воспаленія грудной плевы, показываетъ, что воспаленіе поразило и существо легкихъ.

б) *На состояніи колотья и боли въ груди.* Съ умноженіемъ сихъ и болѣзнь до-стигаютъ высшей степени.

с) *На состояніи дыханія.* ТрудносТЬ, крапивность и шоскливость онаго, постепенно усиливающіяся, служатъ худымъ признакомъ.

д) *На состояніи головы.* Опьянщеніе ея и склонность къ сонливости, чѣмъ болѣе оказываются, тѣмъ опаснѣе.

е) *На свойствахъ харкотины.* Чѣмъ болѣе обнаруживается недоспапокъ онай, тѣмъ хуже.

Еспыли харкопина мгновенно пресъкаеся, и на мъсто ея появляешся одышка, шо сие предвѣщаешъ опасность и смерть.

Харкопина изжелша зеленаѧ, шакже угрожаешъ опасностию.

Сверхъ сихъ различныхъ припадковъ предсказанія, нужно еще замѣшишь, взымая въ счетъ все, что касается до сопровождающей воспаленіе горячки, ниже слѣдующее:

Часшыи и сильныи попъ, тошчасть въ началѣ воспаленія груди появляющійся, еспь худый признакъ.

Опасно, еспыли при умножающейся же спокосии воспалительныхъ припадковъ, обнаруживаешся поносъ и мушная моча.

Худо, когда больной на одномъ только боку лежашь можешъ.

Еще хуже, еспыли ему шокмо на спинѣ лежашь можно.

Вѣрный признакъ близкой смерти еспь, когда больной вовсе не можешъ лежашь, но чтобы свободнѣе дышашь, всегда долженъ онъ сидѣши прямо; при шомъ, еспыли безпреспанно хрипашъ въ груди у него, ш. е. слышно какъ бы трещаніе сухаго пергамента.

Когда въ принадцатый, или пятнадцатый день болѣзни обнаруживаешся просовидная сыпь, подскакиваніе сухихъ жиль и легкія судороги въ мышцахъ лица, въ

шо время должно всегда опасаться гнилой, или нервной горячки.

Кровоотеченья, равно какъ и мѣсячное очищеніе, почишающіяся покмо тогда криптическими, когда онъ появляются между трептымъ и седьмымъ днемъ болѣзни.

Объ уменіи грудного воспаленія можно заключать въ шо время, когда не большия язвинки во рту усматриваются, и боль въ груди, какъ бы къ наружки болѣе проспирается.

Опухоли и нарывы подъ плечами, скоро нагнаивающіеся, весьма облегчаютъ болѣзнь.

Причины.

§ 87.

I. Располагающія. Высокіе, почавые, съ длинною шею, узкою, плоскою грудью, чахопочные люди имѣють расположение къ аспеническому воспаленію груди.

Крѣпкіе, полнокровные, широкоплечіе, малорослые особы, упоѣрябляющіе часпо спиртные напитки, легко поражаются воспаленіемъ груди спеническаго свойства.

Мужчины получають сю болѣзнь чаще, нежели женщины.

Истерические и гипохондрические особы никогда не спрадаютъ ею.

Чаще вспрѣчаєтся она зимою и весною

въ среднемъ возрастѣ и у шѣхъ, кои ее имѣли уже одинъ разъ.

II. Слугайныя притины: 1) Холодный, сквозной воздухъ, холодное питье, употребленіе льда, перемѣнчивая погода зимою и весною, воспочный и сѣверный вѣтеръ, сильноебѣганіе, особенно пропивъ холоднаго вѣтра.

2) Сильное напряженіе легкихъ крикомъ, смѣхомъ, надуваніемъ музыкальныхъ инструментовъ, также усиление при родахъ, подниманіе тяжестей и проч.

3) Острѣя вещества, попадающія съ воздухомъ въ легкія, к. п. Ѣдкіе пары, гасы, пыль, при шолченіи ядовитыхъ веществъ и проч.

4) Поврежденія груди, к. п. раны, проникающія въ грудь и легкіе, ушибы и проч., также палочные побои по спинѣ и п. д.

5) Скоропоспіжное прекращеніе періодически открывающихся кровошеченій, к. п. мѣсячного очищенія, почечуя, кровошеченія изъ носа, родовыхъ очищеній и пр.

6) Желудочныя нечистоплы всякаго рода, к. п. слизь, глисты, желчь и проч.

7) Переносы болѣзнействорныхъ машерій къ легкимъ, к. п. ломошной, язвенной, корынной, оспенной и проч.

8) Разныя горячки и лихорадки.

Способъ лѣченія.

§ 88.

Вообще можетъ быть шопть же самый,
Часть I.

каковъ предложенъ при воспалительной горячкѣ. Однако въ нѣкошорыхъ случаяхъ, по вышеизъясненнымъ причинамъ, не обходимъ иногда и шопъ способъ лѣченія, каковъ употребляется пропивъ гнилой, нервной, желчной и перемежающейся лихорадки.

Какъ бы то ни было, но всемъ случаѣ преимущественно не обходимо скорое вспомоществование, какъ при образовавшемся воспаленіи груди, или доспигшемъ уже значительной степени жестокости, такъ и въ то время, когда угрожаетъ оно признаками смертельнаго исхода.

Поелику недугъ сей болѣею частію бываетъ *часто воспалительнаго свойства*, то слѣдуетъ предложенную при воспалительной горячкѣ (§ 20)

1) *Діэтц* и здѣсь употреблять. Буде же сопровождающая горячка другаго свойства, то и діешу приличную ей избираТЬ надлежитъ.

Равнымъ образомъ должно поступать и съ назначаемыми при семъ

II) *Домашними средствами*. По настѣящему главное мѣсто занимаетъ здѣсь кроботусканіе; но поелику, оно, будучи употреблено безъ разбора и не сообразно свойству болѣзней, какъ легко можешь навлечь смерть, или по крайней мѣрѣ трудно-излѣчимыя болѣзни, такъ въ пропивномъ случаѣ скоро спасши жизнь, и больному доспавивъ полное

здравіе; что нужно для большей безопасности, сдѣлашь на сей конецъ замѣчанія на нѣкошорые важные пункты и правила:

1) *При воспаленіи грудной плевы*, надобно пущашь кровь тѣмъ болѣе и чаще, чѣмъ шверже и полноѣ послѣ кровопусканія пульсъ и сильнѣе колоть бываешьъ.

2) *Когда же самыя легкія воспалены*, что требуешся продолжашь кровокиданіе до тѣхъ поръ, пока

a) Спѣсненіе въ груди уменьшишися.

b) Кровавая харкопина исчезнетъ.

c) Кашель сдѣлаеися мокрымъ.

d) Слабый, неровный и перемежающійся пульсъ перемѣнился въ полный и крѣпкій.

e) Опягощеніе головы, также сонливость, бредъ и успремленіе крови къ головѣ совсѣмъ прекращаються.

Кромѣ общаго шакового кровопусканія, нужно иногда въ сей болѣзни употребляшь и мѣспиное, какъ по: піявки и кровопускальныя банки или рожки, кои въ особенности весьма приспойны шогда,

а) Когда при воспаленіи грудной плевы послѣ кровопусканія изъ руки пульсъ удерживаетъ еще нѣкоморую крѣпость или возвращающіяся колоть въ груди съ швердымъ пульсомъ.

б) Когда особы, спраждущія воспаленіемъ грудной плевы, слабы и слишкомъ чувствительны, и потому общее крово-

пусканіе, такъ какъ и повшореніе онаго не позволяется, въ шакомъ случаѣ

Сверхъ сего, при всякомъ прудномъ воспаленіи, какого бы оно рода ни было, могутъ служить съ пользою еще ниже-слѣдующія домашнія средства:

1) *Нарывный пластырь.* При употреблении его должно замѣтить слѣдующее:

а) Прежде кровопусканія, наривнаго пластиря никогда прикладывать не нужно; но въ то время,

б) Когда при воспаленіи грудной пле-
вы оно учинено и оспается еще по-
сполная боль въ груди, или

с) Когда при воспаленіи легкихъ, по-
слѣ кровопусканія пульсъ еще весьма мяг-
кий и малый бываетъ.

По сему разсмотрѣвъ въ скромъ вре-
мени болѣзнь, т. е. въ первый день оной
можно подать скорую помощь, если поп-
часъ произвести доспапочное кровопуска-
ніе и непосредственно за симъ приложить
наривный пластырь къ преимущественно
спраждущему мѣсту.

Пластырь такого вида всегда долженъ
быть пропорціональной величины, и на-
рываемыя имъ мѣста нужно еще нѣсколь-
ко дней держать въ нагноеніи.

2) *Вдыханіе теплыхъ паровъ,* наиболе-
ше изъ бузиннаго чаю.

На сей конецъ можно употреблять или
воронку, или обмоченную въ сей чай губ-
ку, клади на постелю предъ больнымъ,

дабы освобождающіеся изъ оной пары напи-
шывали воздухъ вокругъ его находящійся.

5) Слизистые и масляные напитки и
питательные вещества, изъ коихъ при-
спойнейши супъ: миндалевое молоко,
супъ изъ саго, вода изъ перловыхъ крупъ
и отваръ корней салепа (кокушкиныхъ
слезъ).

Можно также, взять по равной части
укуса и масла, и смѣшивъ ихъ между
собою надлежащимъ образомъ, давашь
больному всякой часъ по споловой ложкѣ.

4) Масляные втирания на груди, къ че-
му можетъ служить всякое масло, впи-
раемое чрезъ каждые два часа.

5) Фланель, шеплымъ молокомъ обмачи-
ваемая и къ груди прикладываемая, до-
справляещъ здѣсь превосходную услугу.

6) Ножныя ванны изъ шеплой воды
съ мыломъ, или съ золою и солью, каж-
дый день опть одного до двухъ разъ дѣ-
ляемыя.

7) Промывательные изъ сыворотки,
или изъ ячменного, либо ромашковаго
отвара съ двумя ложками масла и одною
ложкою спичечнаго сахара, или соли.

8) Общія теплые, мыльные, или молот-
ные ванны. Ванны сіи оптмѣнное оказы-
ваютъ дѣйствіе у дѣтей, спраждущихъ
груднымъ воспаленіемъ въ то время, ко-
гда на шестый день болѣзни ощущаются
у нихъ обильное количество блѣдной
мочи. Переломъ, совершающійся шакимъ

образомъ, наилучше поддерживашь можно, дѣлая симъ больнымъ ежедневно два раза теплую ванну и употребляя не больший нарывной пласырь, почаще перемѣняемый; не должно однакожъ допущашь до нарява, но коль скоро на приложенномъ мѣстѣ покажешся красноша, тощасъ опнимашь надлежиши. Превосходное дѣйствіе Киліанъ испыпалъ опъ сего при судорожномъ кашлѣ, присоединяющемся къ воспаленію легкихъ.

Воспаление желудка (*).

§ 89.

Подъ именемъ воспаленія желудка разумѣется па поспоянная, съ горячкою соединенная чувствительная и жгучая боль въ желудочной спиронѣ, которая опъ малъшаго наружнаго давленія и опъ всего, принимаемаго больнымъ внутрь, наиначе, если оно нѣсколько теплое, или холодное, увеличивающемся, и за симъ слѣдуещъ всегда рвота, или по крайней мѣрѣ пошноша.

(*) Желудокъ имѣетъ положеніе въ верхней части брюха, подъ такъ называемою грудною ложечкою.

ЯВЛЕНИЯ И РОДЪ ТЕЧЕНИЯ

§ 90.

его весьма крашковременны.

1) *Предъ наступлениемъ.* Кромъ повсемѣстнаго ослабленія и тошки, иногда примѣчаешьъ болъный въ желудочной спиронѣ чувство боли, которое скоро проходитъ и опять появляется; при томъ позывъ на пищу совершенно теряется, а жажда обнаруживаешьъ въ сильнѣйшей степени и спрѣждущій всегда жалуется на тошноту. Въ семъ состояніи, которое можетъ продолжаться нѣсколько дней, мало еще, или совершенно никакой горячки не примѣчаешься; наконецъ

2) *Во время наступлениа* оказывается сильная горячка, а съ нею и вышеупомянутые припадки. Сверхъ того брюхо дѣлаешьъ горячимъ, раздутымъ; въ желудкѣ ощущаешься жгучій жаръ, а въ желудочной спиронѣ беспрестанное биеніе и пульсированіе. Больной сперва извергаешьъ слизь, потомъ желчь, а наконецъ рвота бываешьъ совершенно пуская. Въ малой степени пульсъ скорый и мягкий, а въ высшей твердый, малый, ускоренный и напряженный. При томъ руки и ноги при ощущеніи кажутся совершенно холодными; больной шерзаешься духомъ, дыханіе его весьма спѣснено и жажда еще болѣе увеличиваешься.

5) При достиженіи высокой степени. Пульсъ дѣлаеши безпрепанно пверже, менѣе и скорѣе, рвота появляешся чаще и съ большою силою, слѣдуя даже во время умѣренно глубокаго вдыханія; обнаруживаешся холодъ и клейкій попѣрь, шакаже обмороки, продолжающіеся не рѣдко четверть часа; при чемъ больной дѣлаеши смершоподобнымъ. Къ сему присоединяеши еще дрожаніе всѣхъ членовъ, подпрыгиваніе сухихъ жиль, иногда судорожное спѣсненіе челюстей, или даже сполбнякъ, а иногда водобоязнь съ другими конвульсивными припадками, на конецъ самый пульсъ дѣлаеши церемежающимъ.

Распознаваніе.

§ 91.

Для лучшаго распознаванія желудочнаго сего воспаленія и для опличія онаго отъ другихъ болѣзней, особенно отъ холеры (поносъ со рвотою) могутъ служить руководствомъ нижеслѣдующіе пункты:

а) При воспаленіи желудка, рвота бываешъ продолжительна, и происходитъ отъ малѣйшаго количества всякой жидкости, принимаемой больнымъ внутрь.

б) Всегда находишся сильная горячка, коей начало сопровождаешся большимъ ознобомъ.

с) Языкъ больнаго всегда бываешьъ красный и сухой.

д) Сжение въ желудочной спиронѣ сильное, колопѣе въ оной продолжительное и при ощущеніи паковыхъ мѣстъ оказывается чрезвычайный жаръ.

При желчной горячкѣ явленія бывающія со всѣмъ другія, какъ мы уже видѣли при описаніи оной.

е) При холерѣ въ высокой степени, хотя и оказываются упомянутыя свойства, или признаки, однако сія всегда сопровождаются поносомъ; напротивъ што при воспаленіи желудка случается болѣе запоръ, а самое испражненіе низа сухое и швердое.

Исходы.

§ 92.

Хотя были случаи, гдѣ воспаленіе желудка благополучно рѣшалось поносомъ, пошомъ и мочею, однако сіе рѣдко случается, потому наиболѣе, что болѣзнь сию въ скоромъ времени иногда узнавать не льзя; и по сему не возможно подать нужной помощи.

Слѣдовашельно она большею часцію переходитъ, или въ

а) Болѣзненные исходы, какъ-то: въ оправданіе праваго ошверспія желудка, или въ упорный запоръ, или въ другія желудочные спраданія, или въ

б) Смертельные исходы, каковы суть: нагноение желудка, антоновъ огонь, антоново-огненная водяная болѣзнь, сполбнякъ и конвульсіи.

Опровердѣніе, оспающееся послѣ воспаленія желудка, можно узнать изъ того, если все принимаемое больнымъ внутрь, послѣ 12 или 24 часовъ извергающееся рвотою и при томъ находящееся чрезвычайно упорный запоръ. То же самое примѣчаются, когда и чирей въ желудкѣ образуется; однако въ семъ случаѣ обнаруживается еще и изнуришельная лихорадка.

При переходѣ же воспаленія сего въ антоновъ огонь вдругъ уничтожаются всѣ боли, пульсъ дѣлается малымъ, дрожащимъ и перемежающимся, и больной не имѣетъ уже болѣе способности принимать пищу.

Предсказание.

§ 93.

Болѣзнь сія весьма опасна; особенно когда бываетъ оспраго свойства или причиняется оправлениемъ. Въ семъ случаѣ, если не подано будеТЬ въ скоромъ времени вспомоществование, то больной умираетъ на другой день.

О прочемъ уже упомянуто.

Причины.

§ 94.

Кромъ общихъ причинъ воспаленія, преимущественно дѣйствующихъ на происхожденіе воспаленія желудка: холодное питье при весьма разгоряченномъ тѣлѣ; сильнодѣйствующія рвотные средства, или попачасъ послѣ сихъ принимаемыя въ большомъ количествѣ крѣпкіе спиртные напитки; оправленія всякаго рода ядами, а особливо мешаллическими; прекращенный въ скоромъ времени поносъ, или холера; опипупившая ломопа и кожные сыпи, воспященное мѣсячное очищеніе, или геморроидальное шеченіе; сильнодѣйствующіе слабительные средства; вышнія насилия, какъ то: удары по желудочной споронѣ или раненія желудка.

Способъ лѣченія.

§ 95.

Собственно при семъ нужно замѣнить слѣдующее:

1) Если причиной принятые внутрь яды, то надлежитъ спаравшися не шолько разложить ихъ, но и произшедшія отъ нихъ дѣйствія уничтожить. Какимъ образомъ сіе произвести? о томъ сказано будещъ при оправленіяхъ, см. § 238 — 241.

Сверхъ того не надобно забывать, что вообще здѣсь должно дѣйствоваться однѣмъ почши наружнымъ упошребленіемъ лѣкарствъ. Одно изъ весьма скоро и благо-
творно дѣйствующихъ въ семъ случаѣ средство, еспѣ слѣдующее:

2) Взявъ б лопковъ мыла, увариши съ одною бушылкою извесковой воды (*), попомъ смѣшашь съ четырьмя лопками воды и обмочивъ сею водою фланель, или салфетку, выжашь шакъ, чтобы немнога осталось въ ней жидкости и приложиши на желудочной сторонѣ. Прикладываемся фланель, или салфетка должна имѣти шакую степень теплоты, какую больный можетъ вынести, и по прохладеніи ея попадшасъ нужно повториши, продолжая сіе до тѣхъ поръ, пока исчезнутъ упомянутые припадки.

Впрочемъ, при высочайшей степени сего воспаленія, надлежиши сперва приспавиши къ желудочной сторонѣ опь б до 8 піявокъ, а попомъ сдѣлать и сію припарку.

Докторъ Киліанъ говориши, что средстvомъ симъ въ присутствіи также другихъ опытныхъ и искусныхъ врачей, очень часто, какъ обыкновенно говориши, дѣлалъ онъ чудеса.

(*) Воду сію всякий легко приготвиши можетъ гашенiemъ куска пережженой извески въ водѣ.

Сіе могу подпвердишь и я. Въ одномъ вспрышившемся мнѣ случаѣ воспаленія желудка и кишечъ, ни какія средства не могли доспавишишь такаго облегченія мучившемуся больному, какъ упомянутая припарка.

3) Произведши сіе, когда число и жестокость припадковъ уменьшишися, надлежиши присступишишь къ промывательнымъ, употребляя ихъ, хотя всякой часъ по одному небольшему, всего лучше изъ оцвара льняныхъ съмянъ съ примѣсью линяного или деревянаго масла, а за неимѣніемъ сихъ, изъ разведенаго водою коровьяго молока.

4) Попомъ надобно испытывать, можетъ ли больной принимашь чпо либо внуширь, безъ происходящей послѣ сего рвоты. Въ семъ случаѣ сперва должно давашь ему шокмо слизистые напипки, какъ шо: миндалевое молоко, ошварь салепа, саго, также разведенное теплое коровье молоко всякую четверть часа по полчашкѣ. Сіи напипки не рѣдко превосходяши всѣ другіе.

5) Къ подошвамъ ногъ прикладывашь горячіе тѣсто или переступень. Или спавишишь у ногъ кувшинъ съ теплою водою такъ, чтобы подошвы ногъ приложены были къ самому сосуду.

6) Употребляшь опѣ двухъ до трехъ разъ въ день теплыя наипаче молотныя ванны, ксихъ количеству жидкости мо-

- жешь просыпаться не выше, какъ шолько за ложечку.

7) Сверхъ шого поспупашъ шакъ, какъ и требуешъ шого собственная причина, произведшая воспаленіе желудка, сообразяясь съ предложенными при воспаленіи мозга способомъ. Такимъ образомъ при отструившей подагрѣ или ломотѣ прикладывашъ шопчашъ горчичное пѣсно на шомѣсто, гдѣ оныя болѣзни имѣли прежде свое мѣстопребываніе; при остановленномъ мѣсятнолѣтии припускашъ въ скоромъ времени піявки къ губамъ дѣтродныхъ частей, а при скоро скрывшемся геморроидальномъ теченіи къ прямой кишкѣ; попомъ надобно обоямъ симъ послѣднимъ пациентамъ садишися надъ парною банею изъ сѣнной шрухи, бузины, просвирокъ и ромашекъ, дѣлая сіе два или три раза въ день до шолѣ, пока кровь опять покажется.

Когда причиною воспаленія, есть скрывающаяся накожная сыпь, то можно прикладывать на разныхъ частяхъ пѣла испанской мушки пластырь или горчичное пѣсно, перемѣщая ихъ то на шо, то на другое мѣсто, но не допущая впрочемъ до нарыва пузырей; сверхъ шого предписывать для больнаго ванны съ мыломъ и попашемъ.

8) По уничтоженіи воспаленія въ желудкѣ надлежитъ въ ширашь на желудочной сторонѣ смыть, состоящую изъ ма-

сла и водки, и принимашь ежедневно по нѣсколько чашекъ инбирнаго ошвара вмѣсто чая, продолжая сіе нѣсколько недѣль.

ВОСПАЛЕНИЕ КИШЕКЪ.

§ 96.

Припадки воспаленія кишекъ вообще суть тѣ же, какіе примѣчаются и при воспаленіи желудка, съ тѣмъ только различіемъ, что упомянутая мучительная боль чувствуется болѣе въ брюхѣ, нежели въ желудочной споронѣ и увеличивающа-ся отъ всякаго прикосновенія къ брюху; что спраждущій сначала извергаешьъ рвотою и то, что въ желудкѣ находящееся, попомъ то, что въ кишкахъ, а наконецъ и самыи даже калъ. При томъ пульсъ болѣе мягкий, нежели швердый, по крайней мѣрѣ болѣе паковыи продолжается, чѣмъ при воспаленіи желудка.

При коликѣ хотя также всѣ припадки воспаленія кишекъ находятся, однако пульсъ здѣсь всегда мягкий, и нѣтъ никакой горячки, равнымъ образомъ и при холерѣ.

Исходы и предсказаніе сей болѣзни одинаковы съ воспаленіемъ желудка, равно какъ и самыи, причины выключая, что здѣсь преимущественно участвуетъ еще:

проспуда ногъ, завишие одной кишки въ другую и ущемленная грыжа.

Присутствие ущемленной грыжи доказывается:

а) Боль въ брюхѣ, произшедшая вдругъ, или послѣ сильнаго напряженія шѣла, какъ то: при сильномъ чиханіи, большомъ, сухомъ и судорожномъ кашлѣ, наипаче, если болѣній уже имѣешь грыжу.

б) Боль ощущаемая въ шѣхъ мѣстахъ, гдѣ могутъ происходить грыжи, к. ш. около пупка, въ пахахъ и проч. По сему должно разсматривать въсемъ случаѣ въ точности всѣ таکовыя мѣста. Если грыжа еще несовершенная, то опухоль бываетъ небольшая; а дабы еще болѣе удостовѣришься въ семъ, то нужно на подозрительномъ мѣстѣ приложить руку и заслушать болѣнаго кашлять. Буде при всякомъ кашлѣ ощущаешься въ ономъ мѣстѣ, какъ бы нѣчто вздувающееся подъ рукою, то изъ сего можно съ вѣроятностю заключить о присудствіи ущемленной грыжи.

Способъ лѣченія.

§ 97.

Способъ лѣченія таکовъ же, какъ и при воспаленіи желудка, требуется только, чтобы вдругъ, если примѣчаешь малый

и швердъй пульсъ, приспупишъ къ кровопусканю.

Сверхъ шого здѣсь преимущеспенное оказываетъ дѣйствіе льняное масло, употребляемое внутрь всякой часъ подвѣстоловыя ложки, всего лучше свѣжевыжатое и соединенное съ нѣсколькими каплями лимоннаго сока, а при сильной рвотѣ употребляемое въ клиспирахъ.

Если же причиной воспаленія кишечка ущемленная грыжа, то нужно сдѣлать, сколько можно заблаговременнѣе теплую ванну изъ молока, или изъ оправа бузинныхъ цвѣтовъ, льняныхъ сѣянъ, ромашки и просвирокъ, и спаравшися въ самой ваннѣ вложишь выспущившія часпи, поспущая сверхъ шого шакъ, какъ показано при ущемлениіи грыжи (см. § 197).

Воспаленіе печени или печенки (*).

§ 98.

Подъ именемъ воспаленія петени, разумѣвшся по чувствѣ боли въ правомъ подреберьѣ, которое сопровождается лихорадочными припадками, и при коемъ правой бокъ, начиная отъ грудной ложечки

(*) Печень есть органъ отдаленія желчи и имѣющъ положеніе въ правой подреберной сторонѣ брюха.

до исхода короткихъ реберъ распухаешь, оказывая боль и жаръ; при томъ дыханіе болѣе или менѣе затрудняется, лицо спрѣждущаго желѣзющешь, а моча большою часцію получаешь желтый, померанцовъ-ый цвѣтъ.

Хоша по видимому мало находицся различія въ шомъ, какая собственно часть печени воспалена, однако въ практическомъ отношеніи весьма важно знать, въ верхней ли поверхности печени, которая обращена къ наружѣ и выпукла, или въ нижней, внутрь обращенной и вогнутой воспаленіе имѣетъ свое мѣстопребываніе. Оба сіи случаи можно различить по слѣдующимъ признакамъ:

1) *При воспаленіи верхней поверхности печени* чувствуешь болѣй сильную, колючую боль въ правомъ подреберьѣ, которая при всякомъ движении грудобрюшной преграды, какъ то: при вдыханіи, чиханіи, смѣхѣ, и т. д. увеличивается, просипраясь къ шеѣ и правой лопаткѣ такъ, что болѣй правую руку можешь склонно съ трудносью двигать и поднимать. При томъ вдыханіе трудное, а выдыханіе легче; на правой сторонѣ не льзя лежать безъ боли; обыкновенно при семъ происходить сухой кашель; пульсъ бываетъ пурпурный, полный и крѣпкій.

2) *Въ воспаленіи же нижней части печени* примѣчаешься одна шупая давящая боль въ правомъ подреберьѣ, правая нога

большею частію онъмѣваешьъ, на лѣвомъ боку не льзя лежать безъ боли, кашель хощя умѣреннѣе, но за то чаше случаетъся икоша и рвота; пульсъ не шакъ швердъ, какъ въ первомъ случаѣ, но болѣе мягкий.

Впрочемъ, здѣсь нужно еще замѣтить, что воспаленіе верхней поверхности печени чаше соединено бываєтъ съ чистою воспалительной горячкою, напротивъ воспаленіе нижней поверхности болѣе съ желчною и гнилою; на что преимущественно надлежитъ обращать вниманіе.

Поелику продолжительное воспаленіе печеніи случается чаше, нежели какъ полагающъ, и не рѣдко служитъ главнымъ проводомъ ко многимъ упорнымъ болѣзнямъ, особенно къ шакъ называемой *тахоткѣ печеніи*, что весьма нужно знать признаки присущія оного; ибо чрезъ сіе спраждущіе имть больные, узнавъ заблаговременно приключеніе и важность сего недуга, могутъ въ выгодное еще время принять совѣтъ благоразумнаго, опытнаго и искуснаго врача, и симъ самыи поддержать жизнь свою.

При шакъ называемомъ *пассивномъ хроническомъ, или продолжительномъ воспаленіи печеніи* ощущаешь болѣй по перемѣнно оказывается скропечное колотье въ печеночной сторонѣ, которое мало по малу оспаешься въ опредѣленной почкѣ: къ сему присоединяется лихорадочное состояніе, примѣчаемое большею частію

такмо вечеромъ. Пульсъ бываєтъ малый и півердый, пищевареніе оскудѣваєтъ, появляєтъся часистая рвота безъ доспапочнай причины, трудное, сухое и изрѣдка происходящее испражненіе низа, красная, или бурокрасная моча, и лежаніе на обоихъ бокахъ сопряжено съ трудносстю.

Когда таковое состояніе продлилъся нѣсколько времени безъ нужной помощи, то образуетъся *тирай или вередѣ вѣ петени*. Присущество коего можно узнать изъ слѣдующаго: прежняя колючая боль переряется и превращается въ шупую; спрѣдущему лежанью трудно; воспалительная горячка хопя перестаетъ, но пульсъ остается еще въ раздраженномъ состояніи, и ввечеру дѣлается скорымъ; къ упру обнаруживаются попъ; больной постепенно испощается и ослабѣваетъ, языкъ его всегда желтоватой и сухой, вкусъ горький, аппепита вовсе нѣть, моча бурая, жирною плевою покрыта. На конецъ присоединяется кашель, сначала сухой, а послѣ съ выхаркиваніемъ гноя, пока все сие прекращается смертию.

И с х о д ы.

§ 99.

Часто воспаленіе сие весьма хорошо рѣшается повсемѣшеннымъ попомъ, который при совершенно криническомъ его

свойствъ, кажеся жирнымъ и окрашиваешь бѣлье желтымъ цвѣтомъ.

То же самое происходитъ, если моча испекаешь разомъ въ большемъ количествѣ, но сія въ совершенно крипическомъ ея состояніи должна быть красноватая и имѣть бѣловатый, опрубаемъ подобный осадокъ.

Истечениe крови трезб заднепроходную кишку и кровотеченіе изъ носа также иногда могутъ быть переломами. Однако кровопеченіе изъ носа должно обнаруживаться въ такомъ случаѣ непремѣнно на прерпій, или четвертый день воспаленія.

Болѣзnenные же исходы сего недуга состоящъ въ шомъ, что: либо петень срастается съ желудкомъ, каковое сращеніе не имѣшь большой опасности, если оно не очень значительно; либо происходитъ затвердѣнія въ петени, которыя, кажеся, чаще случаются, нежели какъ обыкновенно думають; либо рождаются язвы и вреда въ страждущемъ сею болѣзнью органѣ, отъ чего послѣдуешь пetenotная тахотка; либо воспаленіе переходитъ въ анционовъ огонь или въ продолжительное воспаленіе печени,

Предсказаніе.

§ 100.

Воспаленіе печени есть опасная болѣзнь, особенно, если она въ высшей степени

имѣеть аспеническій характеръ. Оно должно переходить въ нагноеніе, а сіе большою часпію бываетъ смертельно.

Особы, спрѣждущіе болѣзнями печени, к. п. завалами, отвердѣніями и разными разспройшвами оной, подвержены большей опасности. Въ жаркихъ климатахъ воспаленіе сіе бываетъ злокачественное, нежели у насть.

Медленное, хроническое воспаленіе опаснѣе, нежели оспро, поелику первое трудно узнается и предполагаетъ слабость печени и всего тѣла.

Судорожная икоша, большая одышка, сухой и сильной кашель съ непріятнымъ чувствомъ въ ключицахъ и плечахъ суть худые признаки.

Съ гноемъ смѣшанныя испражненія низа показываютъ всегда смертельной исходъ. Если больной при медленномъ воспаленіи печени получаетъ здоровый видъ лица и зловонный его испражненія низа приходящіе въ натуральное состояніе, то сіе подаешь надежду на выздоровленіе.

Причины.

§ 101.

Въ малолѣтствѣ воспаленіе печени весьма рѣдко случается. Вспыльчивые, раздражительные, черноволосые и живущіе въ жаркомъ климатѣ особы, наиболѣе рас-

положены къ нему. Лѣтомъ и осенью чаще случается оно.

Къ случайнымъ причинамъ относятся: раненія, попрясенія и воспаленія мозга, проломъ черепныхъ костей, сильные удары по правому подреберью и попрясенія онаго, сильный спраспіи, особенно печаль, гневъ и проч. Проспуда, послѣ предшествовавшаго разгоряченія въ банѣ; холодный почлегъ на землѣ и при свободномъ воздухѣ, сильная напряженія шеи, злоупотребленіе спиртныхъ напитковъ, желчные камни, глиспы, зашедшия чрезъ желчный проходъ въ печень, черви печеночные, воспаленія грудобрюшной преграды, легкихъ, желудка и двенадцатиперстной кишкѣ, распросраняющейся также и на печень, сильная рвота, желчный и кровавый поносъ. Переносъ ревматизма и рожи, прекращенный геморрой.

Способы лѣчения.

§ 102.

1) Если больной крѣпкаго сложенія, средняго возрасла и сопутствующая горячка воспалительного (спеническаго) свойства съ швердымъ пульсомъ, то надлежитъ попечать сдѣлать обильное.

а) Кровопусканіе изъ руки, поелику воспаленіе переходитъ въ скоромъ времени въ неизлечимое нагноеніе. Даже умѣрен-

ная боль въ правомъ боку и мнимая слабость больного не должны оправдить отъ этого. Послѣ кровопусканія можно приспавлять къ заднему проходу.

b) Пілеки числомъ отъ 8 до 12. Сіи наипаче въ такомъ случаѣ полезны, когда воспаленіе произошло отъ прекращенія геморроидального (почечуйнаго) шеченія.

c) Съ кровоиспражненіями можно употреблять очищенную селишту, давая одну черезъ три часа по десяти гранъ, также апельсины, лимоны, вишневый сокъ, малину, клюкву, бруснику, ежевику, смородину и проч.

Когда языкъ покрытъ желтоватою нечистотою и во рту чувствуется горечь, то можно давать винный камень (креморшарарь), сваривъ два лопата онаго въ бушылкѣ сыворошки, съ примѣсью двухъ ложекъ меду, и давая чрезъ часъ по двѣ столовыя ложки до пѣхъ поръ, пока произойдетъ испражненіе низа.

При запорѣ на низъ дѣлашь промыващельный изъ отвара ячныхъ крупъ, съ примѣсью льнянаго масла.

Снаружи на спраждущемъ мѣстѣ надлежишь вширапть льняное или деревянное масло, также дѣлашь шеплыя припарки изъ полченныхъ льняныхъ сѣмянъ, или бѣлаго хлѣба свареннаго съ молокомъ, только не должно употреблять ихъ слишкомъ долгое время.

Впрочемъ поспупашь шакъ, какъ предложено при воспаленіи желудка и проч.
Лѣченіе же медленнаго воспаленія печени, можешъ быть предоспавлено однолич опытному и искусному врачу.

ВОСПАЛЕНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ (*).

§ 103.

Симъ именемъ называется па болѣзнь, которая обнаруживается болѣе или менѣе сильною горячкою, напряженіемъ, жаромъ, опухолью и болью въ лѣвомъ боку подъ коропкими ребрами, увеличивающеюся отъ наружнаго давленія, глубокаго вдыханія, кашля и сильныхъ движений.

Она оказывается иногда медленно: сперва предшествующій ей желудочные припадки, к. п. жжога, кислый отрыжки, худое вареніе пищи, блѣдножелтый цвѣтъ лица, попомъ дѣлается ознобъ и всѣ припадки огневицы, а съ симъ появляется постоянная, непрерывная колющая боль въ лѣвомъ боку подъ коропкими ребрами, просырающаяся часто до плечь, груди и кличицъ и увеличивающаяся отъ всякаго давленія и движений. Распухшую при семъ селезенку можно иногда ощущать.

(*) Селезенка имѣетъ положеніе въ лѣвой подреберной ширинѣ брюха.

напь подъ коропкими ребрами лѣваго бока, особливо, если больной будешь лежашь прямо. Положеніе больнаго на лѣвомъ, а иногда и на правомъ боку бываешъ шрудно.

Проспое воспаленіе селезенки по предложеннымъ здѣсь признакамъ удобно можно узнать всякому; но когда оно сопрягаешся съ припадками, происходящими отъ сосущданія желудка, кишечъ и легкихъ, к. п. рвотою, икошою, запоромъ, поносомъ, кашлемъ и проч., то распознаніе его бываешъ весьма шрудное и можешь быти представлено сколько опыту и прозорливому врачу.

Болѣзнь сїя приключается часто отъ переносовъ, случающихся послѣ разныхъ горячекъ и лихорадокъ.

Исходы же и лѣченія ея суть такія, какія предложены при воспаленіи печени и прочихъ брюшныхъ внутренности.

Воспаленіе почекъ (*).

§ 104.

Воспаленіемъ потекъ называется непрерывная, жгучая, или колющая боль въ

(*) Почки сосставляютъ органъ въ тѣлѣ, посредствомъ коего отдѣляется моча и находится въ поясничной споронѣ съ обоего боку спиннаго хребта,

въ пояснице, увеличивающаяся опись давленія, движенія и поспешной теплопы и сопряженная съ горячкою и красною пламенною или гноевидною мочею, кошорая, при частномъ побужденіи къ мочеиспусканию, выпекаешь всегда шокмо по каплямъ.

Впрочемъ воспаленіе сіе бываешь двоякаго рода, именно:

а) При первомъ родѣ онаго спраждущій ощущаешь боль въ поясничной споронѣ, копорая просширается и по хребту, и иногда шокмо на одномъ, а иногда обоихъ бокахъ обнаруживается, но никогда не сопровождаешься рвотою.

б) При другомъ всегда оказывается безпреспанная рвота и боль просширающаяся въ доль мочепочниковъ въ пазъ; сверхъ этого яичко спраждущей спороны не рѣдко распухаешь и вверхъ поднимаешься, а нога на той же споронѣ онѣмѣваешь и дѣлаешься безчувственною.

Первый родъ сего воспаленія почекъ имѣешь великое сходство съ поясничною болью, (Lumbago); однако сію можно отличить опись него пѣмъ, что при воспаленіи почекъ боль обнаруживается преимущественно въ самой почечной споронѣ, и опись сихъ мѣстъ не далеко распространяется.

И с х о д ы.

§ 105.

Весьма рѣдко воспаленіе сіе бываетъ мѣшкою болѣзнью, исключая, когда причиною его почечные камни; но всегда оно сопряжено или съ чисто воспалительной, или съ аспеническою горячкою. Послѣдняя большою частію шогда случается, когда воспалены обѣ почки.

По сей причинѣ болѣзнь сія продолжаетъ вообще опѣ 7 до 14 дней.

Рѣшается же она, или

- а) Криптическою мочею, которая обыкновенно бываетъ бурою и черною, или
- б) Обильнымъ потомъ, имѣющимъ запахъ мочи, или наконецъ

с) Геморроидальнымъ тетенiemъ. Гдѣ шаковые переломы не обнаруживаются, тамъ недугъ сей кончается.

а) Болѣзнями исходами, и въ особенности

аа) Ошвердѣніемъ почекъ, при кошоромъ больный сначала ощущаетъ нѣкоторое давленіе въ поясничной споронѣ, пошомъ мало по малу хромать начинаетъ, наконецъ, или нога болѣющей споронѣ усыхаешь, или обнаруживается всеобщее изнуреніе. Сверхъ того

бб) Водяная болѣзнь, или подкожная, или брюшная также бываетъ слѣдствиемъ сего воспаленія.

b) Смертельный исходъ послѣдуетъ ошь нагноенія, и произшедшей чрезъ шо, такъ называемой потетной тахотки.

Предсказаніе.

§ 106.

Предсказаніе въ сей болѣзни неблагопріяшно. Рѣдко оканчивается она благополучно, чаще же воспринимаешь вышеозначенные болѣзненные исходы.

Причины.

Особенные причины воспаленія почекъ суть:

1) *Потетные камни*, кои способствующіе къ произведенію сего воспаленія преимущественно тогда, когда спраждующій ими будешь подверженъ сильному трясенію его шѣла, какъ-шо: сильной верховойъ Ѣздѣ, Ѣздѣ въ присучей повозкѣ, и пр. п. поелику ошь сего почечные камни перемѣняющіе свое положеніе. Равнымъ образомъ оно можетъ случиться у спраждущихъ почечными камнями и ошь чрезмѣрнаго употребленія крѣпкихъ спиртныхъ, и весьма мочегонительныхъ напитковъ, или ошь сильныхъ душевныхъ возмущеній; ибо все сіе еще умножающіе у нихъ болѣзненную раздражительность почекъ. Сверхъ того на воспаленіе сіе вообще дѣйствующіе:

2) Сильныя и оспрыя мочегонищельные средства, сильные удары, или попрясеніе почечной спороны и всего хребта, напр. опь побоевъ по оному, продолжительной, прысучей ъзды въ повозкахъ; по сему что у куріеровъ недугъ сей весьма часто случается; также всякое непомѣрное напряженіе шѣла, какъ-шо: подниманіе пляжелыхъ ящиковъ, безпреспанное лежаніе на спинѣ, на прим. при переломахъ костей, опушупившее мѣсячное очищеніе, или геморроидальное печеніе.

Лѣченіе.

§ 107.

Однаково съ предложенными при воспаленіи желудка.

Однакожъ здѣсь преимущество необходимо кровопусканіе, повторяемое дошоль, пока признаки воспаленія уничтожаются.

Кромѣ сего иногда надобно припушасть піявки, не только къ больному мѣсту въ поясничной споронѣ, но и къ заднему походу.

Выполнивъ сіе, сажать больного въ теплую ванну, дѣлать предложенную при воспаленіи желудка (§ 95) мыльную припарку на спраждающей споронѣ почекъ, и прикладывать къ подошвамъ ногъ горчичное іѣспро, избѣгая вслѣски пластырь

изъ испанскихъ личкъ, поелику мухи сіи раздражая сильно мочевые пуши, могутъ причинить несказанный вредъ.

Сверхъ этого можно спасти промывашельный изъ настоя льняныхъ съмянъ, пить теплое, нѣжное питье изъ ошвара просвирокъ, саго, сарачинскаго пшена и проч. избѣгая всячески лежать въ теплой постѣль и на спинѣ; больной долженъ пить часпо, но по немногу.

Воспаленіе почекъ, какъ уже упомянуто, легко переходитъ въ нагноеніе. Переходъ сей можно узнать изъ слѣдующихъ явлений:

1) Сильная боль въ спрѣждущемъ мѣстѣ умалеется, а осипаешься шолько шуплая и чувствоводавленія.

2) Горячка холода переспаешь, однако пульсъ не совсѣмъ спокоенъ, но всегда частый и скорый бываетъ.

3) Спрѣждущій впадаешь безпресданно въ небольшую дрожь.

4) Надъ почками не рѣдко оказывается пульсированіе съ чувствомъ онѣмѣнія цѣлой ноги или ляшки больной спороны, при чемъ хожденіе дѣлается труднымъ.

5) Очень часто происходитъ сженіе въ почечной споронѣ, кошорое, особенно въ спрѣждущемъ боку весьма обременяюще болнаго.

6) Моча воспринимаешь гноиное свойство, т. е. она имѣетъ гнилый запахъ и гноеватый описѣдъ.

7) Если сие состояніе продлишся долѣе, то послѣдуешъ сильная лихорадка съ изнурительнымъ пошомъ и проливнымъ поносомъ (почечная чахотка).

Буде возможно еще изцѣлишь образовавшуюся шамъ язву, то изцѣленіе сие производится лучше всего посредствомъ сыворотки, съ Исландскимъ мохомъ варенной, слѣдующимъ образомъ: возми Исландского моху два лопата, облей его сперва кипячею водою для уменьшения горечи, пошомъ увари съ двумя бушылками сыворошки до одной, и принимай 4 раза въ день по чайной чашкѣ. Равнымъ образомъ, такъ называемая желѣзная сыворошка, которую можно приготовить, держа раскаленное желѣзо въ кипячемъ молокѣ до полѣ, пока оно свернется, оказываетъ здѣсь ошмѣнную пользу.

Зельцерская и Шпаавская воды, также весьма хорошо дѣйствующіе.

Опѣ порошка смирны, особливо настоенного желѣзною минеральною водою, Килианъ видѣлъ не сколько разъ въ семь случаевъ чрезвычайно хорошее дѣйствіе.

Съ симъ ежедневно должна быть соединена и теплая полуванна съ прибавлениемъ ароматныхъ травъ.

ВОСПАЛЕНИЕ МОЧЕВАГО ПУЗЫРЯ.

§ 108.

При воспаленіи мочеваго пузыря спраж-

дущій чувствуешь во время испущенія мочи, давленіе и при всякомъ малѣйшемъ движеньи, сильную жгучую, пос贯穿ную боль, около лобка и въ срамной промежности съ припадками горячки, часпымъ, и съ болью сопряженнымъ испещеніемъ по каплямъ пламенной мочи, смѣщанной съ слизью, скоро на дно упадающею. Сверхъ этого воспаленіе сіе сопровождається всегда рвотою и запоромъ на низъ.

При лѣченіи сей болѣзни надлежиши поспупашь шакъ, какъ сказано при лѣченіи воспаленія потекѣ (смоп. § 107).

ВОСПАЛЕНИЕ МАТКИ (*).

§ 109.

Воспаленіе матки всегда сопряжено съ сильною болью, сжениемъ, напряженіемъ и опухолью въ нижней части чрева и наиболѣе въ пазѣ. Маточное ошверстіе при осязаніи оказываетъ боль, при томъ бываешь твердо, опипянуто вверхъ и за першо; сверхъ этого обнаруживается шрудное испражненіе кала и мочи; рвота, боль въ грудяхъ и головѣ, и мѣсячное, или родовое очищеніе совершенно оспавливается.

(*) Матка есть женская внутренность, въ которой зародышъ содержится и питается до рода. Лежитъ она въ пазу между мочевыми пузыремъ и прямою кишкою.

Сіе воспаленіе легко можешъ произойти ошъ скораго прекращенія, или родового очищенія при родахъ, или обыкновенного мѣсячнаго очищенія; и въ шакомъ случаѣ надлежишъ дѣлать впрыскиваніе въ рукавъ машки, изъ опвара льняныхъ сѣмянъ, бузины и ромашки, а къ наружнымъ дѣшороднымъ частямъ съ большою пользою можно припускашъ піявки.

Кромѣ сего могутъ произвести воспаленіе машки шрудные роды, проспуда родоворныхъ частей, полипы, выпадение и заворачиваніе машки, шеченіе острыхъ бѣлей, насилия и другія симъ подобныя вліянія, коихъ дѣйствіе ограничивається шолько на одну минушу.

Въ семъ родѣ воспаленія, буде оно не слишкомъ еще увеличилось, теплая вода, снаружи употребляемая и легко пряные наришки при должномъ спокойствіи шѣла, большею часщю довлишельны къ излѣченію.

Когда же достигнетъ оно значительной ступени, то попрѣбно спокойствіе шѣла, шишина, умѣренная температура и прямое положеніе.

Дѣшородныя части надлежишъ прилежно обмывать теплою водою, попомъ прикладывать на оныя губку, обмоченную въ теплый ромашковый опваръ, приготовленный изъ вина, смѣшанного по поламъ съ водою. При сильныхъ боляхъ напиравши брюхо и внутреннюю

поверхность ляшекъ теплою водкою, и дѣлашь, какъ при воспаленіи желудка (§ 95), мыльную припарку на брюхъ.

Если жаръ и сжение въ спраждущихъ частяхъ еще болѣе увеличиваешься, то обмывашь все тѣло, а преимущественно брюхо теплою водою и водкою, прикладывашь на брюхо фланель канфорою напершую, употребляшь упомянутые при воспаленіи желудка клиスピры, а внушишь слизистые напишкы, особенно миндалевидное молоко, сбитое съ яичнымъ желткомъ.

Коль скоро окажешся значительная слабость во всемъ тѣлѣ, то нужно удовольствоваться, не приближающейся ли, или не существующей ли уже гнилая, либо первая горячка. Буде то, или другое случившееся, то поступай совершенно такъ, какъ предложено при обѣихъ сихъ горячкахъ (§ 27 и 37).

О СКОРОТЕЧНЫХЪ БОЛЬЗНЯХЪ КОЖИ ВООБЩЕ.

§ 110.

Симъ именемъ называются вообще тѣ болѣзни, кои предшавляются намъ подъ видомъ пяпень различнаго цвѣта и формы, или подъ видомъ пупырышковъ, прыщей, спрутьевъ, соединенныхъ всегда съ болѣе или менѣе сильною огневицею, какъ шо: корь, красуха и пр.

К о р ь.

§ 111.

Корью называется накожная, сопряженная съ горячкою болѣзнь, кошорая начинаяется насморкомъ, красными, слезящимися глазами, сухимъ хрипливымъ кашлемъ, или охриплоспію; и подъ конецъ прешьяго дня, а иногда не много позже образуешь множесшво небольшихъ красныхъ пяпень, кои бываюшь нѣсколько возвышены, не нагноиваюшися, а по испеченіи 6, 7, 14 или 21 дня оканчиваюшися слупливаніемъ кожи, въ видѣ отрубей.

Болѣзнь сія имѣющъ собственныя свои

Явления и родъ теченія.

§ 112.

1) *Предъ появленіемъ ея обнаруживающающа ся насморкъ, кашель, охриплость, слезоиздѣланіе, спѣсненіе въ груди, боль въ горлѣ и пояснице съ успалостью во всѣхъ членахъ.*

2) *Во время появленія.* Проспудныя сіи припадки продолжаются обыкновенно нѣсколько дней, пошомъ оказывается ознобъ, смѣняющейся жаромъ, течение мокроты изъ носа, краснота и чувствительность глазъ, осиротѣлая и горячая слезы, сухой раздражительный кашель, распухшее лицо, еще большая охриплость, а иногда и бредъ. На четвертый день появляются сперва на лицѣ, пошомъ на груди, а наконецъ на шѣль, и т. д. красные, нѣсколько возвышенныя, близко другъ къ другу сидящія, мало по малу разширяющейся папиллы, подобныя папиламъ оспающимся послѣ укушенія блохъ и рѣдко уменьшающейся горячкѣ. Образованіе сіе продолжается до папаго, или шестаго дня.

3) *При достижении высокой степени.* Жестокость горячки значительна увеличивается, образование папилъ не доспавляетъ никакого облегченія, происходя большую часпю очень скоро, и не рѣдко разомъ; самая папилла высокаго краснаго

цвѣта; кашель сильный и сопровождается великою болью въ груди. При томъ обнаруживаются мѣстные воспаленія, какъ то: воспаленіе груди, жаба, у взрослыхъ бредъ, а у дѣтей судороги. Кожа повсюду дѣлается напряженіемъ и раздущена. Преимущественно распухаетъ лицо и глазные вѣки. При изсыханіи сыпи появляется впора горячка съ новыми припадками воспаленія груди.

4) *Во время уменьшения.* На седьмой день корь, на лицѣ находящаяся блѣднѣшъ, опухлость лица опадаетъ, верхняя кожица жесткнѣетъ и при большомъ зудѣ слупливается въ видѣ ошрубей. Иногда исчезаетъ она безъ примѣшанаго слупливанія. Здѣсь также не рѣдко примираются кровоизлиянія, попѣтъ, густая моча и поносъ.

5) *Во время перемѣны.* Необыкновенный попѣтъ, недостатокъ мочи, судороги, мгновенное исчезаніе кори безъ скоро послѣдовавшаго возвраща. Кашель и мокрота приостанавливаются и угрожаютъ задушеніемъ. Наспупающіе судороги и обмороки, оканчивающіеся смертию.

РАСПОЗНАВАНІЕ.

§ 113.

Корь иногда весьма много сходствуетъ съ красухою, по чьему необходимо нужно

ошлиchanь ее: ибо лъченіе обѣихъ сихъ болѣзней не одинаково. Высыпь въ кори болѣе приподнимаешся на кожѣ, производя шереховатоспь въ оной ощупью удоборазличаемую, а въ красухѣ эпо едва примѣшно, исключая весьма малую шереховатоспь, елучающуюся иногда на локтяхъ. Время выхожденія сихъ обѣихъ сыпей также различно: корь начинаетъ появляться около третьяго дня на подбородкѣ и груди, и не прежде че спустя го дня доходитъ до плечъ и рукъ, а высыпаніе красухи показываєтся уже во впорой день, какъ на лицѣ, такъ и на плечахъ. Красноспь въ скарлашинѣ или красухѣ распространяется равнообразнѣе, нежели въ кори, и не ошичається ость природнаго цвѣта кожи ошдѣленными пятнышками. Въ скарлашинѣ кашель слукается рѣдко, слезещеніе изъ глазъ малое, вѣка не красны и не распухши, а въ кори напропивъ того.

И с х о д ы.

§ 114.

Обыкновенные и не рѣдко совершенно болѣзнь сю рѣшающіе переломы сушь: мота, поносѣ, а иногда и кровотеченія.

При неправильномъ же шеченіи сего недуга образующаяся, или

а) Болѣзненные исходы, наипаче воепа-

ление груди, хронической, или продолжительный кашель, чахотка легкихъ, нагноение и воспаление глазъ, или

б) Смертельные, кои сушь: посыръль, сонная немочь и конвульсіи.

Предсказание.

§ 115.

Такъ, какъ корь можешъ соединяшъся со всякою изъ предложенныхъ родовъ и видовъ горячекъ, то легко можно понять, что опасность ея, вообще зависить отъ опасности, существующей при ней юкой либо изъ сихъ горячекъ, и что следственno предложенный при оныхъ горячкахъ предсказаний могутъ и здесь быть приняты.

Сверхъ этого опасность сей болѣзни наиболѣе зависитъ еще

а) Опть состоянія легкихъ.

б) Опть возрасла. — Весьма опасно быть она въ первыхъ двухъ годахъ жизни; пошомъ до четырнадцатаго года она уже не споль опасна. А во время возмужалости наступаешь опять опасный періодъ ея.

с) Опть кашля. Сомнительно,

а) Если кашель очень сильный и приводитъ съ признаками воспаленія груди, или^{*} легкихъ,

б) Если онъ послѣ кори продолжается 8 и 14 дней.

Когда корь вдругъ исчезаетъ и опять въ скоромъ времени обнаруживается, то сие показываетъ аспеническое или первое свойство ея.

Буде же одинъ разъ, скрывшись со всемъ не обнаруживается, то всегда надлежишъ опасаться худаго онай исхода.

Причины.

§ 116.

Причина сей болѣзни состоитъ въ одной собственной заразительной матеріи, которая будучи растворена въ воздухѣ и чрезъ вдыханіе его воспринята въ человѣческое тѣло, рождающъ сю съть и ея припадки.

Впрочемъ къ возможному дѣйствію шакового яда принадлежишъ особенная склонность тѣла къ восприятію его, — и особы, перенесшіе одинъ разъ сей недугъ, навсегда уже освобождаются отъ онаго.

Болѣзнь сія въ сущности своей, есть нечто иное, какъ особенное сообразное свойству кори воспаленіе мокрошной оболочки, покрывающей носовую полость, горло и легкія, огнь коихъ уже сообщающейся она и наружной поверхности кожи.

Л ъ ч е н і е.

§ 117.

При лъченіи требуешся брашь во внимание свойство сопутствующей горячки и упомянутыя, особенно пораженные части.

Какая горячка, шакой избираешся и способъ лъченія, предложенный уже при каждой огневицѣ въ особенности. Сверхъ этого здѣсь должно еще присовокупить иѣкошюя замѣчанія.

I) Касательно діэты могутъ быти слѣдующія правила:

1) Во время образованія кори. Если она небольшая и горячка не сильна, то умеренно прохладное содержаніе, избѣжаніе всякой мясной пищи и спиртныхъ напитковъ, частое употребленіе распищельной пищи, наипаче овощей, и прохладишельные налишки для сего намѣренія уже досшапочны. При всемъ всячески надлежиши предосперегающи опь сильныхъ разслабленій, дѣйствующихъ на больнаго, поелику опь сего сила, потребная для сыпи значительно уменьшается, слѣдовательно легко могутъ произойти болѣзненные исходы, и самый недугъ чрезъ сіе удобно перемѣняетъ свое свойство. Тогда только, когда во время образованія оной чрезмѣрно усиливающи чисто воспалительное со-

спояніе, можешъ имѣть мѣсно ослабляющаи и прохладжающая діэпа, при коей прохладный воздухъ, легкое поирывало, сидячее положеніе и совершенное пребываніе безъ поспели, супъ наидѣйствишаельнѣйшія средстїва. Нужно также спа-
раться о чистополь пѣла, бѣлья и поспели.

2) Во время образовавшейся чже кори. Температура должна быть, смотря по воспалительному состоянію нѣсколько теплѣе, и спраждущій долженъ употребляти ячменное пипье съ медомъ, а временемъ и ромашковый чай по чашкѣ.

II) Домашнія средства оспающихся пѣ же, какія и при воспалительной горячкѣ, сверхъ штого.

1) Для умѣренія припеченія крови къ головѣ и чрезъ шо множесшво по всюду высыпающейся кори и для предосперенія отъ корчей, надобно предъ выхожденіемъ самой сыпи умывать лицо холдою водою и уксусомъ, дѣлатьльному нѣсколько разъ промывашельныя (какъ при воспаленіи груди, смотря домац. сред. § 88 — 7) и ножныя ванны. На сей же конецъ можно прежде высыпанія кори прикладывать къ икрамъ кислое шѣспио съ уксусомъ, или вмѣсто его нѣсколько кружковъ перешупниа, оспавляя до красноши на приложенныхъ мѣсахъ.

2) Если обнаружится жестокая голов-

ная боль, или бѣшенство, то поспупашь такъ, какъ предложено при воспаленіи мозга (§ 69).

3) При сильной боли въ горлѣ приспавляшь пѣвки около шеи, принимашь почаще въ ротъ холодное ячменное питье, смѣшанное съ медомъ и уксусомъ, и держашь въ ономъ, пока нагрѣешся. Можно также употребляшь почаще розовый медъ, если окажутся въ ономъ язвинки и дѣлашь вокругъ шеи теплую припарку.

4) Кашель, присоединяющійся къ кори, въ началѣ оной большею частію бываетъ прослушданаго свойства (см. Кашарръ § 136). Но если онъ происходитъ позже отъ нарывовъ во рту и въ дыхательномъ горлѣ, то можно употребляшь ячменное питье или молоко съ водою, и вдыхашь пары изъ теплой воды и бузиннаго наспоя.

5) Страданіе мочеваго пузыря излѣчивающіеся умѣреннымъ движениемъ въ комнатахъ, промывашельными, кисловашими напишками, теплыми ножными ваннами, припарками или прикладываніемъ теплой салфетки на брюхо; а если моча остра, то ячменнымъ питьемъ и отваромъ просвирокъ.

6) Въ первомъ періодѣ, равно, какъ и при окончаніи кори, буде находяшися признаки какой либо грудной болѣзни, поспупашь такъ, какъ показано при воспаленіи груди (§ 88).

7) Очень часпо по совершенномъ слуп-

лени кори является кашель, особенно, когда горячка была очень сильная, или когда больной не предостерегает себя вдругъ послѣ болѣзни отъ столь вредна го при теперешнемъ его положеніи вліянія обыкновенной температуры атмосферного воздуха.

Въ обѣихъ случаяхъ кашель бываетъ спеническаго происхожденія и требуетъ лѣченія, предложенаго при воспаленіи груди.

8) У слабыхъ людей, гдѣ образованіе кори по недоспашку силь медленно про исходитъ, или гдѣ птицна кажущаяся вя лыми и блѣдными, преимущественную оказываютъ пользу теплые напишки, теплое содержаніе, теплые ванны, или припарки и нѣсколько чашекъ чаю съ лимоннымъ сокомъ, или съ небольшимъ количествомъ рома. Если высыпь до над лежащаго времени скроется и послѣдуешь сильная тоска, бредъ и судороги, то на добно спараться вызвать оную къ на ружѣ посредствомъ теплыхъ ваннъ и шпанскихъ мушекъ прикладываемыхъ къ груди и къ ногамъ, давая шакже внутрь по немногу вина, разведенаго теплую водою, или наспой бузинныхъ цвѣловъ, и не пермяя времени, прибѣгнуши къ со вѣшу врача.

Красуха или скарлатина.

§ 118.

Красуха есть накожная болѣзнь съ горячкою, начинающаяся боль въ горлѣ; при чёмъ около чешвершаго дня распухаетъ лицо, а на кожѣ образуются сначала небольшія, но въ скоромъ времени увеличивающіяся, безобразныя, широкія, яркаго краснаго цвѣта, безъ всякаго возвышенія и большею часцію вмѣстѣ сливающіяся пятна.

Болѣзнь сія такжে имѣетъ собственныя свои

ЯВЛЕНИЯ И РОДЪ ТЕЧЕНІЯ.

§ 119.

1) *Предъ появленіемъ ея оказываются всѣ предвестники огневицъ, и при шумѣ, особенно еще болѣе или менѣе ощущаемая боль въ горлѣ и давленіе въ головѣ.*

2) *Во время появленія обнаруживается дрожь, ознобъ и жаръ, кои въ продолженіи трехъ дней по перемѣнно одинъ за другимъ наступаютъ и умножаются къ вечеру. При семъ оказывается также чиханіе, насморкъ, слезопеченіе изъ глазъ а иногда уже и сильная боль въ горлѣ. На чешвертый день лицо не много опухаетъ, боль или сженіе въ горлѣ увели-*

чиваешся, дыханіе запрудняється, въ головъ дѣлаешся пягостнь, круженіе, нечувствительность, а иногда и великая боль; далѣе высупаешь и самая сыпь, коей образованіе ошъ прерхъ до четырехъ дней продолжается и уменьшаешь жестокость припадковъ.

3) Во время дастіженія высокой степени. Пульсъ крѣпкій, опухоль и воспаленіе горла увеличиваешься, дыханіе запрудняется, сверхъ этого оказываются грудные боли, красное раздутое лицо, сильная головная боль или бредъ.

4) При чумаленіи. Около седьмаго дня не рѣдко вся кожа слупливается въ большихъ кускахъ, при этомъ является пошъ, поносъ, густая моча, а иногда и кровоизлияние изъ носа.

5) При перемѣнѣ происходитъ повсемѣстная водянная болѣзнь, дѣлающія раны во рту и носу, во время слупливанія не примѣчаешь никакого пошса, затрудненіе дыханія просыпрается до задушевнія, больной не можетъ ничего глотать, пачина при ихъ образованіи уже дѣлающія синеватыми, или усѣянными белою просою. (О распознаваніи ея, смит. § 113).

И с х о д ы.

§ 120.

Здѣсь примѣчающіяся почки шѣ же переломы, какъ и при кори, а

а) Болѣзnenныя исходы сушь наипаче подкожная, грудная, брюшная и мозговая водяная болѣзнь, одышка, жаба, косно-ѣда ноздреватыхъ носовыхъ косшей, гнойные накопленія въ различныхъ мѣ-снахъ, испошеніе, опухоль шейныхъ и заушныхъ железъ.

б) Смертельные же сушь: задушеніе и аптоново-огненная жаба.

Предсказание.

§ 121.

Вообще предсказание основывается на сопровождающей горячкѣ. Сверхъ этого здѣсь еще участвующіе слѣдующіе случаи:

При высыпаніи уже пятенъ болѣзнь сія можетъ быть опасною описанъ угрожающимаго ею задушенія.

Распуханіе наружныхъ частей шеи есть весьма хороший признакъ; оно доказываетъ умрѣнную спепень болѣзни.

Большую, или меньшую опасность опредѣляетъ также сосипояніе дыханія и глошанія.

Опасно, если носовая полость воспаляется въ одно время съ горломъ.

Пяптина бывающая въ самомъ начальствомъ синеватыя, или смѣшанныя съ бѣлою просою служатъ сомнительнымъ признакомъ и показываютъ гнилой характеръ болѣзни.

Если съиль непостоянно появляется, то въ шомъ, то въ другомъ мѣстѣ, и опять скрываешься, то сие доказываетъ нервное свойство ея.

При большихъ грудныхъ боляхъ должно опасаться воспаленія легкихъ, или легочной чахотки. Въ семъ случаѣ частое изверженіе мокроты есть весьма хорошее явленіе.

Иногда слюноотеченіе бываетъ весьма хорошимъ признакомъ.

Большая предстоитъ опасность во время высыпанія и слупливанія, а еще болѣе шопчась послѣ болѣзни, наипаче если грудная водяная болѣзнь, судорожное сведеніе челюшней и сполбнякъ или другие судорожные припадки происходяшь.

Причины.

§ 122.

Причиною равномѣрно и здѣсь бываетъ собственная заразительная матерія, отличающаяся отъ прилипчивой матеріи кори шѣмъ, что не такъ растворена въ воздухѣ, а только смѣшана съ нимъ, отъ чего не споль скоро прилипаетъ и пребуешь уже большого приближенія къ спраждущему.

Сія зараза не на всѣхъ людей действуетъ и хоща рѣдко, но производитъ сию болѣзнь нѣсколько разъ въ одномъ

шѣлъ; она шакже весьма лепуча и кромъ кожи, поражаєшъ особенно нервы и сосуды, проводящіе пасочную влагу, дѣляя особенное воспаленіе въ горлѣ и кожѣ.

ЛѢЧЕНИЕ.

ЛѢченіе можешъ бытишь то же самое, какъ и при кори, съ тѣмъ только различіемъ, чѣпо здѣсь надлежишъ болѣе обращать вниманіе на особенно спрѣждующія часши, и спарашься предохранять опѣ водяной болѣзни.

При умѣренной степени болѣзни, кроме діэпты и домашнихъ средствъ, показанныхъ при воспалительной горячкѣ и кори, ничего болѣе не нужно. Должно только во время слупливанія осперегаться больному просипуды; ибо въ семъ случаѣ легко можешъ произойти водянная болѣзнь. По сей причинѣ Киліанъ со-вѣтуешъ въ шакое время ежедневно пить по нѣскольку чашекъ бузиннаго чаю. Если же кожа, или другая часшь шѣла начинаешъ распухать, то надобно спрѣждующія часши почше наширапть фланелью, а иногда обмывать шеплою зодою и виномъ, или мыломъ. Ввечеру, ложась спать, принимашъ по двѣ чашки чаю съ двумя ложками вина; а буде водянная опухоль уже значиша, — пить въ день по три чашки можжевельнаго чаю. Сей послѣдній чай Киліанъ испыталъ

многоокрашно и рекомендуешь въ семъ случаѣ, какъ оспмѣнное средство.

Въ сильнѣйшемъ спасении болѣзни, гдѣ находишься большой жаръ въ шѣль и сухость въ кожѣ, ускоренный пульсъ и боль головы, хорошимъ средствомъ можетъ иногда служить обливаніе, или погруженіе больнаго въ холодную воду; оипъ чего въ скромъ времени слѣдуешь неожиданное облегченіе. Многіе знаменитые Англинскіе врачи средство сіе превозносятъ весьма много и одинъ Корри имѣль удовольствіе видѣть на 150 особыхъ, одержанныхъ скарлапиною въ раннемъ періодѣ, чрезвычайную пользу и успѣхъ отъ обливанія холодною водою. Въ началѣ красухи безъ озноба и дрожи съ беспресѣннымъ жаромъ онъ тщѣсть обнаживъ больнаго, обливалъ его холодною водою, повторяя сіе при возвращающемся жарѣ разъ десять или двенадцать въ сушки.

Обливанія и погруженія можно замѣнить проспымъ обмываніемъ шѣла губкою, обмоченою въ равныхъ частяхъ холодной воды и уксуса, допуская къ сему еще свободный доступъ свѣжаго воздуха въ комнату больнаго.

Впрочемъ шамъ, гдѣ примѣчаешься дрожь или наклонность къ испаринѣ, употребленіе холодной воды возбраняется и можетъ быть замѣнено теплою водою съ уксусомъ.

Вообще въ раннемъ періодѣ болѣзни, когда силы еще не совсѣмъ ослабѣли, жаръ, сухость кожи и лихорадочная то- скливость нарочито велика, можно обливать или обмывать больнаго холодною водою; но когда горячка продолжается уже нѣсколько дней, наступила чрезмѣрная слабость тѣла, жилобіеніе слабое, неправильное и кожа ослабѣла, то теплая вода гораздо полезнѣе.

Кровопусканіе изъ руки здѣсь возбраняется: ибо оно причиняетъ иногда чрезмѣрный вредъ.

Если же горло очень воспалено и части его распухли такъ, что затрудняется глотаніе и дыханіе, то лучше припустить подъ каждымъ ухомъ нѣсколько піявицъ. При краснотѣ глазъ и жеешкокомъ бредѣ небезполезно приpusкать піявицы къ вискамъ.

Лѣченіе прочихъ случающихся въ сей болѣзни припадковъ производится такимъ образомъ, какъ показано при кори.

При лѣченіи воспаленія горла надлежитъ поспупать такъ, какъ сказано выше при жабѣ (§ 81).

§ 125.

Предосторожности отъ зараженія.

Извѣстно, что красуха есть весьма прилипчивая болѣзнь, и что она при по-

явленіи ея въ учебныхъ заведеніяхъ и семействахъ, можешьъ наносить великій вредъ, безъ надлежащихъ предоспорожностей. По сему, для обезпеченія себя и благосостоянія воспитывающихся дѣшей, необходимо нужно содергашемъ пенсіонъ имѣть въ гошовности одну или двѣ комнаты, смотря по обширности заведенія, для помѣщенія занемогающихъ, запрещая всякое сообщеніе между комнатами, для больныхъ приготвленными и оспальною частию дома.

Коль скоро болѣзнь ошкроется въ одномъ субъектѣ, что сей часъ надлежитъ его отдатьши отъ прочихъ, пошомъ спариться уничтожиши въ постороннихъ спрахъ и беспокойство, поелику сіи весьма много способствуяша заразѣ.

Когда пенсіонъ или школа имѣетъ удобное расположение комнатъ и большое число учениковъ, то сихъ послѣднихъ распускашь не должно; ибо въ прошивномъ случаѣ шѣ изъ нихъ, у коихъ зараза была еще скрытая, могущъ въ домахъ своихъ заболѣть и шѣмъ распространять заразу.

Удоспившись въ заразѣ, предотвративши источникъ оной, отдавши первоначально заражающихся и приспособивши спрятка предохранительныя мѣры, можно пресѣчь болѣзнь въ самомъ ея началѣ.

Куренія изъ морганца, поваренной

соли и сърной кислоты, производимая по предложенному при гнилой горячкѣ (§ 30 — 5, б) способу, уничтожающа си-лу и скарлатинной заразы.

Къ предохраненію отъ заразы способствуетъ вообще все, что служишъ толь-ко къ укрѣплению шѣла, к. п. хорошая діэша, умѣренное шѣлодвиженіе на чи-спомъ воздухѣ, чистота и опрятность. Присматривающіе за больными не должны прямо становиться предъ больнымъ и вдыхать воздухъ, выдыхаемый ими: ибо сіе болѣе всего способствуетъ за-разѣ.

Р о ж а.

§ 124.

Рожа есть воспалительного рода крас-нота кожи, которая можетъ занимать всѣ поверхносныя части шѣла, сопря-жена съ малопримѣшаннымъ возвышениемъ на кожѣ, не имѣетъ правильныхъ гра-ницъ, распространяется на подобіе ланд-карпы и причиняетъ болѣе зудъ и жже-ніе, нежели сильную боль. Цвѣтъ ея кра-сно-блѣдный, оплавляющій часто жел-тымъ, а иногда чернымъ. При давленіи перстами краснота ея исчезаетъ, остав-ляя бѣлые слѣды, а по прекращеніи дав-ленія опять появляется.

Рожа бываещъ преимущественно двухъ родовъ, к. ш. водяно-опухольная и воспалительная.

Отетная рожа цвѣпъ имѣещъ блѣдно-красный, болѣ слабую и при шомъ значительную опухоль; но рѣдко сопровождается горячкою.

Воспалительная напропивъ рожа отличается высокимъ, краснымъ, или темно-краснымъ цвѣпомъ, болѣе ограниченной, пвердою опухолью, сильною, блющуюся болью, и шѣмъ, что всегда сопряжена она съ горячкою.

Здѣсь будеши говорено о послѣднемъ родѣ, кошорый имѣещъ слѣдующія

Явленія и родъ течения.

§ 125.

1) Предѣ появленіемъ кожа больнаго дѣлается шероховатою, голова сильно опьягощающающа, и ш. д. какъ при воспалительной горячкѣ.

2) Во времѧ появленія обнаруживающа поперемѣнныи ознобъ и жаръ, наипаче въ лицѣ, шакже головная боль, шягоспѣ во всѣхъ членахъ, совершенная разбистоспѣ, боязливоспѣ, беспокойство, шошноша, рвота и бредъ. У дѣшней происходяще конвульсии и сонная немочь. На ширеній, или четвертий день пошомъ появляюща ровцая, мягкая, обширная,

блѣдно-красная, желтымъ цвѣтомъ оплывающая, лоснящаяся краснота съ нѣкоторою опухолью, кошорая при давлениіи перстомъ теряетъ свою красносТЬ, а по опинаяшіи вдругъ опять обнаруживается. Она бываетъ соединена съ напряженіемъ, жженіемъ, зудомъ и часто съ жестокой болью. Сыпь сія весьма лепучая и легко перемѣняется свое мѣсто. По выступленіи ея, вышеупомянутые припадки приходяще въ послабленіе.

3) *При достижении высокой степени* пульсъ бываетъ тверже, полнѣе, сильнѣе и чаще. Воспаленіе получается высокой красной цвѣтъ съ ограниченной твердою опухолью и сильною бѣющеюся болью. Предыдущіе припадки и, по образованіи рожи, ни мало не уменьшаются. У иныхъ рождаются желваки и нѣкоторая боль въ железахъ. На рожѣ образуются иногда пузырки, а иногда язвинки, или шакъ называемая пузырчатая рожа. Если она еще болѣе усиливается и будеши занимать голову, то происходить бѣшенство и безсонница.

4) *Во время чумленія.* Сыпь продолжается обыкновенно четыре, а часто и двадцать дней, попомъ оканчивается слупливаниемъ кожи. Иногда остается еще блѣдная опухоль, но она исчезаетъ, коль скоро обнаружится попъ, умноженное отдаленіе мочи и поносъ, съ коими уменьшаются и упомянутые припадки.

5) При перелѣнѣ цвѣшъ рожи дѣлається чернымъ, цвѣшу помершѣлыхъ частей подобнымъ; анпоновъ огонь распространяется скоро, раждаючися гноючки, или анпоново-огненные пузырки, выходящіе одинъ за другимъ и испускающіе въ большомъ количествѣ нечистую сукровицу. Спраждущій трудно дышитъ, бредишъ и проч.

И с х о д ы.

§ 126.

Переломы сей болѣзни суть общіе съ переломами горячки, находящейся съ нею въ сопряженіи. А поелику рожа большою часпію бываешъ соединена съ проспудною и желчною горячкою, то и рѣшаешся наилучшимъ образомъ свойственными обѣимъ симъ лихорадкамъ переломами, наипаче мочею и пѣромъ.

а) Болѣзненные исходы суть: нагноеніе нѣкоторыхъ мѣстъ, на коихъ рожа находилась, запвердѣніе кожи и цѣлыхъ членовъ, опухоли на ногахъ, подкожная и грудная водянная болѣзнь, съумазбродство.

б) Смертельные суть: скорошечная чахопка, анпоново - огненная рожа, поспрѣль, задушеніе.

Предсказание.

§ 127.

Сообразуемся съ существующею горячкою.

Рожа можетъ занимать всѣ части шѣла и опасность ея зависитъ отъ большей или меньшей важности, занимаемой ею части. Случающаяся на лицѣ есть наиопаснѣйшая предъ прочими родами оной и всегда можетъ угрожать воспаленіемъ мозга. Не рѣдко на рожѣ образуются пузыри; сіе почишаются худымъ случаемъ, поелику пузыри сіи легко приходяще въ нагноеніе.

Причины.

§ 128.

Все, что въ состояніи причинить горячку, можетъ произвести и рожу, напаче, если съ симъ сопряжена буде пропуска шѣла, происходящая отъ сырого и пришомъ холоднаго воздуха, или имѣется расположение къ желчной горячкѣ; оба послѣдніе случаи суть часущія причины сей болѣзни.

Лѣченіе.

§ 129.

Однаково почти съ лѣченіемъ предыдущихъ накожныхъ болѣзней. Здѣсь

шолько надобно обращашь особенное внимание на болѣе спраждущія частши.

Когда рожа легкая, горячка умъренная, и больной уже самъ начинаешь пошѣпть, или когда рожа аспеническаго свойства, произошла наприм: послѣ продолжительной печали, или опѣ влажнаго жилища, или опѣ проспуды какихъ либо частей, безъ послѣдующаго шопчаша за симъ согрѣшія, въ то время преимущеспвенное оказываютъ дѣйствіе: наружная теплота, нѣсколько чашекъ чаю, внутрь принимаemаго, также умъренно пошо-гони-шельные средства, какъ то: настой сухой малины, употребляемый чрезъ часъ по получашкѣ, сырья сельди, анчоусы и инбирный чай, для сославленія коего слѣдуешъ взять на чашку кипячей воды сполько инбирию, сколько можно его захватить концомъ ножа и наспоявъ подолѣе, процѣдишь и употребляшь такимъ образомъ, пока еще онъ тепль, два раза въ день.

Но коль скоро рожа весьма сильная, то надлежитъ паче всего избѣгать употребленія снаружи такихъ средствъ, кои могли бы разгорячить; но поперемѣнно омывалъ лѣло холодною водою, или снѣгомъ, обсыпашь спраждущія мѣста холодною бѣлою мукою до шѣхъ поръ, пока припадки придутъ въ меньшую степень жестокости и появится пошѣпть. Однако при употребленіи холодной воды

нужно остерегаться, дабы спраждущій снова опять не подвергнулся виѣшнему жару.

Если рожа поразила лицо, или вообще голову, спраждущій жалеется на жестокую головную боль, бредишь и т. д. то надобно открыть кровь, или приставить нѣсколько піявоек къ обоимъ вискамъ, а между лопашками приложиши нарывный пласцырь, поддерживающе наранное имъ място нѣсколько дней въ нагноеніи; при томъ держашь больного въ умѣренной температурѣ, доспавлять ему прошиву воспалительные и испаренію кожи способствующіе напитки и содержаніе, какъ при воспаленіи мозга (§ 69) и воспаленіи кашаррѣ (141).

Если рожа произошла отъ желудочныхъ нечистотъ, обнаруживающихся дурнымъ вкусомъ во рту, нечистымъ языкомъ, давленіемъ подъ ложечкою, и горячка слабая или вовсе оной не находящаяся, то можно дать рвотное, или слабительное, смотря по обстоятельствамъ, показаннымъ при желчной горячкѣ (§ 47 и 48).

При опечной рожѣ можетъ служить съ пользою слѣдующее средство: взявъ при лопатѣ конопляныхъ сѣманъ, два лопаты ржаной муки, одинъ лопатъ ромашковыхъ, одинъ лопатъ бузинныхъ цвѣтовъ и половину золотника камфоры, превративъ все сіе въ порошокъ, зашипъ въ

мъщечекъ и, нагрѣвши, прикладывашь къ водяно-опухлой часпи. Къ сему шакже доспашочна уже и одна бобовая мука.

Впрочемъ случається, чпо по уничтожениі сей болѣзни, въ другомъ какомъ нибудь мѣстѣ опять находятся слѣды ея, сопряженные съ расположениемъ къ ней, шакъ, чпо она, будучи совершенно почти испреблена, опять обнаруживается и опять шеряется, и шакимъ образомъ оспавляешь, касательно оправленія кожи, многоразличныя гибельныя дѣйствія, производишь изсушеніе и ш. д.

Въ шакомъ случаѣ должно спаравшися о надлежащемъ поправленіи кожи посредствомъ шепыхъ ароматныхъ щелочныхъ, или сѣрныхъ ваннъ, шакже о прилежномъ шѣлодвиженіи, наипаче въ свободномъ воздухѣ, еспыли позволяешь погода. Между шѣмъ употребляешь легко свариваемыя ароматныя, особенно изъ живопшаго царства пышательныя средспва, удобоваримое горькое пиво, вино и проч. Иногда, наипаче во время выздоравливанія можно принимать въ день по чепыре, или шеспти чашекъ чаю изъ можжевельныхъ ягодъ съ лимоннымъ соскомъ, либо ромомъ, или бѣльмъ виномъ.

Сверхъ шого при выздоровленіи поспушашь шакъ, какъ при воспалительной горячкѣ.

Ревматизмъ или ломота съ горячкою.

§ 130.

Ревматизмомъ называється горячка, сопровождаемая жестокостью, колющею или рѣзкою болью, оказывающеюся преимущественно въ суставахъ рукъ и ногъ, а иногда распространяющеюся и на прочія части нашего тѣла, особенно на мышцы и увеличивающеюся отъ движенія.

Собственныя сей болѣзни

Явленія и родъ теченія.

§ 131.

Суть слѣдующія:

- 1) *Предъ наступленіемъ* пиягость и усталость въ членахъ.
- 2) *Во время наступленія* попрерыванный ознобъ и жаръ, жажда, беспокойство, сильная рвущая и колющая боль въ какомъ-либо членѣ, которая по постояннаю, по бродящую бываетъ и умножающа-ся при движении. Крѣпкій, полный, нерѣдко привердый и учащенный пульсъ, полное и частое прудное дыханіе. Иногда ревматизмъ распространяется по всему тѣлу, и въ то время, спраждущій при сильнейшихъ боляхъ, какъ дерево, въ поспели долженъ быть переваливаемъ съ одной стороны на другую, если же

лаешь онъ перемѣнишь свое положеніе. Прочія оправленія шѣла такимъ же образомъ спрѣждущъ, какъ и при простой воспалительной горячкѣ.

3) *Во время достиженія высокой степени*, на преимущественно спрѣждущихъ частяхъ происходишь иногда сильное воспаленіе, опухоль и краснота; сверхъ того боль въ горлѣ, воспаленіе груди, воспаленіе мозга съ бѣшенствомъ и проч.

4) *Во время умаленія*, которое обыкновенно продолжается 8, 14 дней, а не рѣдко и долѣе, кожа дѣлается влажною попоною, жескокость боли и прочихъ припадковъ умаляется. Иногда появляется поносъ, слюноотеченіе, насморкъ, испещченіе слизи и кровоотеченіе изъ носа — и болѣзнь прекращающа.

5) *Во время перемѣны обнаруживающейся бѣлая проса, упорная сыпь, пузырьки на шѣлѣ, ломъ въ членахъ, и т. д.*

И с х о д ы.

§ 132.

Исходы сей болѣзни подобны исходамъ воспалительной горячки и сушь:

а) *Болѣзненные*, кромѣ упомянутыхъ при воспаленіи груди и мозга, сюда принадлежащъ еще окрѣплости, желваки, трудно разрѣшаемыя опухоли, негибкость сосцевовъ, нагноенія, косподѣда, упорная зубная боль, и т. д.

б) Смертельные, изъ сихъ обыкновенійшій еспь анпоновъ огонь.

Предсказаніе.

§ 133.

Однаково съ предсказаниемъ воспалительной горячки.

Причины.

§ 134.

Всякой скорый переходъ изъ холода въ теплопу, воспочный и съверный вѣпры, злоупрѣблѣніе спиртныхъ напишковъ, неумѣренность въ пипашельной, пряной пищѣ, сильная спраспи, преимущесшвенно сильный и скорый гнѣвъ, большое напряженіе шѣла, бѣганіе и верховая ъзда, наипаче прошивъ съвернаго и вос почнаго вѣпра, при разгоряченномъ шѣлѣ, и т. д. Всѣ сіи вредности у молодыхъ, крѣпкихъ, дородныхъ, равно какъ и у слабыхъ особъ, при вѣсма мало значущемъ уже вліяніи, могутъ легко произвести сю болѣзнь.

Болѣзнь сія еспь ни что иное, какъ воспаленіе мышицъ, или волокнистой плевы шѣхъ частей шѣла, въ коихъ она первоначально обнаруживается.

Л ъ ч е н и к.

§ 135.

Надобно поспупашь шакъ, какъ при воспалительной горячкѣ, обращая особенное вниманіе на болѣе спраждущія часши.

Если ломота и горячка сильная, болѣй среднихъ лѣпть, крѣпкаго сложенія и полнокровенъ, то можно пуспить надлежащее количество крови изъ руки, и при оспающейся послѣ кровопусканія краснитъ, боли и опухоли, не безполезно приспавлять піявки и кровососные рожки къ самой спраждущей часши.

Когда жесшокость болѣзни такимъ образомъ уменьшишася или она сама по себѣ не очень значительна, то спарашься наипаче о повсюдномъ правильномъ испареніи кожи. Къ сему намѣренію потребно обильное питье, содержаніе себя въ умѣренной температурѣ, употребление бузинного чаю, или наспоя сухой ма-лины, прикрываніе фланелью брюха и способствование самому испаренію. Въ особенности полезно въ семь случаѣ напирать слегка пѣ часши, кои наиболѣе спраждунія.

Мѣсшия боли весьма скоро укрощаются помощію паровъ, теплыхъ ваннъ и теплыхъ мягчишельныхъ припарокъ изъ просвирокъ, ромашки и муки льняныхъ сѣмянъ, взятыхъ по разной часши и сваренныхъ вмѣстѣ.

Если боли наружные вдругъ исчезнуши и на мѣсто оныхъ появятся спраданія внутреннихъ частей, то нужно на спрадавшихъ прежде наружныхъ частяхъ дѣлать пренія разными веществами и щепками, прикладывать горчичное пѣспо, шпанскій пласпирь, рожки и проч.

КАТАРРЪ.

(Проспуда, кашель и насморкъ).

§ 136.

Симъ именемъ называется то болѣзньное состояніе, которое оказывается охриплостью и кашлемъ, соединеннымъ сперва съ сухостью и напряженіемъ въ носу, глошѣ и дыхательномъ горлѣ, а потомъ съ болѣе или менѣе умноженнымъ печеніемъ мокроты изъ оныхъ.

Болѣзнь сія иногда сопровождается горячкою, а иногда нѣть, и бываешь двоякаго рода: воспалительного и мокротного.

Воспалительный катарръ имѣетъ слѣдующія

ЯВЛЕНІЯ И РОДЪ ТЕЧЕНІЯ.

§ 137.

1) Предъ наступленіемъ обнаруживается обыкновенно нѣкоторая охриплость,

сухій кашель, давленіе во лбу, поперем'яная небольшая дрожь по всему тѣлу, зудъ въ носу, щекотаніе въ горлѣ, уменьшеніе обонянія и вкуса, и иногда нѣкоторая перхоть.

2) Во время наступленія примѣчаются поперем'яный ознобъ и жаръ, дѣлающійся наконецъ постояннымъ; при этомъ жажда, умноженная головная боль, успалость, спѣсненное дыханіе, боль въ пойсницѣ и конечноспяхъ, ожесточеніе всѣхъ шаковыхъ припадковъ, къ вечеру съ нѣсколько скорымъ, нерѣдко крѣпкимъ пульсомъ и беспокойнымъ сномъ. Наконецъ къ сему присовокупляются еще непривычные слезы, жженіе во лбу, сухость или влажность носа съ чиханіемъ, умноженное количество слюны во рту, сухость въ груди съ охриплостью, кашлемъ и нѣкоторою болью.

3) При достиженіи высокой степени, оказываются всѣ припадки воспаленія груди, а иногда и воспаленія мозга (о коемъ выше сказано было).

4) При чиаленіи, бывшій прежде сухій кашель перем'яется въ мокрой, съ густою, желтою и облегченіе доспавляющею мокротою. Напослѣдокъ присоединяется къ сему еще потъ и умноженное опадженіе мочи.

5) При перелѣнѣ обнаруживается совершенно то же, что и при воспаленіи груди.

Напропивъ шого мокрошпннй катаррѣ не имѣешьъ споль правильнаго въ течении своеемъ порядка, а опличаешься вообще судорожнымъ раздраженнымъ кашлемъ, съ болѣе или менѣе умноженною и по большой часли жидкою мокрошпою, при чёмъ видъ больнаго ежедневно перемѣняется въ сѣрожелтый. По нѣкошоромъ продолженіи сего недуга появляется еще краткое прерывистое дыханіе, скорый, слабый и малый пульсъ, клейкая слюна, рвота, головная боль, круженіе головы, изнурительный кашель, напослѣдокъ несносная, постоянная грудная боль, жгущая жажда, жаръ и безпрерывное свиспаніе въ груди.

И с х о д ы.

§ 138.

Обыкновеннѣйшиe и при шомъ доброкачественные переломы сей болѣзни, сушь: попъ и моча, особливо при воспалительномъ катаррѣ, который оканчиваешься вообще въ десять или въ четырнадцать дней.

1) Болѣзненные исходы сушь: воспаленіе груди, кровохарканіе, воспаленіе мозга, продолжительный катарръ и чахотка легкихъ во всѣхъ ея формахъ.

2) Смертельные сушь тѣ же, какіе воспаленія груди и мозга.

Предсказание.

§ 139.

Капарръ самъ по себѣ не опасенъ; однако дѣлаеши шаковыи въ то время:

а) Когда присоединяется къ нему гнилая, или первная горячка.

б) Когда проспудное раздраженіе переходитъ въ воспаленіе легкихъ, или грудной плевы.

в) Когда долго продолжается, и чрезъ то причиняешьъ, или бугристую, или екоропечную чахотку. Знаменитый Тиссонъ справедливо сказалъ, что отъ пренебреженныхъ насморковъ болѣе умираешьъ людей, нежели отъ моровой язвы.

г) Когда одержимый имъ имѣешъ очень слабое сложеніе тѣла, особенно груди, или рожденъ въ свѣтъ съ природнымъ уже расположениемъ къ чахоткѣ легкихъ.

д) Еслыли капарръ есть слѣдствіе частыхъ невоздержностей, напаче въ водкѣ и подобныхъ тому напиткахъ, или когда происходишь онъ отъ непомѣрныхъ трудовъ, а еще болѣе отъ сидячаго рода жизни.

е) Еслыли одержимый имъ преклонныхъ уже лѣтъ.

Причины.

§ 140.

Кто отъ природы имѣешъ некоторую

болѣзненную раздражительность легкихъ и мокропной перепонки носа, или привыкъ жиши въ теплотѣ и очень тепло одѣваться, или находиши всегда въ заключенномъ воздухѣ, пошь весьма удобно можешъ получить кашель и насморкъ, еспыли онъ, или подвергаешься большому солнечному зною чрезъ долгое время, или много употребляешь горячительныхъ напитковъ, или сильно напрягаешь свое тѣло, наприм. бѣганіемъ, пѣніемъ, крикомъ и т. п. или не остерегаешься должнымъ образомъ опь проспуды.

Слѣдствиемъ сихъ вліяній, особливо когда онъ поражаютъ сильное, крѣпкое, или сангвинически раздражительное тѣло, всегда бываешь воспалительный кашарръ.

Еспыли же причиною онаго глубокая спарость, беспрещанныя пиршества и пьянство, неумѣреяно трудолюбивая жизнь, или чахоточное расположение тѣла, бѣдносТЬ, испорченная питательная вещества, частыя проспуды и пр., то всегда почти имѣешь онъ мокропное свойство.

Кашарръ самъ по себѣ есть ни что иное, какъ воспаленіе, занимающее:

1) Или мокропную перепонку носа (насморкъ).

2) Или слизистую перепонку вѣтвей дыхательного горла, т. е. шу, которая одѣваешь и легкія.

Л ъ ч е н і е.

§ 141.

Еспыли болѣзнь соспопить въ одномъ насморкѣ, по можно уже доспавиши нужное облегченіе, запуская въ носъ нѣсколько разъ въ день выжашый изъ бѣлой рѣпы сокъ.

Буде насморкъ сей весьма мокрый и испекающая матерія очень осипра, въ по время нужно прикладывать къ зашылку или нарывный пласпрырь, или по крайней мѣрѣ пласпрырь изъ Бургундской смолы; — ввечеру, ложась спать, дѣланъ теплую для ногъ ванну, днемъ держать ноги въ тепломъ, а на ночь надѣвать теплый колпакъ на голову.

Иногда насморкъ шаковой исчезаетъ, т. е. прежнее слизенеченіе изъ носу разомъ перелецится, а мокротная носовая перепонка шакъ распухаетъ, что больный совсѣмъ не можетъ пропускать воздуха чрезъ ноздри.

Въсемъ случаѣ одно по уже доспашочно, еспыли на нѣкоторое время выдии на свободный прохладный воздухъ, или впускаль въ носъ сказанный сокъ бѣлой рѣпы, а снаружи вширашь на оному масло, или свѣчное сало, сбитое въ мазь съ нѣкоторымъ количествомъ пива, для чего можешь служишь и маоранное, по ешь, наспоенное на маораний шравъ масло.

Когда къ насморку присоединиша еще воспалительный кашель, или сей послѣдній одинъ находиша, въ то время надлежишъ поступать вообще такъ, какъ при воспалительной горячкѣ, или воспаленіи груди.

Здѣсь же должно упомянуть только о шомъ, чтобы не приспупашъ въ семъ случаѣ очевь скоро къ кровопусканію и при шомъ не прежде, какъ уже окажуши признаки дѣйствительного воспаленія груди, или легкихъ; въ прошивномъ случаѣ легко можно подать поводъ къ легочной чахоткѣ и грудной водяной болѣзни.

Если при кашаррѣ не примѣчаешся ни воспаленія груди, ни легкихъ и при шомъ сопровождающая онай горячка умѣренна, то нужно спарашься преимущеспивенно обѣ открышой кожѣ или о безпрепятственномъ испареніи онай. Къ сему намѣренію днемъ весьма полезно употребляшь настой сухой малины, а на ночь, по двѣ чашки обыкновенного чаю и бо всякую изъ нихъ выжимашь сокъ изъ половины зрѣлаго и сочнаго лимона и спарашься о вспомоществованіи испаренію кожи.

Равнымъ образомъ дѣйствуешь въ семъ случаѣ и вдыханіе теплыхъ паровъ изъ нагрѣшаго молока, или бузиннаго чаю.

По прекращеніи прежней жестокоспии кашарра, и когда извергаешся уже ча-

спая, гуспая и нѣсколько шлягучая мокроша, или оказывается пошъ, надлежитъ:

а) Пиши нѣсколько разъ въ день по чашкѣ чаю, съ яичнымъ желшкомъ и чайцою ложечкою рому, или наспой, предписанный подъ № 14.

б) Яичный желтокъ, сбитый съ леденцомъ въ пѣну и смѣшанный съ нѣкошорымъ количествомъ малаги или рому, принимать по ложкѣ, или

с) Взявши по равной части лимоннаго соку, меду и сахара, смѣшашь и употребляешь по столовой ложкѣ, или поспущашъ шакъ, какъ предписывается.

При докротномъ катарре. Для излѣченія коего по собственнымъ многолѣтнимъ счастливымъ опытамъ совѣтуешь Кильянъ:

а) Пиши можжевеловый чай три раза въ день по чашкѣ.

б) По упру єсть мясную похлебку съ яичнымъ желшкомъ, прянную молочную пищу, супъ, приготовленный изъ раковъ.

с) Гоппель-поппель, копорый можно приготовить слѣдующимъ образомъ: сбитъ съ сахаромъ два свѣжихъ яичныхъ желшка въ пѣну, попомъ прибавиши къ нимъ чашку шептой воды и столовую ложку водки, наспоенной на расположенныхъ вишневыхъ косточекахъ, либо рому и пиши шептый, вмѣсто завѣрака.

д) Померанцевая и горчитная сыворотка,
Часть I.

смѣшанныя съ нѣкоторымъ количествомъ вина. Послѣдняя соспавляется такимъ образомъ: поспавивъ кружку молока на легкій огонь, надлежитъ подогрѣвать ее до разгоряченія, попомъ прибавивъ къ молоку нѣсколько чайныхъ ложекъ горчицы, обдѣланной съ виннымъ уксусомъ, оспавивъ на огнь до шѣхъ поръ, пока молоко свернется.

А для приготовленія первой, сывораживающейся такимъ же образомъ молоко померанцовыемъ сокомъ, пошомъ наспаивается еще симъ молокомъ померанцовая корка; послѣ сего, сливъ сыворошки, и прибавивъ къ ней опять 2—4 ложекъ вина, давашь пить ежедневно.

е) Тёплыя ванны. Сперва съ мыломъ, или очищеннымъ попашемъ, коихъ каждого порознь можно брасть для ванны по полфуншу, а попомъ съ ароматными расщеплениями, каковы сушь: ромашка, шалфей, богородицкая трава, лаванда, розмаринъ, сухая ивовая кора, тысячелистникъ, и т. д.

Употребление шаковыхъ ваннъ не рѣдко соспавляеть единственное въ семъ случаѣ средство, отвращающее сверхъ того переходженіе сего кашарра въ чахонку.

f) При семъ родѣ кашарра не должно никогда забывать состояніе желудка и пищеваренія. Древніе наименовали его *желудотнымъ кашлемъ*, по шуму самому,

что онъ единственно такою ошъ употреблениія такъ называемыхъ желудочныхъ средстవъ въ скоромъ времени исчезаетъ.

Для сей цѣли преимущественно можетъ служить полынное вино, употребляемое по упру и вечеромъ по рюмкѣ, или крѣпильное вино, означенное подъ № 12.

Коклюшъ или судорожный кашель.

§ 142.

Подъ симъ именемъ разумѣется шопть кашель, который начинается долгопродолжающимся выдыханіемъ, за коимъ слѣдуетъ попомъ долгое и глубокое вдыханіе съ свистящимъ, крику курицы подобнымъ шумомъ, а при сильныхъ приступахъ непосредственno еще чиханіе, или рвота случается.

Очень рѣдко кашель сей при первомъ его появлениіи предстаиваетъ совершеннымъ судорожнымъ кашлемъ.

Вообще въ его

Явленіяхъ и родѣ теченія

Примѣчаются слѣдующій порядокъ:

§ 143.

1) *Предъ появлениемъ его нерѣдко спраж-*

*

депть больный въ сie время проспуднымъ кашлемъ, сопряженнымъ съ особеннымъ беспокойствомъ, поскою, поперемъннымъ ознобомъ и жаромъ.

2) *Во время появления.* Прежде бывшій проспудный кашель дѣлается судорожнымъ, съ сопровождающимъ оній малымъ, попрясающимъ выдыханіемъ, за коимъ попомъ мгновенно слѣдуєть сильное и глубокое вдыханіе съ свистящимъ, крику курицы подобнымъ звукомъ.

Таковое поперемънное вдыханіе и выдыханіе слѣдуєть одно за другимъ не рѣдко шесть и даже восемь разъ, такъ, что все продолженіе припадка проспирается иногда до нѣсколькихъ минутъ и болѣе.

Сильный припадокъ оканчивается чиханіемъ, или изверженіемъ чрезвычайно мягучей, шищечему kleю подобной мокроты.

Сверхъ этого всегда оказывается здѣсь и горячка, у нѣкоторыхъ спопчась въ началѣ, а у другихъ не далѣе, какъ въ восьмый, или четырнадцатый день, и налождѣтокъ недоспашокъ аппепитиа, пе-ремъняющійся иногда въ собачій голодъ.

Приближеніе припадка примѣчаются обыкновенно въ то время, когда больный посѣливъ и беспокоенъ, ищетъ мѣста къ укрѣплению себя, зѣваешь, плачешь, или чихаешь.

3) *Во время достижения высокой степе-*

ни. Припадокъ, обнаруживавшійся прежде шокомъ оѣь двухъ до трехъ разъ въ день, появляется чаще и всякой разъ дѣлается сильнѣе, наипаче послѣ принятия пищи и ночью. Больный въ шаковомъ припадокѣ находится почти въ себя, легкія его совершенно бездѣйственны, дыханіе на нѣсколько минутъ прерывается, спраждущій разверзаешь рошь и выпучиваешь глаза.

Не рѣдко въ сіе время до послѣдованія дыханія, спремицельно щечешь кровь изъ носу и рта.

Оцѣпѣніе сіе часпо продолжается нѣсколько минутъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ, коихъ Килланъ два примѣшилъ, оѣь шести до осми часовъ и наконецъ переходитъ въ судороги и всѣ припадки падучей болѣзни.

Въ семъ продолженіи времени всякой малѣйшій поводъ можетъ причинить возвратъ припадка, а въ особенности дѣйствующій болѣе на грудобрюшную преграду и легкія, какъ то: смѣхъ, плачъ, зѣваша и всякое попрясеніе шѣла.

4) *При уменьшении.* Ознобъ и жаръ умаляется, припадокъ случается реже, болѣшею частію періодически, бываешь всегда слабѣе и потерянныя силы болѣнаго приходяще въ лучшее состояніе.

Время продолженія сей болѣзни различно. Обыкновеннѣйший срокъ ея есть

чепыре недѣли, иногда же продолжается она и полгода.

Сверхъ того судорожный кашель всегда имѣетъ нѣчто прилипчивое — и попѣхъ, кто одинъ разъ былъ подверженъ оному, никогда уже не получаетъ его.

И с х о д ы.

§ 144.

При счастливомъ сего недуга исходѣ, примѣчающемся обыкновенно, или

- а) Рѣшипельный попѣхъ, или
- б) Рѣшипельная моча, или
- с) Рѣшипельные накожныя сыпи.

Впрочемъ переломы сіи всегда рѣшаюпъ болѣзнь очень продолжительно, и потому касательно приключенія другихъ болѣзней не льзя думать — совершенно безопасно. Сіи послѣднія шѣмъ удобнѣе послѣдующій, чѣмъ долѣе и сильнѣе спрашаль больный не только недугами легкихъ, но вмѣстѣ пищеваренія и писанія. Сюда относятся слѣдующіе

а) Болѣзниенные исходы: продолжительный желудочный кашель, испощеніе, спинная сухопка, скорошечная чахотка легкихъ, воспаленіе груди, падучая болѣзнь, безобразное ращеніе спины, пупочная и паховая грыжи, опвердѣніе и зауваль печени, желтуха, грудная и брюшная водянная болѣзнь.

247

Въ высшей степени болѣзнь сія бываешьъ

б) Смертельною опь поспрѣла, удушъя или опь аншонова огня легкихъ.

Предсказаніе.

§ 145.

Предсказаніе въ сей болѣзни вообще можно полагать болѣе несчастливое, чѣмъ паче, если случается при семъ:

а) Трудное выхожденіе зубовъ.

б) Глисты въ кишкахъ.

с) Водяная головная болѣзнь. Сію послѣднюю Киліанъ часто находилъ въ судорожномъ кашлѣ и при томъ испытывалъ, что ее не многие распознаютъ врачи, а по сему самому при лѣченіи ни мало не берется въ счѣпъ она, — равнымъ образомъ и

д) Воспаленіе легкихъ, которое у дѣшой чаще случается, нежели какъ обыкновенно думають, и Киліанъ не сколько разъ видѣлъ пораженныхъ судорожнымъ кашлемъ дѣшой, кои умерли не опь кашля сего, но болѣе опь скоропечной чахопки легкихъ.

Хорошее напропивъ предсказаніе бываешьъ тогда, когда кашель сей дѣлается періодическимъ, т. е. возвращающимъ по временамъ, не сопровождающимъ горячкою и шруднымъ дыханіемъ, когда спражду-

щій не слишкомъ молодъ и не слабъ, когда пароксизмы прекращаются рвотою или умѣренныи свободнымъ испражненіемъ мокроты, легкимъ кровопеченьемъ изъ носа и проч.

Причины.

§ 146.

Судорожный кашель происходить отъ нѣкоторой прилипчивой матеріи, кошмаря освобождающейся изъ воздуха при извѣстномъ состояніи онаго и рождающей сей недугъ въ тѣхъ особахъ, кои имѣющъ расположение къ нему. Опроческій возрастъ, въ особенностяхъ женскій полъ и изъ сихъ большею часцію юноши, кои имѣющъ первозное сложеніе тѣла, преимущественно расположены къ сему.

Лѣченіе.

§ 147.

Вообще при лѣченіи сего недуга надлежитъ братъ во вниманіе свойство сопровождающей горячки и при томъ сообразоваться еще при производствѣ онаго, со свойствомъ наиболѣе страждущей часпи.

Если же при таковомъ болѣзненному состояніи не находиться ни какой горяч-

ки, то нужно спаравшися, дабы для дѣшай, непишающихихся уже грудью:

I) *Діэта* была легкая и состояла бы изъ удобоваримой пищи, какъ то: изъ легкихъ мясныхъ суповъ, похлебокъ, приготовляемыхъ съ куряшиною и шому подобное.

Пишь самое лучшее есть: наливка птравы иссопа, или дикой мяпты, подслащеннай медомъ, или леденцомъ; слабая горчичная, померанцовая, или винная сыворотка (§ 141); разведенныи водою негусъ и бишофъ, принимаемый преимущественно на ночь.

Сверхъ того

II) *Домашнія средства.* Сюда исключительно принадлежашъ:

1) *Промывательные, соспавляемые изъ ромашекъ, льняного сѣмени съ сахаромъ, или солью.*

Промывательные сїи при врачеваніи разсматриваемой здѣсь болѣзни весьма важны, съ тѣмъ однако условіемъ, чѣбы онъ ежедневно производили испражненіе низа опь двухъ до трехъ разъ.

2) *Теплыя припарки изъ ромашекъ, молока и мякиша бѣлаго хлѣба, прикладываемыя къ лобку (*), могущъ довольно*

(*) Лобкомъ или лономъ называешся передняя часть шаза, у взрослыхъ волосами покрытая.

часто случающеся въ сей болѣзни задержаніе мочи и происходящіе отъ того весьма опасные припадки — задушеніе и поспрѣлъ уничтожашь и предупредить. Жаль только, что все сіе рѣдко предусматриваешься.

Припадки шаковые надобно продолжать до тѣхъ поръ, пока моча начнетъ выпекать и совершенно ни какихъ слѣдовъ задержанія оной непримѣнно будешьъ.

3) Рвотное средство. Не рѣдко примѣчаешься большое накопленіе слизи, какъ въ груди, такъ и въ желудкѣ. Въ семъ случаѣ нужно давать больному рвотное средство. А такъ какъ малолѣпныя дѣти и безъ того уже всегда спраждупль обильнымъ накопленіемъ слизи, копорая при томъ будучи одинъ разъ извержена, весьма скоро и въ большемъ количествѣ, особенно въ сей болѣзни, опять накапливается у нихъ, то для большаго предоспереженія отъ споль часпо случающагося здѣсь задушенія, надлежитъ повторять всегда чрезъ три, или четыре дня шаковое умѣренное рвотное средство; ибо симъ самимъ не только можно предотвратить опасность и умноженіе судорожнаго кашля, но и облегчашь присоединяющеся къ нему иногда трудное выхожденіе зубовъ.

Слабительныхъ средствъ надлежитъ остерегаться здѣсь, поелику онъ вообще

болѣе усиливаюпъ, нежели уменьшаюпъ болѣзнь, особливо, если для шаковаго на-
мѣренія упошребляєтся соль.

4) *Лукъ*, въ горячей золѣ спеченыи и въ кружкахъ къ подошвѣ ногъ прикладываемый, съ возобновленіемъ не сколько разъ въ день, по крайней мѣрѣ часшое появленіе и жестокость припадковъ судорожнаго кашля, сполько же удобно облегчаеитъ, какъ и свѣжій.

5) *Чеснокъ*, коимъ можно съ большею пользою наширапъ опѣ прехъ до шесши разъ въ день ложечку, оба бока надъ бедрами и спину.

Лучше всего то и другое средство, ч. е. 4 и 5 вмѣстѣ упошребляшь.

6) *Нарывный пластырь* доспавляешъ опимънио хорошую услугу. Здѣсь можно упошребляшь его шакимъ образомъ: смѣшавъ обыкновенный нарывный пластырь съ камфорою, намазапъ имъ кусочекъ холстинки, шириной въ три пальца и прикладывашь къ ложечкѣ и назади вокругъ спины, оставляя однако шокмо до шѣхъ поръ, пока мѣсто, на коемъ онъ приложенъ, сдѣлается краснымъ.

7) *Дикий розмаринъ* (багульникъ), опимънио шакже дѣйствуешъ въ сей болѣзни. Одинъ золотникъ его наливаешся половиною бушылки кипячей воды и даетя больному пить вмѣсто чаю.

8) *Мокрицы* весьма полезны, впрочемъ шокмо дѣшевы опѣ 2 до 3 лѣши. На

четыре ложки расщепленных сихъ насыщенныхъ можно наливашь полбушельки слабаго бѣлаго вина, наспаивашь 12 часовъ, пошомъ процѣдишь и давашь больному ежедневно три или четыре раза по споловой ложкѣ.

9) *Ножныя ванны:* именно по упру и ввечеру спавши ноги больного въ теплую горчичную ванну и пр. д.

10) *Бургундская смола,* въ видѣ пластира между лопашками прикладываемая, также весьма хорошо дѣйствуетъ.

11) *Свободный воздухъ,* или перемѣна самаго воздуха часто соспавляешь здѣсь единственное средство не только для предоспереженія дѣпей отъ продолжительности судорожнаго кашля, но и для поддержанія самой икъ жизни.

По сему, въ сухую, чистую и холодную погоду можно больное дыша выносить ежедневно на свободный воздухъ; при чемъ болѣе всего должно заботиться о предоспереженіи его отъ проспуды, происходящей при семъ отъ сквознаго вѣтра.

Если кашель сей въ какомъ нибудь мѣстѣ сдѣлается повальнымъ, то весьма хорошо переводишь больныхъ дѣпей въ другую, хотя не сполько здоровую спрану.

12) Когда примѣчаешься, что судорожный кашель имѣешъ наклонность перешелъ въ воспаленіе легкихъ, или уже пере-

шель, чио чаще въ сей болѣзни случает-
ся, нежели сколько извѣсно, въ то вре-
мя надлежишъ употребить съ возмож-
ною скоростію, предложенное при вос-
паленіи легкихъ (§ 88) лѣченіе. Весьма
хорошо также приспавлять дышамъ въ
въ семъ случаѣ опть 5 до 6 піявокъ къ вну-
шенней поверхности ляшекъ, и давать
выпеканіе крови изъ ранъ, смопря по воз-
распу и силамъ дышати, въ продолженіи
одного, или двухъ часовъ.

13) Сверхъ того, если припадокъ судо-
рожнаго кашля до того усиливается,
чио можно опасаться поспрѣла или за-
душенія, то надобно, обмочивъ верхній
конецъ пера въ вино, дѣлашь онымъ ще-
кошаніе въ горшани и дыхательномъ гор-
лѣ, напирашь спину фланелю, или ще-
плою водкою, прикладывашь къ ногамъ
горчичникъ, и употребляшь промыва-
щельное изъ шабачнаго дыму.

Лѣченіе во время выздоровленія.

Болѣзнь сія сильно изнуряетъ малолѣт-
ныхъ больныхъ, частію чрезъ испоще-
ніе силъ, частію чрезъ попперю пѣлесныхъ
ихъ соковъ. По сей причинѣ необходимо
нужно, по исходѣ ея, спарашься всячески
и при томъ съ возможною скоростію о
укрѣплении и питаніи шаковыхъ боль-
ныхъ. Къ сему способствующіе наиболѣе:

а) *Молотные ванны*, опть употребленія
коихъ Киліанъ видѣлъ нѣсколько разъ,
въ совершенно даже опчайныхъ случа-

яхъ, удивительную силу. Равнымъ образомъ и ванны съ пряными распеніями и водкою доспавляющъ опмѣнную услугу.

б) Крѣпкій буліонъ съ личнымъ желпи-комъ и мушкашимъ орѣхомъ.

с) Сладкія сыворотки.

д) Салепъ и саго, сваренные въ мясной похлебкѣ.

е) Исландскій мохъ въ разсужденіи при-
надлежащей цѣли, занимаешь почши первое мѣсто, поелику все, къ поправленію
ослабленного здоровья нужное, онъ одинъ
доспавишь можетъ. Однакожъ при семъ
очень много зависишъ отъ его пригопо-
вленія.

Лучше пригоповлять его такимъ об-
разомъ: лопти Исландскаго моху налиши
кипячею водою и наспаивашъ въ продол-
женіе цѣлой ночи; въ слѣдующее утро
воду сю слиши, и прибавивъ къ моху
нѣсколько корицы, увариши съ половиною
бушылки воды до двухъ третей оной;
попомъ процѣдиши, къ процѣженному
прибавиши нѣсколько миндального моло-
ка, и наконецъ давашъ дышапи, смотря
по возрасту, отъ одной до двухъ чашекъ
въ день.



ОДЫШКА, ИЛИ УДУШЬЕ

и

УДУШЛИВЫЙ КАТАРРЪ.

§ 148.

Подъ именемъ одышки разумѣшся пошрудное дыханіе, кошорое сопряжено съ большимъ спѣсненіемъ въ груди и шумомъ. Она иногда проходитъ, но опять, хоща въ неизвѣстное и неравное время всегда появляется; рѣдко однакожъ примѣчаешься въ ней перемѣна обыкновенной мокроты.

Въ высшей степени болѣзнь сія соспавляешь, такъ называемый *удушливый катарръ* (*Catarrhus suffocatus*), припадки кое-го въ скоромъ времени мы будемъ разсматривать.

Вообще недугъ сей рѣдко имѣетъ правильное течение, но болѣе бываешь припадкомъ, кошорый споль же легко можетъ присоединиться къ другой какоилибо болѣзни, какъ и происходить отъ случайной какой нибудь причины.

Впрочемъ одышка бываешь иногда собственно болѣзнью, осипавшеюся послѣ другой, предшествовавшей сей болѣзни, и въ семъ случаѣ имѣешь она слѣдующія, по порядку оказывающіяся

ЯВЛЕНИЯ И РОДЪ ТЕЧЕНИЯ.

§ 149.

1) *Предъ появленіемъ наступающъ обыкновенные признаки всеобщей слабости шла съ нѣкоторымъ особливымъ разсстройствомъ въ груди.* Одинъ изъ важнейшихъ предвестниковъ одышки есть частное давленіе во снѣ (*incubus*) т. е. шопъ несовершенный сонъ, при кошоромъ оказывается сильное желаніе къ движению съ мѣста, а мышицы лишаются своей произвольности, и при шопѣ обнаруживается большая непріятность, особливое чувство удушенія и очень часто нѣкоторый страхъ.

2) *При самой появленіи.* Спраждущій одышкою въ ночное время обыкновенно получаетъ поску съ спѣсненіемъ въ груди и трудность въ дыханіи, чрезъ ч то самое и пробуждаешься отъ сна. Большею часію при семъ дыханіе, языкъ, руки и ноги бывающъ холодны; пульсъ всегда скорый, слабый и перемежающійся; больной можетъ тако дышать въ прямомъ положеніи, съ опровергнутымъ ртомъ, и ищетъ съ поспѣшностью преимущественно свѣжаго холоднаго воздуха.

3) *При достижениіи высокой степени происходитъ наконецъ собственно такъ называемый цдущливый катарръ.* Онъ оказывается слѣдующимъ образомъ: спѣснен-

ніє въ груди просипрається до задушенія, дыханіе бываєть свисплящее, принуждаєшъ больного сидѣти прямо, и совершаєшся съ приподниманіемъ плечей и выправливаніемъ запылка. Произношеніе словъ прудно, или совершенно невозможнo; наружныя частни дѣлаються холодными и мало чувствительными; лице раздуваєшся, глаза выпучиваються и получають шемносиній цвѣтъ. При томъ вѣки бывають открыты, зрачекъ разширенъ, къ дѣйствію свѣта нечувствителенъ, изъ глазъ безпреспанно испекаються непроизвольные слезы.

Въ сихъ пунктахъ заключається общая испорія одышки. Но поелику она оказывается большою частію, какъ уже упомянуто было, въ видѣ одного припадка, происходящаго отъ какой нибудь причины, что при лѣченіи особливыхъ родовъ ея необходимо нужно знать, какимъ образомъ каждый изъ нихъ распознать можно. По сему нужно предложиши здѣсь опличительные признаки важнѣйшихъ родовъ одышки.

По обыкновеннымъ явленіямъ раздѣляется она: 1) на мокротную, 2) на судорожную, или конвульсивную и 3) на одышку, съ болю сопряженную.

1) *Мокротная одышка.* Присутствіе сей можно узнать сверхъ общихъ явленій одышки еще изъ слѣдующаго: вообще припадокъ ея поражаетъ больного

за первымъ сномъ, при чмъ вдругъ вска-
киваешъ онъ съ поспели и раскрываешъ
окошко для вдыханія свѣжаго воздуха.
Мокрота при семъ всегда бываешъ жид-
кая и шлягучая, ноги больнаго обыкно-
венно холодны и распухши, какъ при
подкожной водянной болѣзни; а облегченіе
припадка слѣдуешъ послѣ обильнаго по-
тла на головѣ и груди.

2) Судорожная, или конвульсивная одыш-
ка, различающаѧ ошъ предъидущей наиболѣе
шѣмъ, что припадки ея, какъ и
перемежающейся лихорадки, возвращающи-
ся въ опредѣленное время; больный уже
за нѣсколько времени въ рукахъ и но-
гахъ примѣчаешъ поперемѣнно не боль-
шія судороги; ноги всегда ощущаюшися
болѣзненно холодными, а дыханіе шакъ
затруднительно, что спрѣждущій на-
прягаєтъ со всѣхъ споронъ подняшь ре-
бра вверхъ и подавишь грудо-брюшную
шреграду внизъ; — къ каковому намѣре-
нію онъ при каждомъ вдыханіи припод-
нимаетъ плеча.

Одышка сія различающаѧ

а) Отъ воспаленія легкихъ и перепончатой жабы (крупа) шѣмъ, что при сихъ обѣихъ всегда находишся горячка; а

б) Отъ грудной водянной болѣзни шѣмъ отличающаѧся, что сія совершенно никакихъ послабленій не имѣашь; больный всегда находишся въ сидячемъ положеніи и выдыханіе его очень холодно; буде же

вмѣстѣ и около сердечіе (*pericardium*) спра-
ждашъ, шо пульсъ скорый и неровный
бываешъ.

3) *Болью сопровождаемая одышка.* Сія преимущественно отличається посхожан-
ною болью, по срединѣ, или болѣе къ
нижней части грудной кости (выше
грудной ложечки) сопряженою при вся-
комъ глубокомъ дыханіи, какъ шо: при
скоромъ хожденіи, бѣганіи, при восхож-
деніи на лѣспницу, или на гору, съ ве-
ликою трудносью въ ономъ, шакъ что
спраждущій вдругъ принужденъ бываешъ
остановишился. Къ шому жъ присоеди-
няешся всегда боль въ рукахъ, и исключ-
ительно въ той части, гдѣ сухая жила
груднаго мускула прикрѣпляешся.

И с х о д ы .

§ 150.

По различію каждой одышки и исходы
бывають различны.

1) *Мокротная одышка* иногда счастливо
оканчиваешся сильнымъ мочепеченiemъ,
или шакъ называемымъ мочевымъ поно-
сомъ и обильнымъ пошомъ на головѣ и
груди.

2) *Судорожная одышка* имѣшъ споль-
же мало критическихъ исходовъ, какъ и

3) *Съ болью сопряженная* или болѣзнен-
ная. Часпо припадокъ сей умерщвляешъ
больныхъ мгновенно.

Впрочемъ примѣчены случаи, гдѣ кровопеченіе, ломошные припадки и вереда на ногахъ были ея переломами.

Что же касаешся до

а) Болѣзнейныхъ исходовъ одышки, то обыкновеннѣйшіе изъ нихъ суть: грудная водянная болѣзнь, бугры въ легкихъ и кровохарканіе; а

б) Смертельныя: задушеніе, нагноеніе легкихъ и посиръль.

Предсказание.

§ 151.

Такъ какъ вообще одышка чаще бываетъ припадкомъ, нежели собственою болѣзнью, то предсказаніе оной зависитъ наиболѣе отъ свойства и опасности той болѣзни, при которой она оказывается.

Головокруженіе и сонливость, присоединяющіяся къ одышкѣ, всегда дѣлаютъ ее опасною, поелику доказывающъ приближеніе посиръла.

Воспаленіе легкихъ, примѣчаемое въ сей болѣзни, вообще починается смертельнымъ случаемъ.

Когда мокрая одышка дѣлается вдругъ сухою, то шакже весьма опасно.



П р и ч и н ы.

§ 152.

О болѣзняхъ, производящихъ одышку, было уже упомянуто.

Къ собственнымъ ея причинамъ относятся еще:

- a) Неумѣренное употребленіе спиртныхъ напитковъ.
- b) Скрывшіяся на кожныхъ сыпи.
- c) Глиспы, желудочная кислота у дѣтей и прудное выхожденіе зубовъ.
- d) Испорченный и слишкомъ жаркій воздухъ, наприм. во время очень жаркаго лѣта; равнымъ образомъ влажная и холодная погода при расположенному къ шому сложеніи.
- e) Судороги въ печени, воспаленіе оной и пузырно-желчнаго прохода, также желчные камни.
- f) Сильная скоропоспѣжная проспуда, и воспрепятствованное испареніе ногъ.

Л ъ ч е н і е.

§ 153.

При лѣчении во первыхъ должно удалить упомянутыя внутреннія и наружныя причины, служащи поводомъ къ сеemu случаю, попомъ уничтожить бездѣйственность легкихъ и грудо-брюшной преграды.

Основываясь на семъ, мы предложимъ слѣдующее:

1) При всякомъ сильномъ припадкѣ одышки, или удушливаго кашарра, должно класить больнаго головою и грудью повыше, сверхъ штого поспупашь шакъ, какъ сказано при коклюшѣ (§ 147).

2) Давашь больному ромъ, или водку по рюмочкѣ, или по чашкѣ кофе, приготовленного изъ 2 лопцовъ пережженаго кофе безъ молока и сахара, повторяя шаковый пріемъ чрезъ четверть, или полчаса. Сie дѣйствиенъ иногда очень скоро.

3) Жѣстокость и частое наступленіе сихъ споль опасныхъ припадковъ одышки, равно какъ и шакъ называемаго давленія во снѣ, можно весьма хорошо оправдашь, или умѣривашь, употребляя на ночь горчичную ванну для ногъ, и напирая еще руки и ноги нѣсколько минутъ фланелью.

4) Крѣпишельная діэпа весьма пристойна здѣсь, если она состоитъ изъ удобоваримой и при томъ прямой пищи. Равнымъ образомъ здѣсь весьма полезно питье, приготовляемое изъ поджаренныхъ ржаныхъ отрубей шмина и меда и употребляемое ежедневно опь 2 до 3 бутылокъ.

5) Инбирный и можжевельный чай, а особенно упомянутый уже при кашаррѣ

Гоппель-попель (§ 141), весьма похваля-
ються.

6) Въ мокротной одышкѣ, фонпанели,
или корка волчьяго лыка на обѣихъ ру-
кахъ, шакже смоляный пласпрырь между
лопашками, оказывающъ опмѣннуюполь-
зу.

7) Съ болью сопряженная одышка укро-
щающаяся иногда упробленіемъ фонпане-
лей, или корки волчьяго перца (лыка)
на внутренней споронѣ ляшекъ.

8) Въ судорожной одышкѣ весьма хорошо
дѣйствуетъ шакже, кромъ упомянутыхъ
средствъ и крѣпкаго кофе, куреніе од-
ной или двухъ шрубокъ въ день сухихъ
лишьевъ дурмана (*Datura Stramonium*).

9) Какъ въ судорожномъ кашлѣ, шакъ
и здѣсь необходимы промывательные,
наиначе во время припадка, но шакже и
послѣ онаго.

10) Малолѣтнихъ дѣтей, спраждущихъ
шаковыми припадкомъ, кои и безъ шого
уже слабосильны, нужно принуждать
сколько можно заблаговремениѣ къ рвотѣ
и при томъ смотрѣть, дѣбы употреб-
ляемое рвотное средство дѣйствовало
съ возможною скоростю. На сей конецъ
весьма хорошо прикладывать напередъ
къ желудочной споронѣ дишляши неболь-
шій нарывный пласпрырь, и оставлять,
пока произойдетъ на приложенномъ мѣ-
стѣ краснота.

Натужный или кровавый поносъ.

§ 154.

Натужный или кровавый поносомъ называется частое, слизистое, иногда съ кровью смѣшанное испражненіе низа, содержащее не рѣдко заразительную матерію и соединенное съ рѣзкими болями въ кишкахъ, напугами при испражненіи низомъ и горячкою ().*

ЯВЛЕНИЯ И ТЕЧЕНИЕ.

§ 155.

1) *Предъ появлениемъ.* Обыкновенно за нѣсколько времени предъ симъ болѣзненнымъ состояніемъ обнаруживается недоспашокъ аппепита, поносъ, или запоръ, необыкновенно сильная ошь вѣпровъ напряженія брюха и проч.

2) *Во время появления.* Холодъ и жаръ въ печеніи нѣсколькихъ дней поперемѣнно наступающіе; низменное испражненіе происходитъ чаще, нежели въ здоровомъ состояніи и наконецъ дѣлается много-краснымъ слизистымъ и кровавымъ. Съ симъ сопряжено ворчаніе, рѣзъ и переход-

(*) Натужный поносъ сопровождающій часто одни пищевые позывы на низъ, съ рѣзью въ кишкахъ и горячкою.

дящія боли въ брюхѣ, несносное чувство въ заднепроходной кишкѣ, не рѣдко съ тщещинымъ побужденіемъ къ испражненію низа, и. е. съ жиленіемъ.

3) *При достижениіи высокой степени.* Продолжительная безсонница, икоша, молочница, холодъ во всемъ тѣлѣ съ жирнымъ пѣромъ на рукахъ и ногахъ, воспрепятствованное глошаніе, внутреннее чувство жара и чрезмѣрного беспокойства.

И с х о д ы.

§ 156.

a) *Болѣзnenные:* сухопка, продолжительный поносъ, чахопка, вѣдяная болѣзнь.

b) *Смертельные:* анпоновъ огонь и нагноеніе кишекъ.

П р и ч и н ы.

§ 157.

Внезапная перемѣна температуры, пропущуда брюха и ногъ, наипаче при большомъ разгоряченіи тѣла, дурная и гнилая вода; худое пищаніе и кислая пища, наприм. незрѣлая овощь, охлаждающая слишкомъ тѣло и въ особенности брюхо. Сему недугу наиболѣе способствуешь

Часть I.

25

осеннее время, когда дни бывающъ очень жарки, а ночи холодныя. — Особенное заразительное вещество, распространяющеся и сообщающееся чрезъ воздухъ, такжे участвуещъ въ произведеніи сей болѣзни.

Лѣчение.

§ 158.

Поелику кровавый поносъ по внутреннему существу своему есть ни чѣмъ иное, какъ умноженное раздраженіе полыхъ кишекъ, соединенное съ особеннымъ, катару подобнымъ, страданіемъ и умноженнымъ или воспашеннымъ опрѣленіемъ, чѣмъ

При лѣченіи главное дѣло состоитъ въ шомъ, чѣмъ уничтожить существующее раздраженіе сообразнымъ образомъ и симъ самымъ предотвратить переходъ въ воспаленіе, аппоновъ огонь, нагноеніе и всѣ прочіе исходы кроваваго поноса.

Вообще всякъ долженъ положить себѣ за правило, чѣмъ въ обыкновенныхъ случаяхъ, при употреблении показанныхъ здѣсь средствъ, всегда надобно сообразоваться съ большею, или менѣею спешенною раздражительности больнаго субъекта, слѣдовательно начинать съ малыхъ пріемовъ, повторяющъ оные въ короткіе промежушки, и такимъ образомъ

последовательно усиливать ихъ должно. Предлагаемыя здѣсь средства суть:

I) *Діета.* Сюда причисляется наиболѣе молочная пища, яичные желтки, мясные похлебки, спарое вино, особливо красное, ячменная или овсянная крупа, гусиное сваренное, съ нѣкоторымъ количествомъ вина смѣшанная и почаще употребляемая. Равнымъ образомъ подобный отваръ саго и салепа весьма можетъ быть полезнымъ.

Сверхъ этого вѣнчальная шемперапура должна быть теплая, но не совсѣмъ жаркая.

II) *Домашнія средства.* 1) При умѣренномъ кровавомъ поносѣ, для уничтоженія его достаточно уже принимать каждый часъ по чашкѣ ромашковаго чая, особенно, если больный при означенной діэти временемъ будешь употреблять ложку миндального масла, смѣшанного съ яичнымъ желткомъ.

2) Вспирать водку на брюхѣ и дѣлать на ономъ теплые припарки изъ овсяной крупы и льняныхъ сѣмянъ, съ молокомъ сваренныхъ.

3) Ставить промывательный изъ крахмала № 16, или льняныхъ сѣмянъ.

4) Напирать почаще спину теплую водою и носишь фланельное плащье.

5) Прикладывать горчичникъ къ подошвамъ ногъ.

Кромѣ сего

6) Теплые ванны, особенно изъ молока, либо ромашковаго ошвара съ нѣкоторымъ количествомъ вина, доставляюшь здѣсь оптимальную услугу и дѣйствующиъ скоро.

7) При жестокой боли въ брюхѣ и весьма частомъ испражненіи низа можно прикладывать горчичникъ на брюхо, оставляя однако шокомъ до полѣ, пока на приложенномъ мѣстѣ красноша окажется.

8) При щещенной понудѣ на низѣ, спа-
виши клиスピры изъ масла, или мако-
выхъ сѣмянъ, сваренныхъ въ молокѣ и
процѣженныхъ, съ прибавленіемъ еще де-
ревяннаго масла.

9) Мѣль, спершій въ тонкій поро-
шокъ и смоченный водою, будучи прини-
маемъ чрезъ два часа по чайной ложкѣ,
оптимально полезенъ здѣсь.

10) Равнымъ образомъ дѣйствуетъ изюмъ, соединенный съ яичнымъ желти-
комъ и принимаемый черезъ часъ по чай-
ной ложкѣ (*).

Сверхъ этого надлежишьЩщательно предупреждать всякую заразу, могущую послѣдовать ошъ сей болѣзни; и для сего попробна всегдашняя чистоша, ка-

(*) Высушенные и превращенные въ порошокъ спѣлья сѣмена конскаго щавеля (*Lapatum acutum*) будучи приняты одинъ разъ въ сушки по цѣлой споловой ложкѣ въ чаю, водкѣ или другомъ напиткѣ, весьма скоро останавливающи шаковой поносъ.

сашельно болнаго и частая перемѣна воздуха въ самой комнатѣ его. По сей причинѣ спрѣждущаго надлежишь, сколько можно, уединяшь, — и экскременты его въ скоромъ времени загребашь.

Послѣ всякаго испражненія надобно больному обмывашь шеплою водою, поелику заразительная матерія заключаєтсѧ не въ испареніи, или дыханіи его, а единственно поти въ слизиспомъ и гноеобразномъ веществѣ испражненій низа.

ХОЛЕРА или поносъ со рвотою.

§ 158.

Симъ именемъ называєтсѧ по болѣзниое сосѣданіе, кошорое оказываетсѧ жидкими испражненіями, извергаемыми рвотою и поносомъ, кои слѣдують вдругъ и не рѣдко соединены бывающими съ сильными судорогами во всемъ тѣлѣ.

Болѣзнь сія часто господствуетъ повально, и въ такомъ случаѣ припадки ея различно измѣняются, впрочемъ большою часцію бывающіе здѣсь слѣдующія

Я в л е н і я.

§ 159.

Сперва брюхо вздуваешся и немногого бо-

лишь, часто въ самомъ началѣ еще оказывается великая слабость. Вскорѣ слѣдуетъ безпрерывная рвота, сопровождаемая часпымъ поносомъ. Какъ рвота, шакъ и поносъ сопряжены съ великими шагостями, шоккою и удавкою; боли, напряженіе и распряженіе брюха поспешино усиливаются. Извергаемыя рвотою и испражняемыя низомъ вещества имѣющій желтый, зеленый, бурый, бѣлый, черный цвѣтъ и горькій или кислый вкусъ, ощущаемый при изверженіи ихъ болѣніемъ, жилобеніе въ самомъ шокомъ началѣ бываетъ нѣсколько крѣпкое и ускоренное; но вскорѣ попомъ при продолжающихся спокращенныхъ испражненіяхъ спадновится оно малымъ, слабымъ, скорымъ и неровнымъ.

Всѣ вышесказанные припадки иногда сполъ бываютъ жестоки, что самаго крѣпкаго сильнаго человѣка чрезъ нѣсколько часовъ приводятъ въ крайнюю слабость.

Больной, находящійся въ шакомъ положеніи, при мучительной шокѣ и жаждѣ, чувствуяшъ во всемъ тѣлѣ большой жаръ и, по причинѣ несносной въ животѣ боли и рѣзи, дѣлающіе въ ногахъ судороги, высступающіе по всему тѣлу холодный попъ, предвѣщающій весьма худое послѣдствіе, если больной оставленъ будешьъ безъ надлежащей скорой помощи.

Но не давно во время свирепствования сей болезни въ Индіи, откуда она распространялась во многія Восточные и Южные страны Азіи въ самую Аспрахань и въ первые три года похипила больше трехъ миллионовъ съ половиною людей, замѣчена большая разносТЬ въ прохождении и послѣдованиемъ припадковъ ея, напр. рвота была первое и обыкновеннѣйшее явленіе, потомъ слѣдовалъ поносъ, наконецъ судороги и корчи. Не рѣдко же порядокъ сей измѣнялся такъ, что поносъ и судороги предшествовали рвотѣ, иногда сіи послѣдніе появлялись ранѣе прочихъ, иногда чрезъ все теченіе болезни, либо судороговъ, либо рвоты или же поноса не бывало, а иногда всѣ сіи припадки находились въ одно и то же время. Въ нѣкоторыхъ рѣдкихъ случаяхъ, движение крови вдругъ прекращалось и больной умиралъ, падая на землю, какъ бы молнией пораженный. Другіе напроптивъ приближались къ концу послѣщепныхъ побужденій къ рвотѣ и при мучительной посکѣ.

Причины.

§ 160.

Главнѣйшія причины, ошь коихъ происходишь сія болезнь, суть слѣдующія:

- 1) Испорченная желчь, дѣлающаяся ос-

шрою во время зноя, особенно у тѣхъ, кои занимаются весьма шагоспными и изнурительными въ полѣ работами.

2) Недоспашокъ въ хорошей пищѣ — и употребленіе испорченной и гнилой.

3) Излишнее питье крѣпкихъ напитковъ, опѣ коихъ не скромо лѣпомъ, но и во всякое время болѣзнь сія приключиться можетъ.

4) Излишнее употребленіе незрѣлыхъ садовыхъ овощей, свѣжихъ огурцовъ, грибовъ и тому подобнаго, къ сваренію въ желудкѣ пажелаго.

Сверхъ этого

5) Слабость въ тѣлѣ, проспуда послѣ дневнаго зноя опѣ наступающихъ шумановъ съ перемѣною холодныхъ ночей, долгое пребываніе въ сыромъ и холодномъ воздухѣ безъ упражненія, скорый исходъ изъ холода въ теплопушу, безмѣрный жаръ, низкое мѣстоположеніе, обильное питье холодной воды при разгоряченіи тѣла, пресыщеніе послѣ долгаго воздержанія въ пищѣ, опдохновеніе на сырой травѣ или землѣ при попѣніи тѣла; неудобныя жилища.

Лѣчение.

§ 161.

При лѣченіи сей болѣзни нужно наблюдать слѣдующее:

1) Если причиною болѣзни испорченная желчь или испорченная и гнилая пища, то въ такомъ случаѣ:

а) Должно давашь пить больному въ довольноомъ количествѣ одну просипшую шепловашую воду, или смѣшанную по ровной часпѣ съ молокомъ.

б) Изъ воды, смѣшанной по поламъ съ молокомъ, спавиши промыкальное при или четыре раза въ день, не смотря на то, что оно будешь выходиши вмѣстѣ съ испражненіемъ.

с) Поишишь большаго довольноимъ количествомъ жидкой похлебки, пріугожовленной изъ цыпленка или курицы.

д) Во время великой слабости давашь пить слѣдующій отваръ: возьми восемь золотниковъ корня просвирника, налей больше половины кружки чистой воды, вари, пока выкипиши прещяча часпѣ жидкости, которую процѣдивъ сквозь чистую хол спинку, давай пить больному вмѣсто обыкновеннаго питья. На сіе количество взвару съ пользою прибавляшь можно по два золотника вишневаго клею, въ порошокъ спершаго, если онъ имѣется. Сверхъ сего держашь на верхней часпѣ живопса подушечку, наполненную сухою мясою и спрысканную уксусомъ.

2) Если болѣзнь сія приключиши опять неумѣренного употребленія незрѣлыхъ садовыхъ овощей, то

а) Въ началѣ оной должно дашь рвотное, соспавленное изъ прешей части золотника корня подлѣсника, спершаго въ мелкій порошокъ и принимааемаго въ чистой водѣ, попомъ перешь живопѣщепловашымъ посымъ масломъ и дѣлашь припарку изъ шеплыхъ ошрубей, либо нагрѣшаго сухаго овса; вяжущихъ же и горячипельныхъ веществъ ошпюдь не употребляшь.

б) Больному, почувствовавшему облегченіе для подкрѣпленія его силь, употребляшь настой мяшной шравы по рюмкѣ раза четыре въ день съ винограднымъ, либо хлѣбнымъ виномъ.

При появлениі болѣзни, въ самомъ началѣ ея, у здоровыхъ полнокровныхъ людей должно пущать кровь изъ руки опь одного до двухъ фунтовъ.

Если сдѣлаются сильныя судороги, руки и ноги охладѣюшь и біеніе пульса будеши едва примѣшно, то немедленно приголовишь теплую ванну, со всѣхъ споронъ закрышую, посадишь въ оную больнаго по горло на чешверть часа, или сколько онъ можетъ вытерпѣшь, а между тѣмъ еще до ванны спарашься согрѣвать ладони и подошвы посредствомъ бушылокъ, наполненныхъ теплую водою, или нагрѣшымъ кирпичемъ, обвернутымъ въ салфетку. Послѣ ванны нужно вытирашь до суха больнаго, осперегая его опь проспуды.

При сильной жаждѣ питье холодной воды очень вредно, и въ семъ случаѣ лучше полоскать горло ячменнымъ опшварамъ.

Когда больной впадешь въ обморокъ, то нужно крошишь лицо холодною водою, которою намачивая холстинку, класпь на грудь и перемѣняшь, когда согрѣешся, притомъ можно давашь нюхашь слѣдующую смѣсь:

Взять чистой извески 2 золотника, нашатыря 1 золотникъ, простой воды нѣсколько капель.

Смѣшашь въ склянкѣ и закупоривъ онуу, держашь для употребленія въ грошовности.

Если послѣ кровопускания и ванны рвота и поносъ не уменьшашся, то прикладывать къ брюху предложенную при воспаленіи желудка припарку (§ 95), или горчичное шѣспо, держа его шокмо до иѣхъ поръ, пока окажешся краснота на приложенныхъ мѣсахъ.

При появлѣніи какого либо знака сей болѣзни, жищели вообще должны принять осторожность и куришь въ комнашахъ своихъ ладономъ, поливашь уксусомъ на раскаленный кирпичъ, шакже нюхашь чеснокъ и простой уксусъ, содержа жилища свои въ чистотѣ. Въ случаѣ нужды перемѣняшь мѣстопребываніе въ дальнее или близкое мѣсто, гдѣ чище воздухъ. Сверхъ того не ходишь

въ солнечный зной во время дня и не спасть на открытомъ воздухѣ. Когда уже окажется болѣзнь, что при самомъ первомъ припадкѣ ея можно принять 5—15 капель мякина масла, смѣщанныхъ съ золошниками водки или рому.

Въ сей жестокой болѣзни, не теряя времени, всего лучше совѣшовавшись съ лучшимъ врачемъ.

Кровотечение изъ носа.

§ 162.

Кровопеченье сіе бываетъ иногда переломомъ и рѣшаеть очень хорошо нѣкоторыя болѣзни, особенно воспалительныя, иногда припадкомъ, а иногда и собственнюю болѣзнию. Во всѣхъ сихъ случаяхъ не рѣдко усиливается оно до такой степени, что можетъ нанести великій вредъ здоровью и даже самую смерть; при чмъ оказываются слѣдующія

Явленія.

§ 163.

Безпрерывное печеніе крови изъ носу, блѣдность лица, трудное дыханіе, шумъ и звонъ въ ушахъ, головокруженіе, ма-

лый и перемежающейся пульсъ, холодъ въ рукахъ и ногахъ и насшупленіе обмороковъ.

И с х о д ы.

§ 164.

Если кровотеченіе обнаруживающіяся часпо, но не слишкомъ сильно, то причиняешь испошеніе шѣла и всѣ опѣтого происходящія болѣзни. Еслыли же оно очень усилился и не подано будешъ помощи, то спрѣждущій можешъ умереть опѣтъ испеченія кровью или опѣтъ поспрѣла.

Л ъ ч е н і е.

§ 165.

Топчась, коль скоро при кровотеченіи изъ носа обнаружатся упомянутые, опасностію угрожающіе, припадки, надлежитъ:

1) Доспавишъ больному прохладный воздухъ, отворивъ двери и окна или вынесши его, надлежащимъ образомъ прикрывши, на свободный и холодный воздухъ.

2) Положишъ больнаго такъ, чѣмъ голова и грудь были выше прочихъ частей, или посадишъ его прямо на спулъ, запрещая ему говорить, сморкать и напрягаться.

5) Давашь ему пить холодную воду съ лимоннымъ сокомъ, а ёспѣ мороженное, перевязашь руки и ноги и приложиши къ запылку изрѣзанный лукъ.

4) Растворивъ два золотника квасцовъ въ фунтѣ хододной воды, давашь ему выполоскивать ротъ, обмывашь лице холодною водою, покрывашь носъ, лобъ и всю голову холодными кампрессами или льдомъ и снѣгомъ, и вылиши разомъ съ высопы и съ силою спаканъ хододной воды на запылокъ или на грудную ложечку.

Если же сіи средства окажутся недостаточными, то нужно взять въ порошокъ приведенныхъ квасцовъ и, смѣшивъ съ малымъ количествомъ яичнаго бѣлка, намазашь сколько можно далѣе въ ноздрю, изъ которой выпекаешь кровь.

Ледъ или хододная вода, прикладываемая къ промежности, находящейся между дѣшевородными частями и проходомъ, дѣйствующіе также въ семъ случаѣ весьма хорошо.

КРОВОХАРКАНИЕ ИЛИ КРОВАВЫЙ КАШЕЛЬ.

§ 166.

Сімъ именемъ называется всякое изверженіе ртомъ, большую частію пѣнистой крови изъ легкихъ, происходящее съ хрипѣніемъ или съ кашлемъ.

Кровохарканіе большею частию бываєшъ припадкомъ или слѣдствіемъ какой нибудь болѣзни; а первоначальнымъ или собственнымъ недугомъ случаєшся преимущественно въ то время, когда сложеніе спрѣждущаго имъ, наиболѣе расположено къ шому. Въ семъ послѣднемъ случаѣ оно имѣетъ опредѣленныя свои

Явленія и родъ теченія.

§ 167.

1) *Предъ появленіемъ его оказывающеся давление въ груди, затрудненное дыханіе, трепетаніе сердца, жженіе въ грудной полости, соленый съ чувствомъ теплоты во рту и пришомъ сладкій, или горькій вкусъ, сухой кашель, успалость, холодъ въ ногахъ, спинные боли, пученіе живота, блѣдность лица и беспокойство въ пульсѣ.*

2) *Во время появленія обнаруживающеся кашель съ щекотаніемъ и зудомъ въ дыхательномъ горлѣ, за коимъ шопчасъ теплая и пѣнистая кровь выхаркивается.*

3) *При достижении высокой степени болиный жалуясь на колющие и несносное жженіе въ груди, къ коему присоединяются еще судорожные припадки, дрожаніе всего тѣла, холодный потъ, блѣдная моча, сильное беспокойство, удушливые припадки и конвульсивный кашель.*

Выхаркиваемая съ кашлемъ кровь не смѣшена со слизью, но совершенно чистая, свѣтлоказная, или темная, даже черная, жидкяя и зловонная бываєшъ.

Р А С П О З Н А ВАНИЕ.

§ 168.

Главный припадокъ сей болѣзни соспавляєшъ изліяніе крови изъ легкихъ въ дыхательное горло и изверженіе оной трезб ротѣ. Однако всякое испечениe крови изо рта не должно почишашь за кровохарканіе: ибо кровь испекаешъ иногда изъ полоспи самаго рта, полоспи зѣва, изъ носа и желудка. Сие можно опли-чишь по слѣдующимъ признакамъ:

1) Если кровь выходишь изъ полоспи носа въ ропѣ, или изъ полоспи зѣва, то она испекаешъ безъ кашля и харканія; больный пришомъ высмаркиваешъ кровь изъ носа и въ полоспи зѣва иногда можно видѣшь мѣсто, откуда пещениe кровь.

2) Когда кровь выходишь изъ полоспи рта, изъ неба, языка, десенъ и внутренней поверхности щекъ, то она шакже вышекаешъ изо рта безъ харканія и кашля; сверхъ того выполаскивая часпо ропѣ, можно открыши глазами испочникъ крови. Кровопечениe изъ неба сопровождаешся обыкновенно щекопаніемъ

въ ономъ, пягостію въ головѣ, шумомъ въ ушахъ, біеніемъ шейныхъ жиль, и кровошечеіе происходиша болѣею часцію послѣ сна. Кровошечеіе изъ прочихъ часпей рща случается наиболѣе при цынгѣ и гнилой горячкѣ, и въ шакомъ случаѣ кровь бываешь черная и слизистая.

3) Изъ желудка испражняешся кровь со рвотою. Впрочемъ здѣсь случается иногда и кашель, по сему должно смотрѣть на преимущество сихъ явлений. Кровавая рвота случается рѣже, нежели кровохарканіе, пришомъ совсѣмъ въ другомъ возрастѣ и сложеніи тѣла, кровь въ ней извергаешься разомъ и въ большомъ количествѣ бываешь черная, спвороженная и смѣшена иногда съ желчью, слизью, пищью и напишками; напротивъ того въ кровохарканіи кровь выходитъ съ хрипѣніемъ и кашлемъ, бываешь свѣтлопрасная и пѣнистая и какъ во время, шакъ и послѣ изверженія бываешь шумъ въ груди.

И с х о д ы.

§ 169.

Кровохарканіе не имѣшь никакихъ переломовъ. Если оно бываешь припадкомъ въ какой нибудь болѣзни, то рѣшаешься исходомъ сей послѣдней.

Обыкновенные его

Ч а с т ь I.

24

а) *Болѣзnenные исходы* суть: бугры въ легкихъ, язвы въ оныхъ, воспаленіе груди, продолжительный кашель, одышка и изнуришельная лихорадка.

б) *Смертельныe*: анпоновъ огонь въ легкихъ, чахотка, задушеніе и посирѣль.

Предсказание.

§ 170.

Всякое кровохарканіе опасно, частію пошому, что больный иногда можетъ задушаться во время припадка, частію пошому, что мѣспо, изъ коего уже одинъ разъ выпекала кровь, легко можетъ дѣлать повтореніе, или возвраты.

Сверхъ того предсказаніе зависить и отъ той болѣзни, при коей кровохарканіе бываешь припадочнымъ.

Вообще при семъ надлежитъ сообразоваться съ шѣмъ: болѣе ли или менѣе страждущій находится въ опасности похитить тахотку. Сие легко можно узнать изъ слѣдующаго:

1) Всегда должно о шомъ думашь, если больный имѣешь чахоточное спроеніе шѣла.

2) Равнымъ образомъ, если онъ подверженъ быть многимъ болѣзнямъ легкихъ.

3) Когда кровохарканіе часто случается.

4) Когда больный при сей болѣзни часпо и продолжительно страждешъ сильнымъ чиханіемъ безъ насморка. Сие все-

гда подаешь поводъ опасаться перехода въ нагноеніе легкихъ.

Дѣйствительный переходъ кроваваго кашля въ нагноеніе легкихъ, показывающій наиличе слѣдующія обстоятельства:

а) Трудное дыханіе при всякомъ движении шѣла.

б) Безпрепанній, малый и сухой кашель.

с) Безпокойства въ пульсѣ, наиличе къ вечеру, ш. е. присущіе горячки.

Причины.

§ 171.

1) Геморроидальная, или почечная болѣзнь довольно часно бывающія причиной обыкновенного кровохарканія, и гдѣ описаны причины произойденія оно, тамъ предсказаніе можетъ быть лучшимъ, нежели во многихъ другихъ случаяхъ.

2) Слабость кровеносныхъ легочныхъ сосудовъ также иногда бывающія причиной сего недуга. Случай сей доказывающій:

а) Слабое, мягкое и брюзглое сложеніе больнаго.

б) Обнаруживающійся послѣ сильного потрясенія шѣла кровавый кашель.

с) Признаки гнилостнаго состоянія соковъ, ш. е. присущіе, или самой еній горячки, или скорбута. Въ обоихъ

случаяхъ извергаемая кровь разрѣшена, не сверпывающа и при томъ темная, черная и зловонная.

Кромѣ сего скорбь, досада, недоспашокъ въ надлежащемъ питьи, разгоряченіе шѣла сильными движеніями, пищею, напитками и проч. очень много спосѣщепствующихъ происхожденію кроваваго кашля. Наицаче субъекты, имѣющіе чахоточное спроеніе шѣла, удобнѣе могутъ быть подвержены оному.

Признаки таховаго спроенія суть: слабое сложеніе всего шѣла, малая, узкая грудь, выдавшіяся плеча, нѣжное спроеніе шѣла, длинная шея, тонкій, слабый голосъ и всегда разширенный зрачекъ въ глазахъ.

Кровохарканіе происходитъ существенно или отъ воспаленія, или поврежденія, или бездѣйствія и ослабленія, частію боевыхъ, частію кровевозвращенныхъ легочныхъ жилъ. Оба послѣдніе случаи различаются между собою слѣдующимъ образомъ:

1) Если кровь выпекаетъ изъ боевыхъ жилъ легкихъ, то она бываетъ свѣтлопрасная и пѣнистая; пульсъ по большей части скорый, сильный, полный и припомъ не рѣдко въ одно время и рвота случается.

2) Когда же кровь выходитъ изъ кровевозвращенныхъ жилъ легкихъ, то количества ея бываетъ весьма малое, немного

болье чайной ложечки; пришомъ пульсъ хоши полный, но мягкий, — и шаковаго рода кровохарканіе дѣлаешъ возвращны подобно перемежающейся лихорадкѣ, появляясь всегда во время мѣсячнаго очищенія, коего мѣсто оно часпо заспущаешь и не рѣдко за первымъ сномъ, какъ и мокрая одышка случаешься.

ЛѢЧЕНИЕ.

§ 172.

Какого бы рода кровохарканіе ни было, надлежишъ спаравшися всегда:

1) О шомъ, дабы спраждущій грудью и головою лежалъ выше; шакже опклюнішъ давленіе какихъ либо членовъ пѣла, равно какъ и всѣ движенія рукъ и груди; запрещашь говоришь громко и много, и держашь больнаго въ крайнемъ душевномъ спокойствіи.

2) Впирашь на груди нѣсколько разъ въ день льняное масло.

3) Доспавляшь напипки болѣе слизистаго свойства; по сему ошваръ просвирничнаго корня (*Radix Altheacoffinalis*), овсяной, или перловой крупы, льняныхъ сѣмянъ, шакже миндалевое молоко заслуживающъ здѣсь большое уваженіе; надобно шокмо давашь ихъ больному болѣе холодными, нежели теплыми.

4) При всякомъ изъ шаковыхъ припадковъ не должно забывать промывашель-

ныхъ. Сначала могущъ бысть онъ болѣе изъ слабищельныхъ средствъ, а потомъ изъ ромашковаго чая и льнянаго масла, — словомъ больный долженъ имѣть ежедневно отъ одного до двухъ испражненій на низъ.

5) При появленіи колики въ брюхѣ, и, что весьма легко случается, задержанія мочи, нужно въ скоромъ времени сдѣлать припарку къ брюху изъ ромашки, бѣлаго хлѣба и молока.

Сверхъ того надобно сообразоваться съ качествомъ болѣзни, наприм. горячки, сопряженной съ кровавымъ кашлемъ. По сему, если

а) Кровохарканіе стеническаго или воспалительного свойства, то поспупать шакъ, какъ показано при воспаленіи груди (§ 88). Опрыскивашъ мгновенно все шѣло спраждущаго холодною водою, давашъ проглашывать отъ одной до двухъ споловыхъ ложекъ поваренной, въ водѣ растворенной соли, пущашъ кровь по предложенными при воспаленіи груди правиламъ, употребляшъ прохладжающіе и слабищельные налишки, какъ предписано при воспалительной горячкѣ, и пр. Иногда можно припускашь и піявки къ груди, какъ при грудномъ воспаленіи и т. д.

Равнымъ образомъ можно прикладывать нарывный пластырь между лопатками, а горгитное тесто на внутренней

споронъ ляшекъ, особливо, когда послѣ кровопускания осипаешь еще колопыть въ груди, и мокрота покрыта кровавыми полосками, или дыханіе все еще трудное.

б) Если же кашель астеническаго, а наиболѣе гнилого свойства, тогда надлежишъ давать больному всякие при часа порошокъ изъ десяти гранъ квасцовъ, съ нѣкоторымъ количествомъ сполченного сахара, пить прилежно квасцовую сыворотку, вширашь на груди между плечами и на ногахъ теплую водку, спавиши ноги опять одного до двухъ разъ въ день въ теплую ванну съ золою, мыломъ и горчицею и принимашь чрезъ чешверть, или чрезъ полчаса опять одной до двухъ ложекъ краснаго вина.

Если кровохарканіе слишкомъ усилилось и болѣній опять того очень ослабѣешь, то нужно давать чрезъ часъ по чайной ложкѣ превращенной въ порошокъ поваренной соли, или пить чрезъ часъ по стакану холодной съ плавающими кусочками льда воды, до тѣхъ поръ, пока кровохарканіе остановится. Въ такомъ случаѣ весьма хорошо дѣйствуетъ также умѣренно крѣпкое перевязываніе рукъ и ногъ, ш. е. рукъ около плечъ, а ногъ, выше ляшекъ.

Лѣченіе по выздоровленіи.

§ 175.

По прошествіи кровохарканія, особенно аспеническаго, весьма полезно продолжительное умъренное употребленіе бишофса, теплая мыльная или пошелиная, или изъ распеній сосипавленная ванна и ношеніе пласцыря изъ Бургундской смолы между лопашками.

Людямъ не совсѣмъ слабаго сложенія, особенно имѣющимъ всегда сухой кашель, надлежитъ пить нѣсколько времени желѣзную, или померанцовую, или горничную сыворотки (§ 141).

Больнымъ сангвинического темперамента, Зельдцерская вода съ молокомъ весьма хорошо споспѣшившую выздоровленію и подкрепляюща силы.

КРОВАВАЯ РВОТА.

(Черная немочь).

§ 174.

Такъ называемся ша болѣзнь, въ коей со рвотою извергається кровь, большою частью свернувшаяся и черная.

ЯВЛЕНИЯ И ТЕЧЕНІЕ ЕЯ.

1) Предъ наступленіемъ сей болѣзни призывающа давленіе въ ложечкѣ, съ поскою

и спъсненіемъ, так же внезапно наступающія судороги въ лѣвомъ боку, въ спинѣ, пояснице и брюхѣ, соединенные съ головокруженіемъ, обмороками и оглушеніемъвшреннихъ чувствъ.

2) *Во время наступленія.* Въ скромъ времени послѣ появленія вышеозначенныхъ припадковъ, извергаешься рвотою по большой часпи черная и свернувшаяся, иногда же чистая красная, либо съ желчью смѣшанная кровь. При чмъ лице опадаетъ, блѣднѣшъ, и все тѣло сильно ослабѣваешь.

3) *Причинженіи опасности.* Пульсъ ниспадаетъ и бываешь скорый, малый, слабый и перемежающійся, появляешься холодный потъ, обмороки обнаруживающіеся чаще, глаза дѣлаются мутными, боль въ груди и ложечкѣ несносная, раздаешься желтуха и самая рвота происходитъ съ сильнымъ, часпо съ судорожнымъ попрясеніемъ.

И с х о д ы.

§ 175.

Хотя кровавая рвота можетъ присоединиться ко многимъ недугамъ, въ видѣ припадка, однакожъ рѣдко бываешь переломомъ какой либо болѣзни, исключая при опиптувшемъ мѣсячномъ очищеніи, но и здѣсь весьма сомнительнымъ;

сама же она не имѣеть никакихъ переломовъ.

а) *Болѣзnenные исходы* ея суть: оспающееся расположение къ кровавой рвотѣ, водяная грудная болѣзнь, или изнурительная лихорадка, и

б) *Смертельные*: задушеніе, пострѣль, антпоновъ огонь желудка.

Предсказание.

§ 176.

Предсказание вообще основывается здѣсь на причинахъ, произведшихъ болѣзнь. Впрочемъ оно всегда сомнително частію попому, что болѣзнь сія, если рвота обнаруживается въ сильнейшей степени, легко можетъ навлечь смерть чрезъ корчи и испеченіе крови; частію попому, что всегда она оставляетъ расположение къ возвратамъ. Опасными признаками бывающими здѣсь:

а) Присоединеніе горячки къ кровавой рвотѣ.

б) Сильные боли въ груди, спинѣ и ложечкѣ; сіи починаются обыкновенно смертельными признаками.

с) Приключеніе желтухи.

д) Холодъ въ рукахъ и ногахъ, сей всегда подаетъ поводъ подозревать о возвратѣ.

Сверхъ этого чѣмъ въ меньшей степени

оказываются при семъ судорожные припадки, итъмъ болѣе надежды на выздоровленіе.

Причины.

§ 177.

Къ преимущественнѣйшимъ причинамъ сей болѣзни относятся завалы брюшныхъ внутренности, напаече селезенки, неправильности мѣсячнаго очищенія и почечуя, желчная и гнилая горячка, принятые внутрь оспрые и Ѣдкіе яды, наружный поврежденія желудка и проч. По сему въ шаковомъ случаѣ надлежиши въ скорости розыскать собственную причину, дабы въ неукоснительномъ времени можно было подать нужную помощь.

Лечение.

§ 178.

Если изверженіе крови очень сильное и угрожаетъ опасносюю, то нужно держать руки и ноги въ теплой водѣ и спавиши промывашельное изъ настойки ромашки, съ прибавленіемъ ложки поваренной соли и двухъ или трехъ ложекъ деревянного, либо льнянаго масла;— шакже прикладывашь горчичное шѣсию къ подошвамъ ногъ или къ икрамъ и на обѣ

руки, а въ крайнемъ случаѣ и на желудочной споронѣ, оспавляя его покмо до произведенія красношы на приложенныхъ мѣспахъ.

Когда брюхо очень горячее, а слабоспѣ не очень велика, то можно дѣлать холодныя примочки на ономъ.

При большой слабоспѣ больнаго, едва примѣшномъ пульсъ и холодъ во всемъ шѣль опимѣнную пользу оказываешь скидарное масло, даваемое внутрь по 10 капель. Его можно въ семъ случаѣ спирѣть съ яичнымъ желткомъ и разведши въ настѣ корицы или въ коричневой водѣ, либо въ квасцовой сыворошкѣ, давашь раза три въ день и болѣе.

Уничтоживши опасноспѣ сей болѣзни, нужно осмотрѣть причины, произведенія ее и дѣйствовашь пропиву оныхъ.

Если причиною ея оспановленное или скрывшееся мѣсячное очищеніе, то нужно пить ромашковый чай, дѣлать ножныя ванны, припушташь піявицы къ дѣшороднымъ часпамъ и проч.

При неправильности геморроя употребляшь по чайной ложкѣ винный камень, смѣшанный по поламъ съ сѣрными цвѣтами, спавишь также піявки къ заднему проходу и проч.

Проглощенные яды и другіе механически раздражающія вещества требуюшь обволакивающихъ слизистыхъ средствъ, к. с. ячменное пшѣье, опваръ саго, сара-

чинского пшена, клиスピры изъ опвара льняныхъ съмянъ съ двумя или четырьмя ложками льняного масла и проч.

Лучшая пища для спраждущихъ сею болѣзнию есть живопиная спудень, мясные похлебки, вареная въ смяшку яйца и молоко, принимая однажды въ маломъ количествѣ ихъ, дабы не обременять желудка.

КРОВАВАЯ МОЧА ИЛИ КРОВАВОЕ МОЧЕТЕЧЕНИЕ.

§ 179.

Кровавою мотею называемся всякое, съ уриною смѣшанное выхожденіе крови изъ мочеиспускательного спвола.

Часто она одна уже служить главнымъ поводомъ и расположениемъ къ зарожденію почечнаго, или пузырнаго мочеваго камня; по сему при лѣченіи ея должно поспупать съ возможною предоспорожностию и долго не оставлять употребленія показанныхъ средствъ.

Кровь можетъ выходить при семъ или изъ почекъ, или изъ мочеваго пузыря.

Выхожденіе крови изъ потекѣ узнается изъ того, когда больной предъ мочеиспусканиемъ и во время онаго чувствуетъ въ поясничной споронѣ боли, и когда кровь, выпекающая съ мочею, находящаяся въ шѣсномъ съ нею смѣшена.

Если же спраждущій ощущаєшъ боль въ шой споронѣ, гдѣ имѣєшъ положеніе мочевой пузырь (около лобка) и выпущенная изъ онаго кровь плаваешъ на мочѣ въ свернувшихся кусочкахъ: то сіе доказываешъ, что кровь *происходитъ изъ мочеваго пузыря.*

И с х о д ы.

§ 180.

Кровавая моча обнаруживаєшся иногда въ то время, когда, или мѣсячное очищеніе въ скоромъ времени остановилось, или имѣющеся геморроидальное шеченіе вдругъ прекратилось и опять сего произошли другія шрудныя болѣзни. Въ семъ случаѣ должно ее поддерживать, поелику она можешьъ бысть криническою.

При шаковыхъ обстоятельствахъ всегда возвращаєшся она периодически, подобно мѣсячному очищенію.

Сверхъ этого недугъ сей можешьъ также воспринимашь:

а) *Болѣзnenные исходы*, какъ то: воспаленіе почекъ, зарожденіе камней въ почкахъ и мочевомъ пузирѣ, равно какъ и язвы въ сихъ обѣихъ частяхъ.

б) *Смертельный* же дѣлается онъ или опять антитона огня спраждущихъ частей, или опять испеченія кровью.

Предсказание.

§ 181.

Кровавая моча шѣмъ наиболѣе опасна, что оғь нее могутъ произойти камни въ почкахъ и мочевомъ пузырѣ.

Припомъ она очень легко дѣлается возвращены. Совершенно смертельной бываетъ при гнилыхъ горячкахъ и гнилой осѣ.

Причины.

§ 182.

Сюда наипаче относятся:

- 1) Геморрой мочеваго пузыря.
- 2) Камни, заражающиеся въ почкахъ и мочевомъ пузырѣ.
- 3) Язвы въ мочевомъ пузырѣ.
- 4) Всѣ, при воспаленіи почекъ предложенные причины, къ коимъ можно еще причислить разслабленіе и параличъ почекъ.

Леченіе.

§ 183.

О кровавой мочѣ изъ мочеваго пузыря вообще нужно замѣтить то, что если мочевые камни не участвуютъ въ про исходеніи ея, то она рѣдко бываетъ собственнаю, или самоспособльно болѣзнию, а большую частью принадкомъ другой болѣзни. И такъ въ семъ случа

не иначе оспаешься дѣлашь, какъ только уклонишь болѣзнь, при которой кровавая моча вспрѣчаешься въ видѣ припадка. Чѣмъ касаешься до кровавой мочи, вытекающей изъ потекѣ, то сія, если не происходитъ опѣ мочеваго камня, большою частію имѣетъ аспеническое (слабодѣйствующее) свойство. По сей причинѣ и способъ лѣченія ея вообще можетъ быть слѣдующій:

I) *Діета* должна состоять изъ легко пищашельной и удобоваримой пищи. При этомъ во время самыхъ припадковъ нужно соблюдать спокойствие тѣла, не ложиться на спинѣ, избѣгать плохаго совокупленія и мочегонищельныхъ средствъ, к. п. пеплушкы, луку, разнаго рода пряностей и спиртныхъ напитковъ, а употреблять нѣжныя слизистыя средства: сарачинское пшено, саго, мясная похлебки и проч. Болѣе всего вредить здѣсь Ѣзда на лошадяхъ.

II) *Домашнія средства:*

1) *Во время припадка надлежитъ*

а) Прикладывать къ поясницѣ и выше лобка, холодные примочки изъ шалфея, дубовой корки и проч. сваренныхъ съ квасцами, или фланель, обмачиваемую уксусомъ.

б) Спавиши промывательный изъ ошвара льняныхъ сѣмянъ.

с) Прикладывать горчичное шѣсто къ икрамъ и подошвамъ ногъ.

д) Употребляшь внутрь ошварь шалфея, или квасцовую, померанцовую, или желѣзнную сыворотку.

е) Но всего лучше принимашь миндальное, или льняное масло, сбишое съ яичнымъ желѣзкомъ, чрезъ полчаса по нѣскольку чайныхъ ложекъ.

2) Послѣ припадка надлежишь осперегаешься шого, о чемъ уже выше упомянуто, и спарашься объ очищеніи почекъ и мочеваго пузыря опь всей выспущившей и, можетъ бысть; еще оспарившися въ нихъ крови. Для сего намѣренія нѣшь ничего приличнѣе, какъ сыворотка, или Зельдцерская вода съ молокомъ, шакже желѣзная сыворотка, или Пирмонтская вода. Объ послѣднія преимущественно раздражительнымъ и слабымъ особамъ въ продолженіи четырехъ недѣль принимашь должно.

БОЛЬЗНЁННОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗЪ МАТКИ.

§ 184.

Такъ называешся всякое изліяніе крови изъ матки, или маточного рукава, кошпорое долѣе продолжается и бываєшь гораздо сильнѣе, нежели шого шребуешь наптура и время.

Я в л е н и я.

§ 185.

Сверхъ самаго кровоотечения оказывавшися еще боли въ пояснице, пахахъ и брюхѣ, успалоспь, блѣдность лица, шошина, трудное дыханіе, головная боль, головокруженіе, мракъ предъ глазами, обмороки, малый и слабый пульсъ, прекращеніе сердца, холодъ и дрожь въ конечностяхъ, недосташокъ аппендицса, а къ вечеру опѣкъ на ногахъ, и т. д.

И с х о д ы.

§ 186.

Недугъ сей споль же рѣдко бываетъ переломомъ какой либо болѣзни, сколько и самъ онъ имѣетъ оные. Будучи лѣчимъ ненадлежащимъ образомъ, дѣлаетъ онъ различные исходы, изъ коихъ:

а) Болѣзненные сушки: женская блѣдносТЬ, водянная болѣзнь, воспаленіе печени и селезенки, бѣли, грозо-видные наросты въ маткѣ, маточныя судороги, корчевые припадки, испощеніе шѣла.

б) Смерть слѣдуя за большою частію отъ сильной потерии крови.

П р и ч и н ы.

§ 187.

Сіи могутъ быть двоякаго рода:

1) Такія, кои сильно разгорячають шѣло, какъ шо: слишкомъ раздражающія горячительные лѣкарства, сильныя напряженія шѣла, неумѣренное соишіе, чрезмѣрная теплота, разгоряченіе шѣла бѣшенымъ шанцованиемъ, или крѣпкіе напитки, сильный гнѣвъ и проч.

2) Такія, кои ослабляють шѣло, или лишаютъ его соковъ и силъ, какъ шо: худая пища, недоспашокъ въ нужныхъ напитательныхъ средсвахъ, печаль, угнетающія душевныя спрасши, въ привычку обращенное безполезное кровопусканіе, слабительные лѣкарства, частые роды, праздная жизнь и проч.

Лѣченіе.

§ 188.

Когда кровопеченіе происходитъ во время сильнодѣйствующаго раздраженія на шѣло и угрожаетъ опасноспю, то можно попытаться пріостановить его, употребивъ холодные примочки, прикладываемыя на брюхѣ и къ родошворнымъ часцямъ, холодные промывательные, впрыскиваніе въ рукавъ машки холодной воды съ уксусомъ, или слабаго расщвора квасцовъ, также губку, вкладываемую въ рукавъ машки и напишанную упомянутыми спягивающими веществами, а особенно перевязываніе рука и ногъ; — къ

подошвамъ ногъ можно прикладывать горчичное пѣспо, а внутрь давать чрезъ два или три часа по 10 капель кислого Галлерова элексира (Elixir acid. Haleri), или, за неимѣніемъ сего, лимонадъ. Если же, какъ большею часпю случается, причиною тому повсемѣстная слабость, въ то время попробна слѣдующая діэша и домашняя средства:

I) *Діэта.* Сюда относятся крѣпительные мясныя похлебки съ яичнымъ желткомъ, спущенъ изъ шеляшины, вино, движение тѣла, особенно въ свободномъ воздухѣ, пріятныя душевныя спрасши, хорошее молоко, мясная пища съ пряносю, усприцы, раки и проч. Всѣ сїи средства могутъ быть употребляемы, какъ предоспергающія опѣ кровопеченья.

II) *Домашнія средства.* Изъ сихъ весьма скоро помогаешь вино, наспоянное на корицѣ и по рюмкѣ принимаемое, сама по себѣ корица, даваемая четыре раза въ день и болѣе опѣ 10 до 20 гранъ, красное хорошее вино, квасцы, употребляемые опѣ 5 до 10 гранъ съ сахаромъ, да лѣ: горчичникъ, прикладываемый на брюхѣ, втираніе на ономъ и на спинѣ теплаго вина и проч.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ ИЛИ ВЫКИДЫШЬ.

§ 189.

Симъ именемъ называются тѣ роды,

кои происходяшъ не въ надлежащее время.
Обыкновенные

Я в л е н и я

Ихъ суть слѣдующія:

Предъ наступленіемъ шаковыхъ родовъ беременная чувствуешьъ въ спинѣ и поясницеъ боль, проспирающуюся къ бедрамъ и причиняющую давленіе и сжатіе, какъ обыкновенно бываешьъ и при правильныхъ родахъ. Пришомъ оказывается скорый пульсъ, головная боль и тошноша, груди опадаюшъ и дѣлаюшися вялыми. Далѣе, появляющіяся частное побужденіе къ мочеиспусканію, изъ машочного рукава испекаешьъ много слизи, а напослѣдокъ обнаруживаешьъ прошивуестспенное изліяніе крови изъ дѣшородныхъ частей, или выходишь плодъ изъ матки. Большею часцію происходяшъ также обмороки и другіе корчеваго рода припадки.

Если дитя въ матернѣй чурбѣ находится дѣйствительно мертвымъ, то беременная не ощущаешьъ уже никакихъ движений его, и чувствуешьъ пяготь въ пазу, плодъ тощасъ опадаешь и при всякомъ движениіи пѣла переваливается съ одной спороны на другую. Лице беременной бываешьъ блѣдно, груди вялыя, а чрево совершенно холодно. Къ сему присоединяешьъ еще дрожь, тошноша, рвота, обмороки, лещучій жаръ, сильная спинная боль, холодный пошъ и п. д.

Предсказаниe.

§ 190.

Предсказаниe здѣсь всегда несчастливое. Машь послѣ родовъ чрезвычайно ослабѣваешъ, и одинъ выкидыши подаешъ по водъ ко многимъ.

Нѣжныя особы преждевременнымъ родамъ весьма легко подвергаюшся.

Чаще всего слѣдующи оны, или прежде прещьяго, или послѣ седьмаго мѣсяца беременностии.

Причины.

§ 191.

Къ обыкновеннымъ причинамъ преждевременныхъ родовъ причисляюшся паче всего чрезмѣрные шруды и насилия, неумѣренное соишпіе, удары, упаденія, раненія, а кромѣ сихъ еще часпые кровопусканія, сильныя слабилительныя, проспый и кровавый поносъ, первная горячка, сильный гнѣвъ, испугъ и пр. д.

Способъ лѣченія.

§ 192.

Если беременная очень полнокровна, жилобіеніе ея скорое и твердое, то способъ лѣченія, предложенный при воспалительной горячкѣ, долженъ быть упо-

потребленъ здѣсь во всей его обширноснїи. Такимъ образомъ шопчасъ при появлениі предвѣспниковъ преждевременныхъ родовъ, нужно сдѣлать умѣренное кровопусканіе, пить почаше холодную воду и прикладывать ее на брюхо и на дѣпопродѣяя часши.

Если же примѣчаешься пропивное сему состояніе, чио однако рѣдко вспрѣчаешся, то для ошвращенія преждевременныхъ родовъ требуется выполнить слѣдующіе пункты:

1) Тѣло беременной положишь такъ, чтобы бедра лежали выше, нежели голова.

2) Для беременной необходимо крайнее спокойствіе во всякомъ отношеніи.

3) На брюхѣ и спинѣ ея впиравши теплую водку.

4) Давашь легкія, но нѣсколько прынага мясныхъ похлебки съ личнымъ желѣзомъ, Гоппель-поппель, шеколадъ, иногда вино по ложкѣ, и между симъ по кусочку хлѣбной корки, пощершой мушкашнымъ орѣхомъ и обмоченнай въ ренскомъ винѣ. Все сіе сначала въ маломъ количествѣ, а попомъ болѣе и болѣе увеличивашь должно.

5) Если въ шакомъ случай обнаружили кровопеченье, то поступай такъ, какъ предложено при кровопеченьи изъ машки (§ 188).

6) Въ прудныхъ обстоятельствахъ не

безполезно прикладывать горчицу на цѣлое брюхо и оспавлять до шѣхъ поръ, пока на приложенномъ мѣстѣ окажется красноша.

7) Больѣ же всего не забывашь употребленія промывательныхъ, а сверхъ того дѣлашь еще

8) Припарки изъ перечной мяты, ромашекъ, богоординой травы, золотопышечника, сѣмянъ воложскаго укропа и гвоздичекъ. Всѣ сіи средства, сваривъ въ красномъ винѣ или уксусѣ, прикладывать на нижнюю часть брюха.

Боли отъ мочевыхъ камней.

§ 193.

Камни могутъ находиться не только въ почкахъ, но и въ мочевомъ пузырѣ; следственno здѣсь нужны признаки, по коимъ можно бы было въ почносши отличить одинъ случай отъ другаго.

1) *При потетныхъ камняхъ* примѣчаются давленіе и боли въ поясничной спиронѣ и вдоль мочепочниковъ; сверхъ того у мужчинъ яички поднимаются вверхъ, а у женщинъ онѣмѣваютъ внутреннія части ляшекъ. Сіи припадки ощущаются наиболѣе во время верховой Ѣзды на лошадяхъ, или во время Ѣзды по каменистымъ мѣстамъ, и т. д.

Опідѣленіе мочи несовершающееся надлежащимъ образомъ; часпо она бываешьъ смѣщана съ кровью и не рѣдко съ нею выходящъ маленькие камешки, либо красная, или бѣлая камнеобразная машерія.

2) При камняхъ мочеваго пузыря оказывающіеся судороги и запрудненное мочеиспускание, при копоромъ моча иногда вдругъ задерживается и больной получаетъ при семъ большое облегченіе отъ этого, если онъ нагибається впередъ и опускать ноги одну ошь другой. Въ ляжкахъ часпо примѣчающееся одебенѣлость, безчувствіе или съ болью сопряженное давленіе. При испусканіи мочи показывается не рѣдко большое количества слизи. Моча бываешьъ болѣе жидкая, кровавая и малоколичественна. Мужчины, подверженные симъ камнямъ, чувствуя боль, или зудъ въ головкѣ дѣпороднаго уда, съ побужденіемъ къ мочеиспусканію; а у женщинъ оказывается раздраженіе въ мочевомъ спволѣ и тягость въ промежности, находящейся между дѣпородными частями и заднимъ проходомъ.

Здѣсь должно еще упомянуть, что мочевая соль, выходящая иногда съ уриною, очень часпо почитающейся за песокъ, и такимъ образомъ невѣдущихъ сего напрасно смущаешьъ.

А дабы увѣришься о ихъ различіи, слѣдуешьъ шокмо обратишь внимание на слѣдующія свойства:

а) *Могевая соль* имѣешъ кристаллообразную форму, осаждающаяся въ плошномъ видѣ по бокамъ, или на днѣ сосуда, и образуешься не прежде, какъ моча охлаждается.

б) *Песокъ* напропивъ шого бываеиъ въ видѣ маленькихъ камешковъ, безъ явно-острыхъ угловъ, и опадаещъ шопчась на дно, коль скоро моча испразднишся въ урыльникъ.

Способъ лѣчения.

§ 194.

Можеиъ бытишть же самыи, каковъ и при воспаленіи почекъ. Сверхъ шого шѣмъ, у коихъ съ мочею выходишъ песокъ, весьма хорошо употребляши высущенные въ шеплой печи и приведенные въ порошокъ можжевельные ягоды, коихъ, взявши двѣ часпи и одну часпь жженаго кофе, уваривашъ, подобно кофе съ кипачею водою, и сей ошваръ пинь по утру и ввечеру вмѣсто обыкновеннаго кофе по двѣ чашки.

Отъ употребленія просшаго сего средстva Киліанъ много разъ видѣлъ, что значительные мочепузырные камни и не въ маломъ количествѣ выходили въ видѣ песка съ уриною.

Пропивъ почечныхъ камней дѣйствуешь весьма хорошо слѣдующее средство: воз-

ми корня правы иглицника (*Onopidis Spinosaе*) и верхушекъ золотолозника (*Virgæ aureæ*), каждого по лошу, налей 4 чашки кипячей воды и количесибо сіе выпивай ежедневно.

Ущемление грыжи или килы.

§ 195.

Ущемленіемъ грыжи называема вдругъ воспослѣдовавшая совершенная неподвижность грыжи (выпавшей внутренности), соединенная съ сильнымъ чувствованіемъ боли во всемъ продолженіи ущемленной часпи.

Признаки ущемления.

§ 196.

1) Невозможность возвратить ни одной часпи выпавшей къ наружи внутренности, ни даже въ кишкахъ накопившейся матеріи.

2) Боль и чувствительное давленіе въ килѣ.

3) Запоръ на низъ, опрыжка, плюшиопа, икоша, рвоша, съ изверженіемъ сперва содержащагося въ желудкѣ, а пошомъ и въ кишкахъ; ослабленіе всего тѣла и шоска.

Нѣкоторыя изъ сихъ явлений не всегда бываюшъ, наприм. запоръ, ибо при нѣко-

торыхъ килахъ случается испражненіе на низъ.

Хотя ущемленію подвергаются во всѣхъ мѣстахъ образующіяся килы, однакожъ въ шѣснѣйшихъ проходахъ, наприм. въ паху и на бедрѣ, чаще случается онъ, не жели въ другихъ мѣстахъ; равнымъ образомъ при первомъ образованіи своею килы скорѣе ущимляются, нежели по прошествіи долгаго времени; скорѣе такоже послѣ ношенія нѣсколько времени киловой повязки (грыжеваго бандажа), не жели безъ онай.

Болѣзненное состояніе содержащихся въ киль частей, во время ущемленія бываешъ: проспое воспалительное, омертвѣлое или анпоново-огненное и судорожное.

а) Въ простомъ ущемленіи можно довольно крѣпко сжимать килу, которая, такъ какъ и живопѣ, бываешъ мягка и состояніе большаго вообще не очень мучительно; въ шаковой киль ощущаешься накопившейся каль и вѣшры.

б) Воспалительное состояніе ущемленія бываешъ *острое и тихое*. Острое воспаленіе обнаруживается жаромъ и напряженіемъ въ наружныхъ частяхъ, а во внутреннихъ жестокою болью около грыжеваго прохода и неспершимоспю прикосновенія, такоже жаромъ, напряженіемъ и болью въ животѣ, беспрещанною мучительною рвотою, жаромъ и сухостью

во рту, чрезмѣрною тошкою, скорымъ дыханіемъ и проч. Тихое воспаленіе сопровождающееся болью въ киль и лихорадочными припадками: оно свойственно ущемленіямъ давно имѣющихся грыжъ и слабымъ людямъ.

с) Омертвѣлое или антоново - огненное состояніе, которое можетъ произойти, въ послѣдствіи узнается изъ внезапнаго пресъченія всѣхъ припадковъ и боли въ ущемленной киль, безъ уменьшенія опухоли или возвращенія внутренности въ чрево, также изъ примѣрнаго ослабленія силъ.

д) Судорожное цицеленіе бываетъ безъ горячки и соединено съ сноснѣйшими, но перемѣнчивыми припадками, крѣпкимъ сжатіемъ животомъ и проч. Оно случается наиболѣе у старыхъ, кои часто спрадающіе судорогами.

Предсказание.

Ущемленіе есть опаснѣйший припадокъ, особенно, если оно сопряжено съ воспаленіемъ весьма здоровыхъ и весьма нездоровыихъ людей, также у очень молодыхъ и очень спарыхъ.

Лѣчение.

§ 197.

Все спараніе при лѣченіи ущемленія должно состоять въ освобожденіи килы

опъ сжашія, чпо совершається либо вправліваніемъ, либо употребленіемъ наружныхъ и внутреннихъ средствъ.

Вправліваніе производится слѣдующимъ образомъ: давши больному такое положеніе, чтобы часть, въ коей находиться грыжа, лежала бы на болѣе возвышенномъ мѣстѣ и, сдѣлавши промывательное для очищенія заднепроходной кишкі, должно охвачинь грыжевую опухоль и давинь руками со всѣхъ сторонъ равнотично по направленію грыжеваго прохода. Давленіе нужно дѣлать сперва легкое, а попомъ мало по малу усиливашь, продолжая его до шѣхъ поръ, пока боль ожеспочиншася.

Въ воспаленномъ ущемленіи операція сїа можетъ быть производима не болѣе одного раза и по послѣ обильного кровопусканія; а въ судорожномъ въ то время, когда больной находится въ ваннѣ, либо приложивши напередъ размягчающую шелкую припарку къ грыжѣ изъ полченыхъ льняныхъ съмянъ, сваренныхъ съ молокомъ.

Касательно употребленія внутреннихъ и наружныхъ средствъ нужно замѣтишь слѣдующее:

1) Если находятся признаки оспраго воспалительного состоянія въ ущемленныхъ частяхъ (смопр. § 196 b), то надлежитъ дѣлать обильное кровопусканіе; у взрослого здороваго человѣка можно вы-

пусшишь опъ полшора до двухъ фунтовъ крови, у шесшильниаго дишяши 12 лопшовъ и т. д.; послѣ спавишь піявицы во-кругъ киловаго прохода числомъ до двадцати или чешыре кровесосныхъ рожка, дѣлашь чрезъ полшора часа клиширы изъ фунша ячменнаго опвара и небольшой чашки уксуса, такжे холодныя при-мочки изъ уксуса и воды, либо прикладывашь къ киль шолченый ледъ, завязанный въ пузырѣ, а на брюхъ шелыя при-мочки или припарки изъ шолченыхъ линя-выхъ сѣмянь.

Внутрь нужно употребляшь кисловатые напишки, лимонадъ, или опваръ ячменныхъ крупъ, приготовленный съ примѣсью меда и уксуса, также очищенный винный камень (креморшаршаръ), приемаемый въ порошкѣ чрезъ два часа по одной трепти золотника съ сахаромъ и проч.

2. Если же не примѣчаешь воспалитель-наго сосипоянія въ спраждущихъ часяхъ, или оно будешъ совершенно уничтожено вышепредложеннымъ лѣченіемъ: то, не теп-рая времени, надлежишь шопчасъ взяшь два золотника крѣпкаго табаку, и на-споявъ его половиною бушылки горячей воды до просипушенія, процѣдишь и упо-требишь вмѣсто клишира. Средство сіе оказываетъ нерѣдко оптѣнное дѣйствіе.

Послѣ разрѣшенія ущемленія для ис-пражненія нечистоцъ, нехудо принять

внутрь полшора или два лотса Астраханской, либо Сибирской соли, или поспавиши клиスピръ изъ полубузылки настоя ромашки, одной ложки Сибирской горькой соли и 3 или 4 ложекъ льнянаго масла. Впрочемъ, если табачный клиスピръ произведешъ обильное испражненіе на низъ, то ничего дѣлашь не нужно.

О м о р о къ.

§ 198.

Обморокъ есть мгновенно произшедшее бездѣйствіе всѣхъ жизненныхъ оправленій.

Я в л е н і я.

1) *Предъ наступленіемъ* примѣчається шумъ въ ушахъ, мракъ, либо искры предъ глазами, наклонность къ рвотѣ, ворчаніе въ брюхѣ, дрожаніе губъ, блѣдность лица, холодный носъ и лицо, головокружение.

2) *Во время наступленія.* Чувствование и произвольные движения теряються, а пульсъ и дыханіе приходяшь въ ослабленное состояніе.

3) *При достижении высокой степени.* Дыханіе едва примѣшно, пульсъ мало ощущимеленъ и дѣлаєтъ большія перемежки, чувствительность совершенно шершава.

Наконецъ слѣдуешьъ обмирание, или несовершенная смерть.

Причины.

Чрезмѣрное напряженіе шѣла, безпрепрѣщенное и продолжительное учение, пьянство, сильный спрасши, какъ то: гнѣвъ, весьма пахучія, либо очень сильно дѣйствующія вещества, наприм. опій и пр. Также чрезмѣрныя испражненія, голодъ, большой холодъ, кровоотечения всякаго рода, испугъ, досада и проч.

Лечение.

Во первыхъ надобно снять шѣсное плащье, вынести больного на свѣжій воздухъ и положивъ горизонтально, дашь ему рюмку вина, напирашь все шѣло, спину и ложечку шелымъ полопенцемъ, либо виномъ, или водкою, держашь предъ носомъ его зажженное перо, или губку, обмоченную въ крѣпкій уксусъ, либо порѣзанный лукъ; спавишь промывашельное изъ табачнаго дыма и къ ногамъ прикладывашь горчичное шѣшило; а въ упорномъ случаѣ поспушашь шакъ, какъ показано ниже при обмирании.

ОБМИРАНИЕ, ИЛИ НЕСОВЕРШЕННАЯ СМЕРТЬ.

§ 199.

Обмираніемъ именується лишеніе дѣйствія наружныхъ и внутреннихъ чувствъ, при кошоромъ однако способность жизненности ихъ по крайней мѣрѣ въ нѣкоторой ступени еще находицѧ.

Причины.

§ 200.

Непомѣрныя, мгновенно и сильнодѣйствующія, возбуждающія силы, какъ то: нечаянная радость и испугъ, высокая ступень пьянства; сверхъ того чрезмѣрная потеря крови, сильная спутка, испорченный и къ дыханію неспособный воздухъ, угаръ и проч.

Леченіе.

§ 201.

Осмотрѣвъ надлежащимъ образомъ, удалишь упомянутыя причины. Сie сославляєтъ здѣсь первое и важнѣйшее дѣло, послѣ сего употреблять оживляющій способъ во всей его обширности.

Выгоднѣйшія для сего и надежнѣйшія средстива суть слѣдующія:

1) Треніе всего тѣла шерстяною машинкою, льномъ, изгребъемъ опѣ конопли, соломою, сѣномъ и проч. Всѣ сіи вещи-

спива нужно сперва нагрѣвать и подкуришь можжевельникомъ, либо маспицкою, и шому подобное.

Преимущественно напиравь руки, ноги, ляшки, брюхо, грудь, желудочную спорону, спинной хребетъ и подошвы ногъ, однакожъ сперва слегка и припомъ, начиная отъ конечностей, восходишь вверхъ къ шуловищу, а пошомъ болѣе и болѣе преніе усиливашь должно до шѣхъ поръ, пока кожа покраснѣешъ.

Послѣ сего, чѣмъ производимо было преніе, смочивъ шеплою водкою, либо крѣпкимъ виннымъ уксусомъ, опаяшь поступашь такимъ же образомъ.

2) *Раздраженіе желудка и кишечка*, копоря наиболѣе удерживающъ свою жизненность. Оно можетъ быть производимо:

а) *Возбужденіемъ къ рвотѣ*. На сей конецъ слѣдуешъ раздражать глошку, или горло верхнимъ концомъ пера, обмоченнымъ въ масло, а еще лучше въ вино, либо пучкомъ волосъ, или пальцомъ. Сверхъ этого прикладывать на желудочной споронѣ горчичную лепешку, или кислое шѣство съ уксусомъ, оставляя его до появленія краснощы на приложенныхъ мѣстахъ, или, посадивъ шѣло прямо съ наклоненою впередъ головою, либо положивъ его на лѣвой бокъ, напиравь ложечку (предсердіе) и бить по спинѣ.

б) *Промывательными (клистирами)*

изъ поваренной соли и мыла, распворенныхъ въ водѣ, также изъ виннаго уксуса и водки, разведенныхъ водою.

3) *Раздраженіе къ тиханію.* Къ сему могутъ служить: перо, обмоченное въ вино, порѣзанный лукъ, держимый подъ носомъ, першой хрѣнь, черная горчица, нюхательный шабакъ, шолченой перецъ, или имбирь и проч. Вещеслава сіи можно вкладывать и въ самый носъ.

4) Ниспускание по каплямъ холодной воды, либо вина на грудь съ высопы, равняющейся высотѣ человѣка, поспавленного на спулъ.

5) Далѣе можно еще жалисть шѣло красивою, или бить тонкою лозинкою, колоть иглами между ногтями и на подошвахъ ногъ, употреблять сухіе рожки; наширать дѣпгородныя части, накапывать кипячее масло, или распотопленный сургучъ на кожу, особенно на подошвы ногъ, прижигать большиe пальцы на ногахъ раскаленымъ желѣзомъ, либо свѣчею, производить пронзительный звукъ предъ ушами, какъ то: пррубишь и спрелять изъ писполетовъ.

Коль скоро омертвѣвшій скольконибудь глопашь можетъ, то давашь ему чопчасъ чашку чаю съ виномъ, либо ромомъ, либо съ водкою.



А.

О спасеніи пораженныхъ цгаромъ.

§ 202.

1) Топчась нужно вынести угорѣвшаго на свободный воздухъ, т. е. въ сѣни, или на дворъ, не опасаясь ни мало холodu, раздѣль его и положиши на спину съ нѣсколько возвышеннаю головою и грудью, прошивъ прочихъ часпей.

2) Всячески остерегаешься класть его въ теплую поспель и дѣлашь ему шабачный клистиръ, особенно изъ шабачнаго дыму.

3) Бливашь ему въ горло уксусъ, разведенныи премя часпями воды, и орошаешь въ то же время все шѣло, особенно лице и грудь холодною, съ уксусомъ смѣшанною водою; шерешь его хол спинкою, обмоченою въ разведенныи уксусъ камфорный, или другой спиртъ. По прошествии трехъ или четырехъ минутъ, вытерепь овлажненныи часпи теплою сухою хол спинкою и попомъ опять чрезъ 3 или 4 минуты орошаешь и напираешь по прежнему.

4) Подошвы ногъ, ладони и всю спину шерепь мягкою щечкою.

5) Ставишь клистиръ изъ холодной воды, смѣшанной съ шрепьею часпию уксуса, а попомъ чрезъ нѣсколько минутъ

другой, изъ холодной воды съ двумя лошами поваренной или горькой Аспраханской соли.

6) Подносить къ носу зажженное перо, шерпый хрѣнъ, крѣпкую горчицу, порѣзанный лукъ, или нюхательный спиртъ, впрочемъ на короткое время.

7) Вдувать чрезъ ротъ въ легкіе воздухъ просплю или посредствомъ небольшаго раздувального мѣха, вспавливая шрубочку онаго въ одну ноздрю, а другую ноздрю сжимая.

8) Если, не смотря на употребление сихъ средствъ, пораженный угаромъ находится въ большой сонливости, шеплоша въ пѣль его продолжается, лицо красное, то пускать кровь изъ ноги или лучше на шею. Сие средство гораздо полезнѣе рвопнаго, котораго вовсе и давать не нужно, — если не бываешь шопношны, наклонности къ рвотѣ, давленія подъ ложечкой и проч.

9) Когда угорѣвшій придетъ въ совершенное чувство, то нужно положить его въ теплую постель, открыть окна въ комнатѣ, если позволяетъ погода и удалишь безполезныхъ людей. Здѣсь дать ему нѣсколько ложекъ хорошаго ренскаго вина, малаги, ксересу или мадеры, а при недоспашкѣ ихъ Гофманскихъ капель числомъ 25 въ ложкѣ воды.

10) Предложенный здѣсь способъ надлежиши употреблять съ большою скоро-

спію и продолжашь довольно долгое время, даже и тогда, когда больной предстаёт совершенно мершимъ.

В.

О вспомоществовании мнимо-умершии от испорченного воздуха.

§ 203.

При обмирании, приключившемся от испорченного воздуха, находящагося въ запертыхъ комнатахъ, шеапрахъ при множествѣ людей, въ весьма глубокихъ ямахъ, колодцахъ и другихъ мѣстахъ, также наполненного парами, исходящими изъ известковыхъ печей, кадокъ, содержащихъ въ себѣ бродящія винные или спиртныя жидкости, болотъ, заходовъ, ямъ, куда сливающъ всякую нечистоплю, споковъ и т. п., надлежитъ поступать такъ, какъ показано при спасеніи пораженныхъ угаромъ (§ 202). Сверхъ этого, если мнимо-умершій, какъ часпо случается, поглошилъ нѣсколько жидкости, содержащейся въ ямахъ, заходахъ, спокахъ и т. п., то нужно произвести въ немъ рвоту,ливая въ горло его спаканъ деревянного масла или 12 гранъ распивренного въ водѣ благоупороса.

При судорогахъ и корчахъ надлежитъ сдѣлать теплую ванну, послѣ которой

положишиъ больнаго въ теплую постель и напирашиъ сукномъ или щепкою спину его.

Когда же, не смотря на употребление сихъ средствъ, не окажется въ больномъ ни чувства, ни движениѧ, то надобно приложишиъ горчичное масло къ ногамъ.

C.

Объ оживленіи замершихъ.

§ 204.

Лучшія и полезнѣйшія при семъ средствы суть слѣдующія:

1) Внесишиъ замершаго въ холодную комнапу, раздѣлишиъ, положишиъ вверхъ головою и покрышиъ его повсюду, исключая лицо, снѣгомъ, вышиною въ чешверть аршина. Сверхъ того посадишиъ его въ совершенно холодную ванну, или безпрепятственно окладывашъ холоднымъ, мокрымъ полотномъ и покрываломъ.

Если замерзшее тѣло спасти разспаивать, то обыкновенно покрываеши оно льдяною коркою; когда сія начнешъ паяти, въ то время надобно вынуть тѣло изъ воды и напирашиъ весьма слабо на грѣпою водою съ небольшимъ количествомъ вина, или водки, увеличивая мало по малу степень теплоты поперемѣннымъ обкладываніемъ вокругъ его теп-

лыхъ камней. Когда уже окажется нѣкоторая движимость и теплота въ шѣль, то можно осушивъ его теплыми полотенцами, клась въ легко нагрѣшую постель, или въ пакъ называемую

2) *Пестаню постель*, то есть, усыпавъ большое полотно, вышиною въ два пальца, умѣренно теплою золою, либо пескомъ, или солью, просомъ, рожью и проч. и осушивъ сперва мокрецо теплою теплыми суконками, положишь его на оныя, а пошомъ присыпашь равномѣрно все тепло, исключая лицо, сказанными веществами вышиною въ два перспа. Вокругъ шеи обвернешь наполненные ими холстинки, а на голову надѣшь съ сими же веществами шапку.

Коль скоро обнаружится скольконибудь живаго движения, то поступашь пакъ, какъ выше предложено при обмирании (§ 201, 1—5).

D.

О спасеніи утопшихъ.

§ 205.

1) При выпягиваніи изъ воды надо бѣ остерегаться, дабы голова, грудь и шея не были повреждены.

2) Утошаго не должно тряспти, а пѣмъ болѣе не обращать внизъ головою.

3) Надлежитъ перенести его безъ оплакательства, не опуская головы внизъ, въ ближайшій домъ и, положивъ въ умренно шепломъ покой, шакъ, чтобы голова его была выше шуловища и притомъ на правой бокъ, немедленно раздѣльши обшереть и обвернуши слегка шелыми полошечами.

4) Безпресашно напирашиъ его, особенно подошвы ногъ.

5) Ропъ и нось очишиши опъ мокропъ, песка и ш. д. перомъ, обмоченнымъ въ масло, либо холстинкою.

6) Чрезъ ропъ и ноздри впушашь въ легкія воздухъ, придавливая при семъ слегка грудь и соображаясь съ движениемъ онай, какъ бываешъ при нашуральномъ дыханіи; сверхъ этого поспушашь шакъ, какъ при обмирани (1—5) § 201.

E.

С спасеніи удавленныхъ, или повѣсившихся.

§ 206.

1) То, на чемъ висишъ удавленный, спопчясь опрѣзашь, — предосперегаясь, дабы шѣло не упало на землю.

2) Сняши съ него все плащье.

3) Внесши шѣло въ прохладный воздухъ и дать ему такое положеніе, чтобы голова и грудь лежали нѣсколько повыше.

4) Открыть кровь на рукахъ, либо на ногахъ, дѣлашь насѣчки на головѣ, зашылкѣ, за ушами и поспупашь далѣе, какъ показано при обмираниіи (1—5) § 201.

ПОСТРѢЛЪ, ИЛИ УДАРЪ,

(Неправильно просплюдимами называемый параличемъ).

§ 207.

Пострѣлъ называється мгновенная пошеря самопознанія и произвольныхъ движений, соединенная съ глубокимъ сномъ, храпѣniемъ и параличемъ.

ЯВЛЕНИЯ И РОДЪ ТЕЧЕНИЯ.

1) *Предъ наступленіемъ*. Задолго еще предъ появлениемъ пострѣла примѣчающееся обыкновенно часпо возвращающееся головокружение, шошноша и рвота безъ предшествовавшаго обремененія желудка, напаче у спарыхъ людей, чувство ползания мурашекъ въ членахъ, необыкновенная сонливость, наступающая, даже не въ урочное время; странное желание, какъ во время бѣнія, шакъ и сна, опьянение нижней челюсти, долго продолжающейся шумъ и звонъ въ ушахъ, низвѣшиваніе вѣкъ, весьма сильное дрожаніе въ рукахъ и ногахъ, черныя и пемныя явленія и

пяшина предъ глазами, небольшія изкривленія рта или другихъ мышицъ лица, а особенно у старыхъ людей, чувство боли въ затылкѣ и во лбу, мгновенное падение, непроизвольные слезы, зѣвонка, забывчивость, слабость памяти, пустота чувствъ, медлишельная, соединенная съ заиканіемъ рѣчъ, прямое положеніе на хребтѣ, глубокое дыханіе.

2) *Во время наступленія.* Если спящій находился въ спокойствіи положенія, то мгновенно упадаетъ долу и впадаетъ въ глубокій сонъ; при чёмъ жилобіеніе и дыханіе еще продолжается, хотя послѣднее сопряжено съ храпѣніемъ.

3) *При достиженіи высокой степени спящій* теряетъ всесъщеніе и представляется лежащимъ въ глубочайшемъ сне съ храпѣніемъ и выхожденіемъ пыни изо рта. Въ высочайшей степени пульсъ чрезвычайно медленный, сильнѣйшая раздраженія не оказываются никакого чувствующаго впечатлѣнія. Глошаніе невозможно, зрачки разширяются и дѣлаются безчувственными, всѣ части поражены параличомъ. Каль и моча выходятъ непроизвольно, нижняя челюсть опускается, появляется холодный потъ, и проч.

И с х о д ы.

§ 208.

а) *Болѣзnenные.* Расположеніе къ ча-

спымъ возвращамъ, лихорадочные припадки и параличъ какихъ нибудь частей въ особенности.

б) Смертельные. Самая смерть.

Предсказание.

§ 209.

Предсказание здѣсь всегда сомнительное, поелику больной, или тошачъ при первомъ припадкѣ умираешьъ, или остаешься у него параличъ въ какой нибудь части, или по крайней мѣрѣ получаешьъ онъ расположение къ возвращамъ,

Опасные признаки супъ:

1) Безпреспанное выхожденіе пѣны изо рта, непрерывное, сильное храпѣніе и шрудное дыханіе.

2) Если спраждущій хватается всегда за голову. Больные съ симъ признакомъ большой подвержены опасности, равно какъ и тѣ, коихъ глазный зрачекъ очень разширенъ и неподвиженъ.

3) Когда дѣйствительнѣйшія средства не оказывають никакого впечатлѣнія.

4) Непроизвольно и безъ вѣденія большаго совершающееся испражненіе кала и мочи.

5) Кровь, или сукровица, выпекающая изъ носа по каплямъ.

6) Малый и перемежающійся пульсъ.

7) Холодный, выдыхаемый воздухъ,

также холодный каплеобразный пошъ на лбу.

8) Судороги въ какой-либо части тѣла.

9) Равнымъ образомъ, если въ первые 24 часа не окажется никакого поправления болѣзненнаго состоянія.

Напротивъ этого можно еще имѣть надежду:

а) Когда первая помощь искуства производитъ нѣкоторое поправленіе, хотя бы оно было и малозначающее.

б) Когда дыханіе свободнѣе и перестало храпѣніе.

с) Когда обнаруживается обильное кровопеченіе изъ носа, либо геморроидальное теченіе, либо криптическій пошъ, либо поносъ.

д) Когда больной удобнѣе глопашь можетъ.

Опаснѣшее время есть:

а) Первые 24 часа.

б) Третій день, если не послѣдуешь смерть.

Сверхъ этого еще,

с) Шестой, седьмой и четырнадцатой день.

Причины.

§ 210.

1) Неумѣренное и въ привычку обращенное кровопусканіе, холодная и влажная погода, худое питаніе, холодное

пишье при разгоряченіи шѣла, скорбь, страхъ, частое обремененіе желудка, частая онанія, и проч.

- 2) Всѣ сильныя и долгопродолжающіяся воспалительныя болѣзни, величайшее пьянство, чрезмѣрное движение шѣла, сильныя спрасши, какъ-то: непомѣрная радость и любовь, вѣнчній жаръ, большой солнечный зной, сильно и скоро раздражающія лѣкарства, какъ-то: опій, продолжительное и неумѣренное наслажденіе жизнью, и т. д.

Всѣ сіи причины скорѣе и удобнѣе причиняющій ударъ у шѣхъ, кои расположены къ нему и имѣющій корошкую и широкую шею, большую голову и широкія плечи, такжে великую чувствительность шѣла.

ЛѢЧЕНИЕ.

§ 211.

Сперва должно удалить существующія причины, попомъ спарашься помощію оживляющихъ средстивъ привески пораженныхъ частіи въ прежнюю ихъ дѣятельность.

Время, требующее вящей помощи, есть приключеніе самаго поспрѣла. Однакожъ прежде всего надобно освѣдомившись о преждѣбывшемъ родѣ жизни, состояніи больнаго и о шѣхъ вредноспяхъ, кои участвовали непосредственно въ произведеніи поспрѣла.

Нужнѣйшія здѣсь средства суть слѣдующія:

1) Во время припадка непремѣнно нужно положить спраждущаго на спину съ поднятою головою и съ отвисшими ногами, распегнувъ тѣсное плащье, галстуки и проч.

2) Напирамъ, если можно, все тѣло кускомъ теплую фланелью, или обмывашь его крѣпкою водкою и уксусомъ.

3) На головѣ дѣлашь примочки изъ водки и уксуса, въ носъ вдувашь нѣсколько пабачнаго дыму, либо шолченаго перцу и поспупашь далѣе, какъ показано при обмирани (§ 201).

4) Если поспрѣль случится послѣ спала, отъ обремененія желудка вспучивающею и бродящею пищею, то надлежишъ давать больному рвотное (*), ставишь клиширъ изъ поваренной соли мыла и ромашковаго наспоя, или смопря по обстоятельствамъ, употребляшь слабительное, поелику въ семъ случаѣ поспрѣль происходитъ отъ мѣстнаго спраданія желудка.

5) У полнокровныхъ здоровыхъ людей, при очень сильномъ напорѣ крови къ головѣ и покраснѣвшемъ или посинѣвшемъ

(*) Пользу и необходимость рвотнаго въ семъ случаѣ гораздо удобнѣе можетъ решить опытный врачъ и попому, если возможно, лучше прибегнуть къ совѣту онаго.

лицъ, можно пуспить кровь, особливо на шеѣ изъ шейной яремной вѣны, прикладывашь горчичное пѣспо, либо шпанскій пласпышъ, къ зашылку и къ подошвамъ ногъ, напирать почаше виски, спину и ложечку, спавиши клиスピръ изъ повареной соли и настпоя шолченой горчицы, дѣлашь горчичныя напиранія, ванны и проч.

При уничтоженіи шакимъ образомъ опасноспіи, надлежишь искаль помощи у благоразумнаго, опытнаго и искуснаю врача, для узнанія скрышной иногда причины сей болѣзни, отклоненія возвращовъ ея и дальнѣйшаго лѣченія.

П А Р А Л И Ч Ъ.

§ 212.

Паралитемъ называється лишеніе, либо движенія, либо чувствованія какой нибудь части нашего тѣла, либо обѣихъ вмѣстѣ.

Я В Л Е Н И Я.

1) *Предъ наступленіемъ* происходящаго вообще оипъ слабоспіи паралича, предшествуетъ очень часпо шягоспіи, блѣдноспіи, безчувственность и неповоротливоспіи какого нибудь члена, иногда изкривленіе,

или дрожание онаго. Сверхъ этого примѣ-
чаешься головокружение, оглушеніе, непро-
извольныя слезы, унылость, ослабѣваніе
памяти и умственныхъ силъ.

2) Во времія пораженія могутъ быть
два различные случая:

а) Либо всѣ части шѣла на одной спо-
ронѣ, исключая головы, разбиты парали-
чъ, и тогда называемый онъ *половин-
нимъ паралитемъ*.

б) Либо все шѣло, кроме головы, пора-
жены онимъ и шаковой припадокъ на-
зывающийся *повселиственнымъ паралитемъ*.

И с х о д ы.

Замѣчено, что иногда кровавый, или
проспой поносъ, либо перемежающаяся
лихорадка, наипаче чешыредневная, рѣша-
ли параличъ; впрочемъ на сіе мало надле-
житъ полагаться; и, если онъ не будеъ
уничтоженъ, то можетъ произойти все,
что происходило и при поспрѣлѣ.

П р е д с к а з а н і е.

§ 213.

Вообще недугъ сей всегда трудно из-
лечиваешься, и въ особенности:

Чѣмъ дольше параличъ продолжался, чѣмъ
менѣе можно надѣяться на то.

Чѣмъ извѣстнѣе причина существую-

щаго паралича, шѣмъ болѣе мы въ сосѣданіи излѣчишь его.

Слабая теплота и малый пульсъ въ параличномъ членѣ служашъ сомнительнымъ признакомъ.

Всего хуже, если спраждущая часть испощаещяся.

Хорошиими признаками почишаюшися:

1) Сильное слюноотеченіе, случающееся въ первый мѣсяцъ болѣзни.

2) Возстановляющееся чувствование въ параличномъ членѣ; равнымъ образомъ дрожаніе, либо усиливающійся пульсъ въ ономъ.

Впрочемъ параличъ, поражающій руки и ноги, удобиѣ излѣчиваешься, нежели глаза, языкъ и другія наружныя чувствва, а сей опять удобиѣ, нежели параличъ мозга, какъ-то: шупость чувствъ, забвніе, недоспапокъ въ сужденіи и проч.

Параличные ноги скорѣе можно излѣчить, нежели руки.

Причины.

Общія съ причинами поспрѣла.

Лѣченіе.

§ 214.

При лѣченіи паралича, надлежишь во первыхъ, если возможно, уничтожишь причины произведенія его. Если онъ

произошелъ послѣ поспрѣла, то нужно употреблять внутреннія средства, сообразныя свойству сего послѣдняго. Если параличъ первоначальный или самостоятельный, то изъ внутреннихъ средствъ полезнѣйшими въ шакомъ случаѣ могутъ быть:

1) *Горчичная сыворотка.* Взять горчичныхъ съмянъ полченыхъ два лопа и сперши ихъ съ однимъ фуншомъ молока, прибавивъ немного бѣлаго или другаго вина, попомъ вскипятить, процѣдить и употреблять по полуфуншу по ушру и вечеромъ.

2) *Отваръ теремховой корки.* Взять чремховой корки двадцати лопа, водки четыре лопа, воды проспой 10 лоповъ, поспашивъ въ теплое мѣсто въ закрытомъ сосудѣ на 6 часовъ, попомъ слить наспанную жидкость въ другой сосудъ и выжавъ корку, варишь ее съ 16 лопами воды, пока останется половина. Отваръ сей процѣдивши, смѣшашь съ прежнею наливкою и употреблять чрезъ два часа по споловой ложкѣ. Средство сие наиболѣе полезно шамъ, гдѣ параличъ окажется послѣ ломоты въ какомъ либо членѣ.

3) Въ упорномъ параличѣ похваляется много настой цвѣтовъ бараньей травы, приготовленный изъ 1 лопа цвѣтовъ и одного фунша кипячей воды и употребляемый чрезъ два часа по споловой ложкѣ.

Что касается до наружныхъ средствъ, то полезнѣйшія изъ нихъ суть: жаленіе крапивою параличного члена, горчичное шѣсто, прикладываемое къ оному, ванны съ ароматными травами, припарки, преніе фланелью, напершюю камфорою, обливаніе холодною водою, муравьиная ванны, продолжительное щекотаніе перомъ и обвертываніе члена недавно содранною съ живопнаго теплою кожею.

Въ параличъ языка должно жевать разные оспрыя вещи, какъ то: корицу, перецъ и проч. и выполоскивать рошь горчичнымъ насѣкомъ.

Падучая болѣзнь.

§ 215.

Всякій припадокъ, сопровождій въ сильныхъ судорогахъ всего тѣла съ недостаткомъ самовѣдѣнія и чувствованій, называемый падучею болѣзнью.

Явленія и родъ теченія.

§ 216.

1) *Предъ наступленіемъ* оказывается пущоспѣшствующими душевныхъ силъ, слабоспѣшнаружныхъ чувствъ, обрѣзглоспѣ лица, головокруженіе, шажеспѣ въ головѣ, дав-

леніе надъ глазами, пягость въ членахъ, звонъ въ ушахъ, забывчивость, особенное чувство, какъ бы ползанія мурашекъ отъ какой нибудь часши пѣла къ головѣ и т. д.

2) *Во время наступленія спраждущій* съ блѣднымъ лицомъ, крикомъ и совершившимъ безчувствіемъ разомъ упадаешь долу, испускаешь пыну, вгибаешь большие пальцы къ ладони, бѣешь головою и членами, скривливаешь спрашно глаза съ сильнейшими судорогами во всемъ тѣлѣ. Съ симъ иногда сопряжено бываешь непроизвольное выхожденіе мочи, кала и сѣмени.

3) *При достиженіи высокой степени дыханіе* бываешь сильное и храпливое, языкъ спискивается зубами, большой впадаешь въ крѣпкій, или такъ называемый апоплексический сонъ. Все сіе продолжается долѣ, или короче.

7) *Во время умаленія.* Спраждущій пробуждаешься, не помнишь ничего съ нимъ происходившаго, большую часю находишься еще въ продолженіи короткаго времени въ нѣкошоромъ разспойствѣ и въ шеченіи одного, или нѣсколькихъ дней бываешь печалень, спраждешь пученіемъ брюха отъ вѣпровъ, жалуешься на боль въ головѣ и членахъ. При частыхъ возвращахъ сей болѣзни дѣлаешься онъ наконецъ совершенно слабоумнымъ.

И с х о д ы.

§ 217.

Переломы, коими иногда уничтожаещася сія болѣзнь, сушь: перемежающаяся лихорадка, кровавый поносъ, или по-всемѣштвенная чесотка.

Прочие же исходы сушь:

а) Болѣзненные: осипающееся впередь расположение къ падучей болѣзни, параличъ, водяная болѣзнь, сумасшествіе и меланхолія.

б) Смертельные: посиръль.

П р е д с к а з а н і е.

Болѣзнь сія иногда осипаешся на цѣлую жизнь и припомъ съ нею можно прожить до самой спароспи.

Но вообще она трудно излечивается, особливо

а) Когда существуетъ наследственное къ ней расположение.

б) Когда причину происхожденія ея распознать нельзя.

с) Если она давно уже продолжается.

д) Если промежутики времени ея наступленія продолжительны, и

е) Если она оказывается при таковыхъ опправленияхъ, кои неизбѣжны, какъ то: во время сна.

Причины.

§ 218.

Брожденное расположение, также холдъ, худое пищаніе, влажный и испорченный воздухъ, кровошеченія, грустъ, страхъ, онанія, неумѣренность въ любви и питье спиртныхъ напитковъ, напряженіе умственныхъ силъ и т. д.

Спосовъ лѣчения.

§ 219.

По очень явственнымъ причинамъ нельзя здѣсь изложить обстоятельного лѣченія падучей болѣзни; ибо оно требуетъ опыта и благоразумнаго врача. По сему здѣсь предложены скромно правила, какъ поступать во время припадка сей болѣзни и предосперегать себя отъ онаго.

Всего нужнѣе такъ держать больнаго нѣсколькимъ людямъ, чтобы онъ не ушибъ себѣ важныхъ частей — изложенные средства едва нужны — да ихъ употреблять невсегда бываешьъ возможность.

1) При самой припадкѣ надобно производить большой спукъ предъ ушами больнаго, держать подъ носомъ порѣзанный лукъ, либо зажженное перо, обмывашь виномъ, либо водкою виски и руки

позади ручного запястья, также нагревши вино, либо водку, спереть ими ложечку и вдоль спины, нащирать порядочно руки и ноги теплыми салфетками; спавшись промывательные, особенно изъ табаку, либо табачного дыма, а всего нужне держать больного несколько людемъ шакъ, чтобъ онъ не ушибъ себѣ головы или другихъ важныхъ частей.

2) Для предоспереженія отъ шаковыхъ припадковъ, должно вдругъ подвязать шту часть, въ кошорой оказываюся предвѣсники ихъ наступленія. Можно также въ семъ случаѣ употребить шопчасъ всѣ упомянутыя средства и, предписывая приличную пинашельную діэшу, уменьшивъ силу и самыхъ припадковъ.

При оспушествіи врача для излеченія сей болѣзни, можно испытать слѣдующее невинное домашнее средство: взять собранныхъ осенью, очищенныхъ и высушенныхъ почекъ корня чернобыльника (*artemisia vulgaris*), спереть ихъ въ мелкій порошокъ и шопчасъ предъ пароксизмомъ или послѣ онаго давать хорошую чайную ложку сего порошка съ теплымъ пивомъ или съ чаемъ. Послѣ сего надобно лечь больному въ постель, оспаться въ оной, пока не выступитъ сильная испарина, что обыкновенно случается чрезъ часъ и пошомъ надѣть чистую, нагрѣвшую рубашку. Таковый прі-

емъ порошка точно шакимъ же образомъ надлежишъ повшоринъ на шрептій и на пятый день, пока припадки болѣзни совершенно уничтожаються.

ЗЛАЯ КОРЧА ИЛИ РАФАНІЯ.

§ 220.

Такъ называемая шальная болѣзнь, которая сопровождается слѣдующими явлениями: сперва непріятнымъ чувствомъ, какъ бы ползанiemъ мурашекъ и зудомъ въ ногахъ, послѣ сего въ скоромъ времени слѣдующи сильныя боли въ животѣ и побужденіе къ рвотѣ; попомѣ спраданіе головы и рукъ: пальцы шакт крѣпко сжимаютсѧ, чѣмъ самыи сильныи здоровый мужчина не въ состояніи расправить и ручные сосѣдавы дѣлаюющи какъ бы вывихнутыми. Больные издають жалостный вопль и чувствуяющи въ рукахъ и ногахъ, какъ бы палящи огнь. Послѣ сихъ болей оснается шая гость въ головѣ, нѣкоторый родъ опьяненія, поплемненіе въ глазахъ, не рѣдк слѣпопа, или двойное зрѣніе, помѣша шельство ума, съумасшествие, меланхолія или сонливость. Опьянелость увеличивается, шѣло искривляется назадъ шакъ, чѣмъ представляешь видъ дуги роиць наполняющей красновашою, желто-

или зеленовашою пъною; языкъ опъ сильныхъ корчей повреждаешся и не рѣдко распухаешъ до шакой спепени, чио препяшшуещъ произношенію словъ, запрудняешъ дыханіе и производишъ сильное слюноотеченіе. За сими припадками слѣдуешъ неупомимый голодъ, но рѣдко больные имъюшъ отвращеніе къ пищѣ, а еще рѣже оказываюшся пяшна на различныхъ мѣстахъ шѣла.

Въ высшей спепени сей болѣзни и при особенномъ расположении появляюшся и ногда фюлешовыя пяшна и пузырки на ногахъ, обнаруживающіеся аншоновъ огонь во всемъ ужасномъ его видѣ и проспираешся до колѣна; при чемъ нога опѣляешся опъ своего соспава и оппадаешъ, осипавляя красную рану, копорая въ скромъ времени заживаешъ, если больной не спанешъ подвергашся произведшимъ и поддерживающимъ сю болѣзнь причинамъ.

Всѣ сіи припадки соединены бываюшъ съ аспеническою (гнилою или нервною) горячкою.

П р и ч и н ы.

§ 221.

Болѣзнь сія, какъ выше упомянущо, всегда свирѣпствуещъ повально между бѣдными сельскими жителями опъ продол-

жипельного недоспашка въ здоровой пищѣ и употребленія не хорошо выброшенаго, пяжелаго для сваренія въ желудкѣ хлѣба, который собирается иногда съ поля не созревшимъ надлежащимъ образомъ, по причинѣ сырого лѣпа. Равнымъ образомъ причиною сего недуга бываешь иногда хлѣбъ, приготовленный изъ ржаной муки, имѣющей въ себѣ чрезмѣрное количество черныхъ рожковъ, опѣ кошорыхъ печенья хлѣбъ имѣетъ черный цветъ и горький вкусъ; — также располагающіе къ сему часыя перемѣны сырой, влажной и вѣтриной погоды, низкое, болотистое мѣстоположеніе жилищъ, спѣсненіе многихъ семействъ въ одной хижинѣ, неопрятность, бѣдственное, угнетенное соспаніе жипелей и проч.

Лѣченіе.

§ 222.

Главное условіе при лѣченіи сей болѣзни соспощь въ удаленіи произведеніи и поддерживающихъ ону причинъ. На сей конецъ 1) надлежитъ отѣлии больныхъ въ особенные, проспанные и къ лѣченію удобные комнаты, которые бы часпо освѣжаемы и окуряемы были уксусомъ. 2) Запрещать всѣмъ жипелямъ употребленіе вреднаго, сырого, не надле-

жащимъ образомъ приготовленного, или смѣшаннаго съ черными рожками хлѣба, давашь имъ свѣжій и здоровый хлѣбъ, капусшу, мясныя похлебки, расшипельные плоды, а для питья квасъ, воду, подслащенную уксусомъ и медомъ.

Для уменьшенія судорогъ и корчей надлежиша давашь черезъ часъ по двѣ ложки ошвара маковыхъ головокъ, приготовленного изъ трехъ головокъ съ одной половиною бутылки воды.

При горькомъ вкусѣ во рту, обложенномъ языкѣ и наклонности къ рвотѣ, нужно пить крѣпкій, теплый ромашковый чай въ большомъ количествѣ до произведенія рвоты, а для послабленія на низъ ошваръ виннаго камня (креморшара). Если больной жалуешся на оцѣпленіе и холода въ ногахъ, то надобно сдѣлать ему ножную ванну, приготовляемую изъ ароматныхъ травъ, какъ то: богородичной травы, розмарина, шалфея, мяты, ромашки и т. под. съ примѣсью уксуса; послѣ ванны нужно напереть ноги шерстяною манжеріею и покрыть ихъ сверху холстинки, обмоченными въ настой бузинныхъ цветковъ, къ коему прибавлено 15 или 20 капель нашашырнаго (нюхательнаго) спирту или въ щелокъ.

При большомъ ослабленіи силъ, бредѣ и проч. полезно употреблять слѣдующій соспавъ:

Взять дубовой или ивой корки два лопа,
цвѣтковъ бораньиправы и лисунна-
го корня, каждого по два золотника,
изрѣзать ихъ по мельче и наливъ на
оные полбушылки кипачей воды,
дашь постоянъ въ закрытомъ сосудѣ
цѣлый часъ, пошомъ процѣдинъ и
подсласпивъ медомъ или сахаромъ,
выливашь чрезъ часъ по столовой
ложкѣ.

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЙ ВОЛДЫРЬ.

§ 223.

Симъ именемъ называемся особенная
заразительная болѣзнь, оказывающаяся
следующимъ образомъ: въ какой либо ча-
сши пѣла, преимущественно на нѣжныхъ
и болѣе мясистыхъ частяхъ, рождаются
маленькое, красного цвѣта, круглое пят-
нышко, подобное укушенію блохи, сопро-
вождаемое непріятнымъ зудомъ и пре-
вращающееся въ прозрачный, величиною
въ просяное зерно, пузырекъ, который
въ скоромъ времени увеличивается и дѣ-
лается синеватымъ или буроватымъ.
Пошомъ въ большомъ мѣстѣ ощущающееся
ограниченный, швердый и плоскій буго-
рокъ, величиною въ чечевичное зерно;
при чёмъ зудъ усиливается и сопрово-
ждаются жаромъ и разъѣденіемъ. Нако-
нецъ больное мѣсто распухаетъ и по-

верхності его дѣлається напряженою и блестящею; около средоточія бугорка появляется болѣе или менѣе широкій, лоснящійся кружокъ, оплывающій различнымъ, большею частию шемнова-
щимъ цвѣтомъ и усыпаный маленькими пузырьками, наполненными красноватою влагою. За симъ упомянутый бугорокъ перемѣняется свой цвѣтъ, дѣлаясь шемновавшимъ, весьма твердымъ и нечувстви-
тельнымъ и полагаешь начало антоно-
ву огню, который мгновенно распространяется, поражая глубже лежащія
части и приводя въ состраданіе все тѣ-
ло. При правильномъ, благовременно
препринятомъ лѣчениі, у здоровыхъ пол-
носочныхъ людей болѣзнь сія въ скоромъ
времени уничтожается; но у слабыхъ
людей она быстро распространяется и
скоро заражаетъ все тѣло; при чёмъ
пульсъ бываетъ твердый, болѣе или ме-
нѣе скорый и неровный, кожа сухая,
языкъ сухой и шемновавший, жаръ въ
тѣлѣ кажущийся умѣреннымъ, но внутири
чувствуешь больной какъ бы палящій
огнь; — онъ терпитъ спильную жажду и
ничѣмъ не можетъ утолить ее, находи-
тесь во всегдашнемъ безсиліи, впадаешь
часто въ слабость, имѣешь наклонносѣ-
ть рвотѣ, боли въ животѣ, иногда очень
сильныя, дыханіе короткое и вздохами
прерываемое. Моча его малоколичествен-
ная, густая и кирпичного цвѣта. Въ

высшей степени болѣзни спрѣждущій
переять разсудокъ и впадаешь въ ши-
хій бредъ, всѣ мѣстные припадки возра-
стаюшь, опухоль дѣлается чрезвычайно
большою и больной умираешь въ анпоно-
воогненномъ состояніи, издавая гнилой,
чрезвычайно вонючій запахъ.

Теченіе сей болѣзни бываешь иногда
ужасно скоро, такъ что больной уми-
раешь не рѣдко въ печеніи двухъ или
трехъ дней.

Причины.

§ 224.

Болѣзнь сія обнаруживается наиболѣе
послѣ жаркой и сухой погоды во время
скопской чумы или падежа, наипаче
шамъ, гдѣ крестьяне сдираюшь съ упа-
лыхъ животныхъ кожи, либо когда на-
ходяшися въ соприкосновеніи или въ близ-
комъ разстояніи съ зараженными же-
вотными.

Равнымъ образомъ мясники, кожевни-
ки и всѣ пѣ, кои обращаются съ шерстью
и кожами палыхъ животныхъ, могутъ
получить сію болѣзнь, если они не об-
мываютъ шотчасъ тѣхъ частей, ко-
ими они прикасались къ означеннымъ
вещамъ.

Л ъ ч е н і е.

§ 225.

При первомъ появленіи болѣзни наипаче для шѣхъ, кои употребляли мясо больныхъ живошныхъ, полезно дать рвотное изъ 4 или 5 гранъ бѣлаго купороса, распворенного въ водѣ, либо слабищельное изъ 2 лоповъ Астраханской или Сибирской соли. Послѣ сего, не теряя ни мало времени, припушшиь около спраждущаго мѣсца отъ 6 до 8 піявицъ; а шамъ, гдѣ наружное воспаленіе очень сильное и больной здороваго сложенія, необходимо нужно открытие изъ руки отъ 16 до 20 лоповъ крови, давашь внушире шри раза въ день по шрецѣй часпи золопника очищенной селишры, для пышья употребляти уксусъ съ водою, квасъ и проч. и воздерживашься отъ грубой пищи и горячищельныхъ напитковъ.

Впрочемъ все сіе можно дѣлать шолько въ самомъ началѣ болѣзни и вообще не долѣе первыхъ двухъ или трехъ дней; а коль скоро обнаружишися анпоновъ огонь и помертвѣніе въ наружныхъ частяхъ, слабость въ шѣлѣ, дрожащій, малый и сжатый пульсъ и проч., то надлежитъ соблюдать показанную при гнилой горячкѣ (§ 27) діашу и употреблять, какъ предложено шамъ, вино и камфору.

Антоновъ огонь, произшедшій въ наружныхъ частяхъ послѣ воспаленія, можно лѣчить шакъ, какъ показано ниже.

Сей способъ лѣченія при открывшейся недавно болѣзни сей въ Шавельскомъ уѣздѣ Виленской губерніи, испытанъ былъ съ большимъ успѣхомъ Корпуснымъ Штабъ-Докторомъ Чорбою.

§ 226.

Въ Южной Франціи, гдѣ зараза сія свирѣпствуєтъ часто, лѣчашь ее слѣдующимъ образомъ: въ самомъ началѣ болѣзни разрѣзывающъ пузырекъ, выдавливающъ сукровицу изъ онаго и кладуя на средину его свернушій кусочекъ корпіи, величиною въ горошину и обмоченный *въ разведенное купоросное масло* (*acid. sulphur. dilutum.*), прикрывъ его сухою корпіею и укрѣпивъ липкимъ пластиремъ (No 19) и приличною повязкою. По прошествіи 5 или 6 часовъ, снимающъ повязки и на шомъ мѣстѣ, гдѣ былъ пузырекъ, оказывается сухой, швердѣй спрупъ, который покрывающъ корпіею намазанную мазью, соспавленною изъ двухъ лоповъ бѣлаго меду, двухъ золопниковъ яри мѣянки, въ мелкомъ порошкѣ, одного золопника мирры или смирны, превращенной въ порошокъ и одного личнаго желшка, смѣшанныхъ между собою надлежащимъ образомъ. Если въ

слѣдующее ушро не окажется ни твердосши, ни багроваго кружка, вокругъ прежде бывшаго пузырька, а только боли, шо продолжаюшь прикладываніе означенной мази до шѣхъ поръ, пока опашаешь спруть; а если сіе произойдетъ, то прикладываюшь къ ранѣ корпію, обмоченную въ слабый распворъ квасцовъ или въ извесковую воду.

Если же появится твердоспись и багровый или темнокрасный кругъ, припомъ опухоль будеъ значительная; шо вскрываюшь спруть оспріемъ ланцета или удобнаго къ тому ножа, раздѣляюшь его на многія часпи, остерегаясь однако поврежденія живаго шѣла и извлекаюшь онъя прочь; послѣ сего очистивши губкою дно раны, вкладываюшь въ оную кислочку изъ корпіи, обмоченную въ мыловарный щелокъ, распворъ Ѣдкой извески и мыла (см. лѣченіе укушенія змѣи § 269), или въ другое Ѣдкое вещество и, обложивъ вокругъ корпію, напишанною сими же Ѣдкими веществами и прикрывъ сухою холстинкою, перевязываюшь бинтомъ. По прошеспвіи нѣсколькихъ часовъ, снимаюшь повязку и дѣлаюшь новую съ вышеуказанною мазью, перемѣняя ее чрезъ каждые 12 часовъ и обмывая рану въ слѣдующіе дни смѣсью изъ слабаго распвора поваренной соли и водки до шѣхъ поръ, пока между

живыми и помершими частями произойдетъ пограничная линія.

Въ сie время для произрожденія оной линіи дають камфору, хорошее вино и другія крѣпительные средства.

Если въ началѣ не было подано надлежащей помощи и болѣзнь пришла уже въ такое состояніе, что снаружи оказался сухой и твердой спруть, а близъ лежащія части угрожающій переходомъ во влажный антоновъ огонь, то дѣлаютъ нарывы на спраждущемъ мѣстѣ, остерегаясь впрочемъ сильного кровопеченія, могущаго ослабить больнаго; пошомъ употребляютъ ѳдкое средство, какъ шо: мыловарный щелокъ, распиворъ ѳдкой извески и мыла, а особливо крѣпкую соляную кислоту, овлашая ими всѣ мѣста волдыря, наипаче между нарѣзами; за симъ прикладываютъ на больное мѣсто припарку изъ дубовой корки и камфорного спирту и прикрываютъ его шонкою холстинкою, намазанною мазью изъ 2 лоповъ камфоры, расщепленой съ двумя яичными желтками и четырехъ лоповъ бѣлаго меду, перемѣняя припарку чрезъ 6 часовъ до шѣхъ поръ, пока воспослѣдуешь опрѣленіе спрута и пріоспановится омершившіе. Здѣсь также дають вышеупомянутыя внутреннія крѣпительные средства.

По уничтоженіи антонова огня и по очищеніи язвы ошь помершими ча-

спей, лѣчашъ оную шакъ, какъ и всякую просипшую язву. (Смоп. II часпь).

Сибирская болѣзнь, или Сибирская язва.

§ 227.

Въ Сибири и во многихъ провинціяхъ Россіи открывається иногда слѣдующаго рода болѣзнь: у больнаго рождающа сперва мѣстная колючая боль въ какой либо части шѣла, особенно на поверхности онаго; попомъ оказывается красное пятно, имѣющее въ поперечникѣ 7 или 8 линій. Пятно сие весьма рѣдко продолжается цѣлые сутки, а болѣею частію чрезъ четверть или полчаса дѣлается чернымъ и переходитъ въ анипоновъ огонь. Вмѣстѣ съ симъ показывается въ окружности болящаго мѣстца воспаленная, на рожу похожая, иногда съ опекомъ соединенная, различной обширности опухоль, которая близъ упомянутаго пятна бываетъ гораздо болѣе, цвѣтомъ темносиневатая, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ онаго дѣлается бѣлокрасною и наконецъ превращается въ видъ опекшей опухоли. Опекъ бываетъ примѣнище при обширной опухоли и впечатлѣніе, произведенное на немъ посредствомъ перспи, мгновенно исчезаетъ. Темпомъ онаго не умножается, но умень-

шаетъся. На шеѣ и на груди болѣзнь сія всегда сопряжена съ большою, а на ногахъ и на рукахъ съ меньшою опухолью. Рѣдко на первоначально страждущемъ мѣстѣ случается настоящій паховикъ (возвышенная, ограниченная опухоль), хотя мѣсто, на которое оказывается черное пятно, всегда бываетъ нѣсколько возвыщено.

Вмѣстѣ съ чернымъ пятномъ и паховикомъ обнаруживаются иногда водяные пузырьки, по разрѣзѣ коихъ выпекаешь желтая, сполъ тѣккая жидкость, чѣмъ, будучи разлиша по здоровымъ частямъ, разъѣдаешь оныя и испребляешь блескъ полированныхъ инструментовъ, дѣлая прикосновенія єю мѣсту черными. Боль, сопровождающая мѣстное спраданіе, во многихъ случаяхъ бываетъ не очень жесчока, но въ началѣ болѣзни оказывается скоропреходящая колючая боль заставляющая не рѣдко, по же-спокойствиѣ своей, кричать больныхъ. Часпицы, переходящія въ анпоновъ огонь, представляющіе конусъ, обращенный основаниемъ къ наружѣ, а остроконечіемъ къ нутри, которое весьма часто бываетъ такъ шонко, какъ игла.

Къ сему мѣстному, по прошествіи нѣкотораго времени, если не подана была въ началѣ нужная помощь, присоединяется и повсемѣстное или внушреннее спраданіе, какъ то: пульсъ бываетъ ускорен-

ный и малый, оказывается боль въ подчревыи, распространяющаяся мало по малу по всему брюху, наклонность къ рвотѣ, — иногда запоръ, а иногда поносъ, сухость кожи, умноженная теплота въ тѣлѣ, жажда, не рѣдко ознобъ и жаръ, поперемѣнно слѣдующіе и ожесточеніе припадковъ къ вечеру.

Мало по малу оказываются явленія болѣе разспроинаго здоровья: брюхо вздувается и при дотрогиваніи болитъ; спрѣждущій жалуется на жестокія боли во всемъ чревѣ, напаче около пупка; принятая пища извергается рвотою, иногда также и нѣкоторое количество желчной жидкости, рвота не рѣдко слѣдуешь и при шоцѣ желудкѣ; языкъ покрытъ желтою слизью, или чистый, но красноватый и сухой; пульсъ малый и перемежающійся; жаръ жгучій, напаче вечернею порою; жажда нестерпимая, жестокая.

Наконецъ припадки сіи умножаются болѣе и болѣе; брюхо дѣлается очень вздутымъ; боль и беспокойствіе больнаго до-спыхаютъ до чрезмѣрности; пульсъ дѣлается нечувствительнымъ и очень перемежающимся; жаръ и холодный попѣльцу-дуютъ поперемѣнно; жалостный вопль и спонъ прерываются пихтой бредъ. Больной съ чрезвычайнымъ беспокойствомъ сползаешь съ постели, словомъ, всѣ движения его показываютъ жестокую боль,

пока смерть не окончишь спрашное сие явление.

Изъ сказанного здѣсь можно видѣть, что Сибирская болѣзнь или язва имѣетъ большое сходство съ злокачественнымъ волдыремъ.

Причины.

§ 228.

Причиною сего недуга полагаютъ укушеніе нѣкоторыхъ ядовитыхъ насекомыхъ; впрочемъ сие еще совершенно не доказано. Преимущественное же имѣютъ вліяніе въ произведеніи сей болѣзни:

а) *Болотистыя мѣста.* Всѣ шѣ страны, въ коихъ оказывается сія болѣзнь, состоящіе болѣею часпію изъ низкихъ, мокрыхъ и соленныхъ мѣстъ, высыхающихъ въ лѣтніе жары.

б) *Теплая погода.* Болѣзнь рождается всегда лѣтомъ и по большей части въ концѣ Июня мѣсяца, въ кромѣ того въ концѣ Августа и въ началѣ Сентября.

с) *Недостатокъ для питья хорошей воды.* Сие обстоятельство болѣе всего ощущительно бываетъ въ шѣхъ мѣстахъ, гдѣ свирѣпствууетъ описываемая здѣсь болѣзнь.

Л ъ Ч Е Н И Е.

§ 229.

Пока еще болѣзнь не сдѣлалась повсемѣстною, лѣченіе должно быть мѣстное. Въ самомъ началѣ, коль скоро будеТЬ примѣчена сія болѣзнь, нужно дѣлать нарѣзы въ анпоново-огненныхъ пятахъ и опухоляхъ; а если анпоновъ огонь распространится, то нужно вырѣзывать помертвѣлые часши съ оспорожностю, слѣдующими одно за другимъ наскѣчиами, дабы не повредить здоровыхъ частей; пошомъ прикладывашь на рану Ѣдкія средства, какъ то: Ѣдкій щелокъ, нашатырь само по себѣ, или растворенные въ оливарѣ табаку, скпицдарное масло, съ порошкомъ дубовой или ивой корки, камфору, расшврь поваренной соли и проч.

Вмѣстѣ съ упомянутыми средствами весьма хорошо дѣйствующіе припарки изъ ароматическихъ травъ, какъ то: полыни, ромашки, тысячелистника, божильного дерева и проч.; а если воспаленіе будеТЬ похоже на рожу, то мѣшечки, наполненные сухими оними травами, съ примѣсью камфоры.

По отдаленіи омертвѣнія или спрупа, что происходитъ обыкновенно въ первыхъ дняхъ, надобно остерегаться, дабы въ излишеспѣ употребляемыми Ѣдкими

и раздражающими средствами не помѣшать начинаящемуся живопворенію, которое оказывается краснымъ кружкомъ около спраждущаго мѣсца.

То же самое надлежитъ дѣлать и съ живопными, одержимыми сею болѣзнью.

Для лучшаго успѣха въ лѣченіи надлежитъ также давать и внутреннія средства, какъ то: настой ирнаго, либо мауннаго корня, соспавляемый изъ 1 лопа корня и 16 лоповъ кипячей воды и употребляемый чрезъ часъ по споловой ложкѣ; — камфору, коей скрупуль (20 грань) расширяется съ яичнымъ желткомъ, пошомъ разводится въ 6 лопахъ воды и даєтся чрезъ часъ по споловой ложкѣ, вино, особливо спарое ренское, а при немѣніи его водку, разведенную водою и пр.

Средства, какія надлежитъ соблюдать для предостереженія отъ сей болѣзни.

§ 250.

а) Коль скоро кто либо заболѣетъ сею болѣзнью, то нужно отдѣлить его отъ здоровыхъ и содержать въ особливомъ мѣстѣ. Нехудо и всѣхъ спраждущихъ симъ недугомъ помѣщать въ одномъ домѣ.

б) Падшую скопину должно увозить изъ деревни въ отдаленное пустое мѣсто и зарывать въ глубокой ямѣ, по крайней мѣрѣ въ сажень.

с) То мѣсто, гдѣ зарывають скопину, должно быть огорожено.

д) Трупы умершихъ отъ сей болѣзни людей должно также скоро похоронить.

е) По заходѣніи солнца скопину не выпускать на пасиву, а послѣ восходѣнія выгонять ее шуда не ранѣе, какъ послѣ нѣсколькихъ часовъ.

ф) Доспавляясь, какъ людямъ, такъ и скопинѣ чистую воду для питья. Для сего намѣренія, при недоспавшкѣ чистой воды, самую озерную или болотную воду дѣлать можно чистою и здоровою слѣдующимъ весьма легкимъ способомъ: на большой ушапъ положишь нѣсколько древесныхъ сучьевъ, на которыхъ разослаешь солому или зеленый вѣшви, а на сіи послѣднія насыпашь сполько хорошо выкаленнаго угля, чтобы оно солому или вѣшви совсѣмъ закрывало, попомъ на сіи уголья наливашь болотную или другую для очищенія взявшую воду, кото-рая будешъ прощекашь въ сосудъ въ до-вольно чистомъ соспанніи.

г) Въ очищенную и для питья годную воду вливаешь сполько соляной кислоты, чтобы оная вода имѣла кисловатый вкусъ.

и) Обливашь горячимъ уксусомъ можжевеловыя ягоды и давашь оныя 2 или 3 раза въ день здоровой скопинѣ, а въ клевахъ куришь можжевеловымъ уксусомъ.

і) Около домовъ и паспѣбищъ держать огонь изъ шакихъ веществъ, кошорые испускають много дыму, какъ шо: изъ спараго плашья, кусковъ кожи, свѣжаго ельнику и проч.; также намазывать скопину дегшемъ около рта, особливо на шѣхъ мѣстахъ, гдѣ по большой части рождаются паховики.

к) Скопину часто купать и обмывашь, впрочемъ не шогда, какъ она бываешь разгорячена; а у лошадей и рогашаго скота спавиши заволоку на передней части груди и на другомъ выгодномъ мѣстѣ.

І) Люди должны ходить, закрывая сколько можно грудь и шею и пить нѣсколько ложекъ въ день настойки, приготовленной изъ можжевеловыхъ ягодъ и уксуса; въ домахъ куришь уксусными и другими парами, предложенными (въ § 10).

По уничщеніи болѣзни, а) бывшія больницы должно оставляшь на нѣсколько мѣсяцовъ пустыми и въ клевы, въ коихъ находились больныя живошныя, чрезъ 2 или 3 недѣли, послѣ хорошаго повѣшыванія, спавиши скопину.

б) Вывозитъ навозъ и въ клевахъ находившуюся солому.

с) Внутреннія спѣны и полы въ больницахъ, также приборы, веревки и птицѣные сосуды, употребляемые во время болѣзни, надлежишь очищать и вымы-

вать щелокомъ, приготвленнымъ изъ древесной золы.

О ж о г а .

§ 231.

Опухоль съ жаромъ, рдѣніемъ и болью, происходящая въ какой либо части тѣла отъ случайного къ оному прикосненія огня, раскаленныхъ швердыхъ шѣль и горячихъ жидкостей, называемая ожогомъ.

Я в л е н і я .

Явленія ожогъ разношерстные по различію ихъ степени, коихъ бывають три:
 а) въ первой степени оказывается только едва примѣтная, красноватая съ малоощущимъ болю опухоль, которая сама собою, либо отъ употребленія нѣкоторыхъ средствъ скоро проходитъ.
 б) Во второй степени оказывается большая, рожъ подобная, опухоль, соединенная съ сильнымъ жаромъ, рдѣніемъ и волдырями, являющимися обыкновенно въ шесть мѣсяцій. с) Въ третьей степени: на опаленномъ мѣстѣ чувствительность отъ сильного дѣйствія огня бываетъ уменьшена, либо и вовсе испрѣблена; ожженное мѣсто получаетъ темный или черный цѣпь, разспроившися или въ спруть

превращається, либо по предшествии воспаленіи гнилымъ растворомъ разрушається; а сопредѣльные часки при семъ весьма сильно воспаляються.

Лѣченіе.

§ 232.

При лѣченіи нужно различать соспояніе и степень ожоги: — ибо по различію припадковъ, оказывающихся во всякой степени ожоги, употребляются и различные средства.

1) Въ первой степени можно иногда предупредить дальнія слѣдствія, погружая членъ въ горячую воду, или держа предъ огнемъ до полѣ, пока боль перестанетъ, или прикладывая разныя весьма холодные вещи, какъ то: ледъ, холодную воду, по поламъ съ уксусомъ смѣшанную, кислое шѣсто и квасную гущу, или свинцовую воду подъ № 18, до разрѣшенія опухоли, жара, боли и краснощы.

По новѣйшимъ наблюденіямъ хлопчаща бумага оказываетъ ошмѣнную пользу во всѣхъ видахъ и степеняхъ ожоги. Способъ употребленія ея весьма простой и состоитъ въ одномъ скоромъ приложеніи послѣ случившагося зла на ожженное мѣсто.

Пользу сего средства я самъ испыпалъ

въ слѣдующемъ случаѣ: одинъ Аршиллериенъ, споявшій предъ огнемъ, надъ коимъ висѣлъ кошель съ кипячею жидкостью, вдругъ пораженъ былъ припадкомъ падучей болѣзни и упавши прямо на кошелъ, опрокинулся на себя половину содержащейся въ немъ жидкости. За неимѣніемъ другихъ средствъ, приложено было къ наиболѣе обвареннымъ частямъ хлопчатая бумага и чрезъ два часа, пока привезли его въ лазаретъ, не оказалось на шѣхъ мѣстахъ, гдѣ была хлопчатая бумага, ни боли, ни жару, а только умрѣнная красноша; напрощивъ шого другія мѣста, къ коимъ не доспавало приложивъ бумаги, поражены были жестокимъ воспаленіемъ и покрылись пузырями.

2) Во впорой спепени весьма полезно употреблять смягчающія средства, какъ шо: молоко, сливки, всѣ выжатыя масла, прохладжающіе листья расщепленій, мыльную пѣну, или медъ, либо составляемую слѣдующимъ образомъ мазь: возьми свѣжаго льнянаго масла одинъ фунтъ, свинцоваго уксусу (No 17) девять ложекъ, нашапыря поллона, мѣшай въ глиняной плошкѣ деревянною лопаткою до шѣхъ поръ, пока онъя превращаишся въ мазь.

По укрошеніи припадковъ, пузырки, образующіеся въ сей спепени ожоги, слѣдуетъ вскрыть небольшими отверстіями; однако прежде укрошенія при-

падковъ, вскрышіе шаковое можешъ оже-
спочишиъ боль.

Если кожица во многихъ мѣстахъ поднимается въ пузырки, шо для оправ-
щенія совершенного оной опдѣленія, дол-
жно покрытие ее флеромъ или подобною
машеріею. На обнаженную поверхность
кожи, по окончаніи воспаленія, весьма
хорошо, для скорѣйшаго образованія но-
вой кожицы, насыпать тонкій порошокъ
муки или крахмала.

3) Въ трешей спепени, для восстанов-
ленія попперянной чувствительности,
должно смазывать опаленное мѣсто два
раза въ супки скипидаромъ, или нефпью,
а за неимѣніемъ оныхъ, и чистымъ бе-
резовымъ дегтемъ. Если же чувстви-
тельность въ ономъ мѣстѣ совершенно
испредблена будеть, шо взявъ комокъ
кислаго ржанаго пѣсча, величиною въ
гусиное яйцо и одинъ лопть мѣлу, спер-
шаго въ порошокъ, смѣшать вмѣстѣ и
приложишиъ къ спраждущему мѣсту.
Смѣсь сю надобно продолжашь, прикла-
дывая въ сушки шри или четыре раза
до шѣхъ поръ, пока безчувственная
часть, начинающая уже гнить, отъ здо-
ровыхъ опдѣлишся. Буде же си сред-
ства окажутся недѣйствительными для
излѣченія трепѣй спепени ожоги, шо
для доспавленія больному надлежащей
помощи, нужно прибѣгнуть къ врачу.

О т з н о в ъ.

§ 253.

Опзнобомъ называється по состояніе, кошорое происходить отъ сильнодѣй-
ствующей спужи и оказывается измѣ-
неніемъ естественнаго цвѣта и умень-
шеніемъ, или совершеннымъ уничтожені-
емъ теплоты, движенія и чувствитель-
ности пораженной части.

Я в л е н і я.

Сперва опзнобленный членъ оказывается чувствительное напряженіе и боль, краснеетъ и распухаетъ, попомъ блѣднѣетъ, дѣлается неудободвижимымъ и нечувствительнымъ, и по прошествіи нѣко-
тораго времени, если не будешь подано должное вспомоществование, цѣпенѣетъ и принимается синій или черный цвѣтъ. Сie наиболѣе случается у шѣхъ, кои по незнанію худыхъ послѣдователей, нагрѣвають около огня опзнобленный членъ, или ложатся въ теплое мѣсто, ожидая получить отъ этого облегченіе.

Лѣченіе.

§ 254.

Лѣченіе опзнобленныхъ членовъ такъ располагаешь должно, чтобы произведеніе

Ч а с т ь I.

31

живопшной теплопы постепенно возвышалось и соразмерно сему сила частей оживлялась.

Чѣмъ больше степень опьянобленія, чѣмъ оспорожнѣе и долѣе надлежишъ занимашся искусственнымъ опогрѣваніемъ.

По сему опьянобомъ пораженный членъ, безъ всякаго оплагательства, надобно налипашъ снѣгомъ или спавиши въ самую холодную замерзающую воду, въ которой должно его держашь до развишия напуральной въ немъ теплопы и чувствительности, безпресстанно поддерживая степень холода прибавленіемъ новаго количества воды, закрывая сосудъ и весь членъ, въ немъ находящійся, а чѣмъ защищая его отъ влиянія наружнаго воздуха, или производя все сie въ холодной горницѣ. При семъ образующіяся вокругъ члена льдяныя корки надлежишъ отнимашъ съ оспорожнѣю; доспигши первого намѣренія, членъ вынуши изъ воды и продолжашь еще преніе снѣгомъ и солью. Попомъ покрывашъ мягкою холщинкою, намоченою уксусомъ, либо растворомъ камфоры въ хлѣбномъ винѣ, или смачивашъ скпицидаромъ, либо нефпью, либо чистымъ березовымъ дегтемъ. Сie должно повторять до тѣхъ поръ, пока движение и чувствительность возвращающа.

Если же опьянобъ случишишѧ же-

спокъ, чио движенія и чувствительности сказаннымъ образомъ возвращишъ уже не лъзя и на ономъ появляешся черный цвѣшъ, въ то время, сдѣлавъ на кожѣ нарѣзцы бришвою или ножемъ, должно прикладывашь кислое шѣсто съ мѣломъ, спершымъ въ порошокъ, наблюдавъ все то, чио сказано при ожогѣ (§ 252 подъ 3). (О способѣ, какъ поступашь должно при всеобщемъ опѣнблении шѣла, то есть: когда все шѣло отъ спужи оцѣпенѣещъ или замерзнешъ, предложено выше, смотрѣ § 204).

Свѣжія раны.

§ 255.

Свѣжею раною называемся разрушение цѣлосты шѣлеснаго соспава, причиненное ударами и другими разнаго рода насилиями, либо острыми орудіями и сопровождаемое болью, кровопеченьемъ, воспаленіемъ и нагноеніемъ.

Явленія.

Сперва чувствуешь спраждущій въ причиненной ранѣ боль, сопровождаемую кровопеченьемъ, которая, постепенно увеличиваясь, причиняешь ему иногда большее или меньшее беспокойство. Кровь



мало по малу унимается, спаившися
жиже и наконецъ одна шокмо сукровица
выступаетъ изъ поверхности раны.

По прошествіи нѣкотораго времени,
края раны распухаютъ, краснеютъ и
при этомъ оказывается въ пѣлѣ, особли-
во въ ночное время, жаръ. По испеченіи
нѣсколькихъ дней, рана начинаетъ не-
много увлажняться и мало по малу обра-
щающаяся въ совершенное нагноеніе, умень-
шающее боль, опухоль, жаръ и красноту.

Лѣчение.

§ 256.

Главный предметъ лѣченія свѣжихъ
ранъ сосипоитъ: 1) въ остановленіи кро-
вопеченія; 2) въ обмовеніи и очищеніи
раны; 3) въ соединеніи ея краевъ и 4) въ
заживленіи оныхъ.

1) Умѣренное кровопеченіе, особенно
изъ обширныхъ ранъ, вредно быть не мо-
жетъ. Оно большою частію, по проше-
ствіи нѣкотораго времени, само собою
останавливается. Большое же, оно ког-
тораго обыкновенно болѣй ослабѣваетъ,
надлежитъ остановить въ неукосни-
тельномъ времени, поступая такимъ
образомъ: на то мѣсто раны, изъ коего
спремышельно выпекается кровь, надобно
приложить одинъ или два кусочка берез-
ового прута, рану наполнишь мягкою

корпію (нипочками, надерганными изъ холстинной вепши) и, покрывъ оную холстяными шряпками, свернувшими вчешверо, обвить спраждущій членъ, прижимая умѣренно полошенцомъ, или приспойною для шаковыхъ случаевъ повязкою, отъ чего кровоотечеиіе въ не-продолжительномъ времени прекращаеи-ся.

2) Прекративъ кровоотечеиіе, если спра-жущаго беспокоитъ сильная боль, должно спустя три часа, отнявъ перевязку и вы-мыть запекшуюся между краями раны кровь теплую водою; попомъ, омочивъ въ послюное масло персть, ощупать оную для узнанія, не имѣется ли въ оной ка-кихъ либо постороннихъ шѣль, какъ то: кусочковъ дерева, спекла или пласти. Если сіи сысканы будуть, то оные над-лежитъ вынуть.

3) Очистивши и ѿмывши края раны, надлежитъ соединить ихъ липкимъ пла-спыремъ, сославляемымъ по предложен-ному подъ № 19 способу, намазаннымъ на холстъ и нарѣзаннымъ кусочками, подобными ленпочкамъ. Попомъ ома-спивъ корпію мазью, приготовленную изъ яичнаго желтка, льняного масла и чистаго меду, приложиши на края раны и, покрывъ холстинными шряпками, об-вить членъ повязкою.

Если больной послѣ первой перевязки не жалуешься на сильную боль, а только

чувствуешь обыкновенную, каковая всегда случается при ранахъ; въ то время первую перевязку оставишь должно до тѣхъ пять (на 3 дни), пока не послѣдуешь нагноенія въ ранѣ. А коль скоро сквозь перевязку начнешь шечь гной, то должно ону снять, рану очистишь, членъ теплою водою омыши и опять шаковымъ же порядкомъ, какъ выше показано было, перевязашь ону.

Соединеніе краевъ раны липкимъ пластиремъ и ежедневное прикладываніе мягчишельной мази продолжашь должно дошолъ, пока не окажется гуспый и бѣлый гной; а коль скоро перемѣна гноя послѣдуешь, то должно оставишь мазь, прикладывашь на рану одинъ разъ въ сушки только корпію, приготовленную изъ самыхъ мягкихъ холщевыхъ ветошекъ; поелику шакового качествава гной есть самое благопврное средство, способствующее нарощенію мясного существа, прояженію отъ всей окружности кожи и совершенному ея заживленію.

Не рѣдко случается, что у людей, кои изнурили жизненные свои силы, а напаче у страждущихъ хроническими болѣзнями, какъ то: цынгою, ломотою, чесоткою и проч., по прошествіи нѣсколькихъ дней, вмѣсто гуспаго и бѣлаго, начинаешь вытекать изъ раны жидкой вонючей и пришомъ желтаго, зеленаго, или черноватаго цвѣта гной. Та-

ковое качествъ гноя доказываетъ, что свѣжая рана превратилась въ гноеватую рану или язву, коей лѣченіе, смонтири
II часпь.

Если въ продолженіи лѣченія обыкновенная боль усиливается и крайне будешь беспокоить болѣщаго, тогда для утоленія оной надобно прикладывать сверхъ перевязки, теплую, яичную, или овсянную, на молокѣ сваренную, или съ поспѣшимъ масломъ смѣшанную кашу; а буде около раны окажется синяя, или багровая опухоль, случающаяся обыкновенно при ранахъ, ушибами причиненныхъ, то прикладывать на оную вчепившую сложенную вешишку, омоченную въ хлѣбномъ винѣ, смѣшанномъ по поламъ съ проспѣшимъ уксусомъ, перемѣняя, когда высохнешь, и продолжая до тѣхъ поръ, пока опухоль исчезнетъ.

ОБЪ ОТРАВЛЕНИЯХЪ РАЗЛИЧНАГО РОДА ЯДАМИ.

§ 257.

Отравлениемъ называемся по болѣзниное состояніе, которое рождається отъ восприятія въ тѣло какого либо ядовитаго вещества.

Явленія.

Явленія и признаки, изъ коихъ вообще можно съ вѣроятностю заключать объ отравлении человѣка какимъ либо ядомъ, суть слѣдующіе: прошивный гнилой запахъ; различный, кислый, щелочной, осирой, смягчивающій или горькой вкусъ; жжение въ глошкѣ и желудкѣ, сухость во всѣхъ частяхъ полоски рта; чувствование сжатія въ горлѣ, иногда синій, а иногда желтый, бѣлый, красный или черный цвѣтъ языка и десенъ, болѣе или менѣе сильные боли во всемъ проспрансивѣ пищепріемнаго канала, особенно въ глошкѣ, въ желудочной споронѣ и нѣкоторыхъ частяхъ брюха; смрадное дыханіе, ча-

спая опрыжка, пошноша; болѣзненная, слизисшая, желчная, или кровавая рвота; вещеспвомъ бѣлаго, желтаго, зеленаго, синяго, краснаго или черноватаго цвѣта, кошорое производишь во рту различное чувствование, иногда вскипаешь на мраморной плишкѣ, и въ шакомъ случаѣ окрашиваешь насѣйку подсолнечника, или не оказываетъ никакого дѣйствія на мраморную плишку, но синій фіалковый соѣ перемѣняешь въ зеленый; при семъ также бываешь икота, запоръ, либо поносъ, цвѣтомъ и свойствомъ различный, подобно машеріи, извергаемой рвотою; шрудное дыханіе, шоска, болѣе или менѣе ушомицельный кашель, частое, малое, скаплющее неправильное, не рѣдко едва ощущипельное или большое и правильное жилобіеніе, жгучая жажда; принятое внутрь питье умножаетъ боли и въ скоромъ времени извергаешься рвотою; временемъ оказывается лихорадочный ознобъ, кожа и нижнія конечности дѣлаются лѣдяно-холодными, иногда однакожъ бывающъ чрезмѣрно горячи; на шѣль появляется сыпь, соединенная съ болью, холодный и клейкий пошъ, шрудное и рѣдкое испражненіе мочи, сопряженное съ жженіемъ.

Физіогномія въ начальѣ мало измѣняется, но вскорѣ попомъ цвѣть лица дѣлается блѣднымъ; зрѣніе и слухъ шеряются; глаза не рѣдко краснѣютъ и вы-

дающія къ наружѣ; глазной зрачекъ разширяющіяся, болѣй сильно беспокоющіяся, издающія пронзительный крикъ, не можащія лежащія на одномъ мѣстѣ, впадающія въ яростный бредъ; обнаруживающіяся судорожные движения въ лицѣ, челюстяхъ и конечностяхъ, попомъ ужасная корчи, оцепенѣніе членовъ, иногда онѣменіе, шатаніе въ головѣ, сонливость, сначала легкая, а попомъ непробудимая; головокруженіе, параличъ, величайшая слабость нижнихъ конечностей и брюха; состояніе, сходшющее съ поспрѣломъ; чрезвычайное ослабленіе силъ, измѣненіе голоса, упорное и весьма болѣзненное напряженіе уда.

Весьма часто упомянутые припадки, если не подано будеши надлежащей помощи, возрасшающіе въ силѣ и степени своей отъ минуты появленія ихъ до самой смерти; впрочемъ бывающіе случаи, въ коихъ припадки сіи совершенно прекращаются и попомъ чрезъ нѣсколько времени снова появляются.

Лѣченіе отравленій.

§ 258.

При лѣченіи отравленій необходимо смотрѣть на два главныхъ обстоятельства: 1) Если ядъ поглощенъ недавно и находился въ пищеварительномъ

каналъ, шо, сколько возможно, надлежитъ воспящашь дѣйствію онаго, испражняя его рвотою или низомъ, либо соединяя его съ шакимъ веществомъ, которое можетъ уничтожашь ядовитыя его свойства. Досшигши сей цѣли, надлежиши лѣчишь припадки, причиненные поглощеннымъ ядомъ. 2) Если ядъ поглощенъ давно, рвота и поносъ были и ядовитое вещество совершенно извержено; шо все еще жизнь больнаго можетъ подвергнуться опасности, если въ семъ случаѣ не дѣйствовашь пропиву яда и не воспящашь распространенію болѣзни различными общими средствами.

Въ первомъ періодѣ, т. е. въ самомъ началѣ болѣзни, должно освободиши больнаго отъ поглощенаго ядовитаго вещества: ибо, если оно продолжаетъ дѣйствовать на пищеварительный каналъ, то припадки возрасшущъ до высшей степени, и употребленныя средства едавши произведутъ желаемыя дѣйствія. Воспящашь дѣйствію ядовъ на пище-пріемный каналъ имѣющеся два средства: первое состоишь въ изверженіи оныхъ рвотою, или испражненіемъ низа; второе въ приведеніи ихъ въ неушральное со-стояніе, въ кошоромъ они не могутъ оказывать опустошительныхъ дѣйствій на шѣло наше. Для первого попробны шакъ называемыя испразнительныя, а для втораго противцѣядныя средства.

Испразнительные средства.

§ 259.

Сюда относятся: 1) рвотные лъкарства, даваемые въ оправлениі для произведенія рвоты: одни супъ настоящія рвотные, какъ то: бѣлой купоросъ и мѣдный синій купоросъ, которые употребляются покмо шогда, когда принятые внутрь яды не раздражающіе, оглушающіе, большою частию расшищельные, кои, усыпля дѣятельность желудка и кишечка, не производяще ни рвоты, ни испражненія низомъ; другія супъ водянистые, слизистые, смягчительные, какъ то: теплое разведенное молоко и проч. производящія рвоту отъ растяженія ими и побужденія къ сокращенію оболочекъ желудка. Сіи послѣднія предписываемыя въ оправленияхъ раздражающими, осѣрыми, Ѣдкими, большою частию минеральными ядами, кои, возбуждая сильно дѣятельность желудка и кишечка, производяющія сами по себѣ рвоту или поносъ, и въ такомъ случаѣ употребленіе сильныхъ вышеупомянутыхъ рвотныхъ весьма опасно.

2) Слабительные средства даются покмо шогда, если по оправлениі прошло довольно времени и ядъ изъ желудка перешелъ въ кишки, также шогда, когда поглощенный ядъ причиняешь упорный

запоръ на низъ, напримѣръ: свинцовый сахаръ и другія оглушающія распненія. Въ первомъ случаѣ весьма хорошо дѣйствующіе клещевидное маѣло, а въ послѣднемъ разныя соли, какъ и то: горькая Английская соль, Глауберрова или Сибирская и Аспраханская соль отъ двухъ до трехъ лоповъ на приемъ въ стаканъ воды. Лѣкарства сіи предписываюся также и въ промывательныхъ.

Противуядныя средства.

§ 240.

Симъ именемъ называються шакія вещества, кои могутъ разлагать яды въ жидкому или твердому состояніи, либо соединяясь съ ними пакимъ образомъ, что произшедшій отъ того продувки не оказываетъ никакого опускашельнаго дѣйствія на живое тѣло. Сіи вещества могутъ быть принимаемы въ большомъ количествѣ безъ опасности. Главные пропикуядныя средства сушъ: яичный блокъ, молоко, слабой настѣй терпильныхъ орговъ, растворъ Глауберовой соли, горькой Английской или Сибирской соли и простой поваренной соли, жженая магнезія, растворъ мыла и проч.

Способъ употребленія, приемъ и назначение, пропивъ какого именно лада могутъ быть даваемы сіи средства, пред-

ложены будушъ при описаніи оправлений въ особенности.

Во второмъ періодѣ оправлений, т. е. по прошествіи нарочитаго времени послѣ введенія яда въ пищепріемный каналъ, если ядовиное вещество совершило извержено было рвотою или испражненіемъ низа, то вовсе не нужно употреблять прошивуидныхъ или рвотныхъ средствъ, могущихъ быть во многихъ случаяхъ вредными, а должно пищательно изслѣдований состояніе оправленной особы, если окажутся признаки воспаленія желудка, т. е. жестокія боли въ желудочной спиронѣ и брюха, и болѣе или менѣе сильная горячка и проч., то должно поступать такъ, какъ показано при воспаленіи желудка, смотр. § 95.

Раздѣление ядовъ.

§ 241.

Всѣ извѣстные яды можно раздѣлить на при главныхъ класса:

- 1) На острые яды.
- 2) На одуряющіе или наркотические и
- 3) На остро-наркотические яды.

Первыми называющія шѣ, кои производяще воспаленіе въ прикасающихся къ нимъ частяхъ; вторые суть шѣ, кои одуряющіе, т. е. производяще припупленіе чувствъ, опьяненіе, сонливость, бѣснова-

шый бредъ и проч. *Третie сушь шакіе, коихъ дѣйствіе соспощиша изъ обѣихъ предъидущихъ.*

I. Острые яды.

§ 242.

- a) Мышьякъ белый.
- b) —— желтый или оперменитъ.
- c) —— красный или реалгаръ.

Притадки отравленія.

Признаки отравленія мышьякомъ сушь: острый вкусъ, жжение въ глошкѣ и пищепріемномъ горлѣ, за коими вскорѣ оказывается тошнота и сильная рвота съ изверженіемъ всего содеримаго въ желудкѣ, попомъ извергающаяся пѣнистая, шемная, часпо съ кровью смѣщанная мокрота. Большой погружающейся въ чрезмѣрную слабость, чувствуешьъ несносную тошку, сопряженную съ безпрерывною икою, сильнымъ слюноотечениемъ, воюющимъ запахомъ изо рта и обмороками. При семъ оказывается жжение въ предсердіи, палиящій жаръ въ желудочной споронѣ и нестерпимая боль въ желудкѣ. Пульсъ бываетъ неправильный, малый и частный; чувствуешься біеніе сердца и несносная жажда; лице измѣняется и краснеешь; окружность глазъ и губъ си-

нѣеть; дыханіе дѣлается скрѣе и короче; по всему тѣлу выступаешь холодный потъ; испражненія низомъ бывающіе частыя, чернаго цвѣта и смраднаго запаха; урина опадающая въ маломъ количествѣ, краснаго цвѣта и часто смѣшанная съ кровью. За сими припадками слѣдующіе сильныя корчи, холода всего тѣла и наконецъ самая смерть.

Лечіе.

§ 245.

1) Во первыхъ, какъ можно скрѣе надлежитъ произвести рвоту и вспомоществовать изверженію всего содержимаго въ желудкѣ. На сей конецъ нужно давать въ большихъ приемахъ теплое молоко, теплую или холодную воду, ошварь льняныхъ сѣянъ, сахарную воду, сѣянинное молоко, также деревянное, орѣховое, маковое, льняное, конопляное масло и распиворъ мыла.

Если мышьякъ принялъ внутрь въ распиворѣ, то большую пользу приноситъ мѣль, растворенный въ водѣ, или извесковая вода, приготовленная слѣдующимъ образомъ: взять поллоша Ѣдкой извески, облипъ ее четырьмя бутылками воды, пошомъ по прошествіи 5 или 6 минутъ, процѣдинъ чрезъ холстинку и, смѣшивъ по поламъ съ сахар-

ною водою, давашь пить больному черезъ чеыре часа по полспакана.

Всѣ прочія пропивуядныя средства, какъ то: угольный порошокъ, уксусъ, крѣпкій кофе и многія другія мало приносящъ пользы.

2) Если по употребленіи предложеныхъ здѣсь средствъ, припадки болѣзни не умалляются и еще ожесточаются, когда боли въ брюхѣ очень сильныя, обнаруживается горячка и судороги: то надлежитъ вообще поспупашь шакъ, какъ предложено при воспаленіи желудка и кишекъ (см.пр. § 95). Сверхъ сего можно прикладывать къ брюху обмачиваемую въ шелковый опварь льняныхъ сѣмянъ или просвирничаго корня холстинку, или еще лучше, сажать больнаго на нѣсколько времени въ шелковую ванну. Когда чрезъ сie не произойдетъ въ скоромъ времени значительного облегченія, то должно припустить къ болѣющей части брюха опъ 12 до 15 піявокъ и открыть кровь изъ руки. Если по приложении піявокъ, мѣстная боль исчезнетъ и окажется опять въ другомъ мѣстѣ, то нужно поспась на семъ послѣднемъ вновь употребить то же самое число піявокъ, продолжая до тѣхъ поръ, пока боли исчезнутъ и не опасаешься ни мало потерять крови; ибо успѣшное исцѣленіе больнаго зависитъ въ семъ случаѣ опъ испражненія дной.

Внутрь давали ошварь льняныхъ съмянъ, или проскурничаго корня, запрещаюю пищу, даже супы.

Если обнаруживаются судороги, то взявъ три или четыре маковыхъ головокъ и сваривъ ихъ въ продолженіи четверти часа въ одной съ половиною бутылкѣ воды и прибавивъ по помѣръ два или три померанцовыхъ листа и блюшовъ сахару, давать пить прѣплю часинъ сего количества чрезъ полчаса.

Когда по уничтоженіи припадковъ оправленія, горячка почти совершенно пройдешь, то можно позволить больному соусъ, приготовленный изъ телятины или цыплятины; а при наступающемъ выздоровленіи оканчивающемся лѣченіе употребленіемъ ошвара ячной и овсяной крупы, киселя, приготовляемаго изъ картофельного крахмала, спудени, жирныхъ суповъ и проч., избѣгая пшенично-шурбовой пищи, вина и спиртныхъ напитковъ, кои раздражаютъ желудокъ и снова могутъ произвести воспаленіе.

II. Ртутные или меркуриальные составы.

§ 244.

- a) Ёдкая сулима.
- b) Красная осадочная ртути.
- c) Сладкая ртути.
- d) Киноварь.
- e) Неаполишанская мазь и проч.

Припадки отравленія.

Онгъ малыхъ пріемовъ какого либо изъ сихъ сосставовъ дѣлаеется непріятный запахъ изо рту, опухоль десенъ и другихъ частей рта, болѣе или менѣе сильное слюношеченіе и непріятный вкусъ во рту; опь большихъ же пріемовъ оправленныя особы чувствующъ ъдкій металлическій вкусъ, сильное сжиманіе и жженіе въ глоткѣ и желудкѣ, неупоми-мую жажду, безпрерывныя отрыжки и тошноту; обнаруживающаяся кровавая рвота и шаковой же поносъ, сильное слюно-шеченіе, вонючій запахъ изо рта, краснота и опухоль лица, блескящіе глаза, засохшія и распрескнувшія губы, надут-тоспъ живота, малый, крѣпкій и скорый пульсъ, палящій жаръ въ кожѣ, задержаніе мочи, чрезмѣрная слабость, обмороки, трудное дыханіе, судороги и холодный потъ, наклонность ко сну, безчувствіе, корчи и смерть.

Неаполипанская или сѣрая ртушная мазь, которую часто впираюшъ въ голову и другія части тѣла для исцѣбленія вшей, невсегда безопасна, и опыты показываютъ, что въ нѣкошорыхъ случа-яхъ, при большомъ количествѣ впершой мази, долгопродолжительномъ впи-раніи и очень нѣжной кожѣ, обнаружива-ються многіе припадки оправленія.

Л ъ ч е н і е.

§ 245.

Если кшо отправленъ будеши какимъ либо изъ вышеупомянутыхъ ядовъ, то соединивъ бѣлки изъ 12 или 15 яицъ съ четырьмя бузылками холодной воды, давашь чрезъ 2 или 5 минуты по чайной чашкѣ, пока воспослѣдуешь рвота. За неимѣніемъ яицъ, можно давашь клейстеръ, сваренный изъ пшеничной или ржаной муки и разведенный водою, либо соединенный съ десертю долею мыла, также теплое молоко, ошварь изъ льняныхъ съмянъ, просвирокъ, мясной бульонъ, сахарную воду, либо чистую теплую воду для произведенія рвоты.

Если по принятіи означенаго количества яичныхъ бѣлковъ, рвота и прочіе припадки значительно не уменьшились, то должно снова приготовить такое же количество и употреблять по прежнему. Рвотѣ можно здѣсь споспѣшествовать вкладываніемъ перспа въ глошку, или щекопаніемъ оной посредствомъ пера, оваженнаго масломъ.

Послѣ сего надлежитъ поспупашь съ больнымъ такъ, какъ предложено при лѣченіи отправленія мышьякомъ (§ 245, подъ № 2).

III. Составы изъ мѣди.

§ 246.

- а) Мѣдный или синій купоросъ.
- б) Ярь мѣдянка.
- с) Зеленая мѣдная руда, малахиитъ и пр. сосп.

Оправлениѣ мѣдными сошпавами рѣдко производится злоумышленно, а болѣею частію происходитъ оно безъ намѣренія опѣ мѣдныхъ худо положенныхъ сосудовъ, въ коихъ приготавляется и часпо даже сберегается пища.

Припадки отравленія.

Признаки отравленія сими ядами суть: оспрытый, мѣдный, весьма ощущаемый вяжущій вкусъ, сухость и спягивание языка, скиманіе глотки, часпымъ, мѣдью опѣзывающіяся, опрыжки, безпрерывное слюнотеченіе, шошина и часпая рвота или позывъ на оную; рѣзь съ болью и нестерпимая колика въ животѣ, часпия испражненія низомъ, соединенные иногда съ кровью, жиленіемъ и болью въ кишкахъ, малоколичественное опѣленіе мочи, раздутие живота и боль при дошрогиваніи онаго; скорый, малый, неправильный и сжатый пульсъ, трудное и слабое дыханіе, бѣніе сердца, нестерпимая жажда, головная боль, хо-

лодный попъ по всему тѣлу, обмороки, изнеможеніе силъ, слабость во всѣхъ членахъ, судороги, корчи и наконецъ самая смерть.

Впрочемъ не у всякаго оправленнаго человѣка оказываются всѣ сіи припадки; но сильная рвота и колика всегда находятся.

Лѣченіе.

§ 247.

При оправлениі сими ядами надлежитъ сколько возможно скорѣе произвести рвоту, употребленіемъ въ большихъ приемахъ теплого молока, либо сбившаго въ пѣну личнаго бѣлка, соединеннаго съ водою, или мыльной воды, или наконецъ употребленіемъ въ большомъ количествѣ сахара, распущенаго въ теплой водѣ, обыкновенномъ чаѣ, кофе, дубовомъ или иевовомъ ошварѣ. Произведши рвоту и испразнившися ядъ, поспушать шакъ, какъ показано при лѣченіи оправлениія мышьякомъ (смощ. § 243, подъ № 2).

Примѣтаніе 1. Кушанья, варимыя въ худо полуженной мѣдной посудѣ, хотя и не имѣютъ иногда зеленаго цвѣта, но содержашь въ себѣ растворъ мѣди и могутъ быти отравою.

Распворенную въ шакомъ случаѣ мѣдь можно узнать изъ того, если въ подо-

зрѣваемое кушанье или отваръ упомянутыхъ вещей, положенный на нѣсколько времени желѣзный, хорошо выполированный ножъ, покрывающій зеленоватымъ или красноватымъ веществомъ, которое при полировкѣ получаешь наспоящій цвѣтъ мѣди.

Примѣтаніе 2. Нѣкошорыя кушанья по-
гда особливо похваляються, когда они
имѣютъ пріятный зеленый цвѣтъ, на-
примѣръ: соленые огурцы, бобы и проч.
Такъ какъ вещи сіи часпо бывающіе въ
продажѣ, то продавцы варятъ ихъ въ
уксусѣ, въ мѣдной посудѣ, для приданія
имъ зеленаго цвѣта. Опѣчь чего дѣлаю-
тся они сильно ядовитыми и произво-
дяще жеспочайшіе припадки оправленія
мѣдью.

IV. Составы изъ свинца.

§ 248.

- a) Свинцовыи или Сапурновъ сахаръ.
- b) Свинцовыя бѣлила.
- c) Массикоппъ или свинцовая извѣстка.
- d) Свинцовыи глеши.
- e) Подслащенный свинцовыи сахаромъ,
или глеши вина.

Если поглощенъ будешъ разомъ нарочито большой приемъ свинцового сахара или другаго какого либо въ водѣ рас-

швореннаого свинцового соспава, то обнаруживающіе слѣдующіе

Припадки отравленія.

Сладко-спягивающій мешаллическій вкусъ, сухость во рту, безпрерывная жажда, опрыжки, шошнота, рвота жидкостью зеленоватаго или черноватаго цвѣта и горькаго вкуса, сжатіе горла, болѣзненное вспинутіе живота внутрь, же спокая перемежающаѧся колика, наиболѣе около пупка и уменьшеніе боли отъ прижатія живота, которая иногда отъ легкаго прикосновенія увеличивающаѧся; судороги и одышка. Сильный запоръ со спавляющій ощущеніемъ признакъ сей оправы, впрочемъ не рѣдко случается поносъ. Пульсъ чаше бывающій правильный; моча отдаляющаяся въ маломъ количествѣ; испражненіе низомъ желтаго цвѣта, сухое, капышиками, на подобіе овечьяго помета; обмороки, подергиваніе членовъ, непомѣрная слабость и смерть.

Отъ малыхъ же пріемовъ бывающъ едва примѣнны припадки, сопояющіе въ шошнотѣ, вспягиваніи живота внутрь, запорахъ и изнуришельной лихорадкѣ.

Медленное оправление чаше случается отъ поддѣланыхъ винъ, свинцовыхъ трубъ, свинцовой посуды и олова, смѣшанного со свинцомъ и употребляемаго для луженія. Художники, фабриканты

и ремесленники чаше подвергаются сей оправѣ опѣ свинцовыхъ паровъ.

Лѣченіе.

§ 249.

Взявъ двѣ споловыя ложки Глаубер-вой, Астраханской или Сибирской горькой соли, надлежитъ распворить въ бу-шылкѣ теплой воды и давать по полу-винѣ чайной чашки чрезъ 15 минутъ, пока воспослѣдуешь рвота или испражненіе низомъ. За неимѣніемъ сихъ солей, можно употребиши съ одинаковою пользою поваренную соль, распущенную въ водѣ или огуречный разсолъ, либо мыльную воду и посовѣтавшися съ врачемъ.

Пропивъ осипавшихся запоровъ нужно принимать опѣ одного съ половиною до двухъ лоповъ упомянутыхъ солей и дѣлать слѣдующіе промывательные или клистиры. Взять одинъ лопъ Астраханской или Сибирской соли, распворить въ полуфунтѣ ромашковаго наспоя и прибавивъ три споловыхъ ложки льнянаго масла, употреблять разомъ.

IV. Крѣпкія кислоты.

§ 250.

- Купоросное масло (сѣрная кислота).
- Крѣпкая водка (разведенная селипрен-ная кислота).
- Царская водка (селипренно-соляная ки-слота) и всѣ прочія кислоты.

Пріпадки отравленія.

Кислый, вяжущій, жгучій вкусъ во рту и палящій жаръ въ глошкѣ и пищепріемномъ каналь; жестокая боль въ желудкѣ и кишкахъ, неукропимая рвота, судороги лица и шрясеніе губъ, чувствіо какъ бы разширенія пораженныхъ частей; жестокая боль и судороги въ груди, воспіявшее глошаніе, трудное дыханіе, малый, неправильный перемежающійся судорожный пульсъ, сильная жажды, которая не только не утоляешься питьемъ, но еще болѣе ожесточаешь боли; часное, съ кровью смѣшанное, испражненіе низомъ, задержаніе мочи, холода по всему тѣлу и липкій попѣтъ кожи, непомѣрная слабость, измѣненный видъ лица, судороги и смерть.

Извергаемая рвотою матерія имѣетъ либо темный, либо изъ желта-зеленоватый цветъ и особенный кислопамъ свойственный запахъ, при нагреваніи испускаешь прозрачные бурые или белые пары; синіе соки расщеплій, какъ то: Лакмусову настойку, синіе васильковые цветы и проч. мгновенно окрашиваешь въ красный цветъ, а на мраморной плиске и на мылу вскипаешь.

Лѣченіе.

§ 251.

Весь успѣхъ лѣченія зависитъ здѣсь

опъ возможно-скораго употребленія пропикуядныхъ средствъ. Самое лучшее средство составляешь здѣсь жженая, или бѣлая магнезія, коей два лопа надлежишъ развести въ двухъ бузылкахъ теплой воды и давашь больному по половинѣ чайной чашки чрезъ двѣ минуты, пока кислона пришупится и не будешъ вскипать съ мѣломъ. При недоспашкѣ сего средства можно замѣнишъ оное спертымъ мѣломъ, коего чайную чашку можно смѣшать съ бузылкою теплой воды и давашь такимъ же образомъ, какъ магнезію. Либо взять кусокъ мыла, величиною въ куриное яйцо (два лопа), распустивши въ бузылкѣ теплой воды и давашь чрезъ три минуты по половинѣ чайной чашки, пока воспослѣдуешь рвота, не вскипающая съ мѣломъ, или двѣ горстки печной золы смѣшать съ бузылкою теплой воды и давашь такимъ же образомъ, какъ и мыльную воду. Для скорѣйшаго произведенія рвоты можно щекопашть въ горлѣ перышкомъ, намазаннымъ масломъ.

Послѣ испражненія или пришупленія яда надлежишъ давашь слизистыя, масляныя и обволакивающія средства, поступая совершенно такъ, какъ показано при лѣченіи оправленія мышьякомъ (см. § 243, подъ № 2).

VI. Щелочки.

§ 252.

- а) Пепашъ или кали.
- б) Сода или напиръ.
- с) Лѣпучая щелочь или аммоніакъ (нюхательный спиртъ).

Припадки.

Острый, мочевый и ъдкій вкусъ, сильный жаръ въ глошкѣ, непомѣрная жажда, тошноша и неукропимая рвота, желтою или зеленою мазеріею, соединенною часто съ кровіс, копорая синія краски распеній, напримѣръ: синій фіалковый цвѣтъ окрашиваєть зеленымъ и вскипаєть съ кислотами; жестокая боль въ желудкѣ и несперимимая колика въ кишкахъ, трудное дыханіе, неправильный пульсъ, частое испражненіе низомъ, смѣшанное не рѣдко съ кровью и выходящими клочками перепонокъ, задержаніе мочи, судороги, бредъ и смерть.

Лечение.

§ 253.

Немедленно надлежитъ давать смѣшанный по поламъ съ водою виноградный, фруктовый или пивный уксусъ, сначала двѣ чайныхъ чашки, а попомъ по одной

чашкѣ чрезъ три минуты, до послѣдованія рвоты магнитомъ, не перемѣняющею синяго цвѣта распеній въ зеленый и не вскипающею съ кислотами. За неимѣніемъ уксуса, можно давать кислое молоко или кислое пиво, либо кислый квасъ по кружкѣ до произведенія рвоты, или лучше клюквенный, либо брусничный сокъ, яблочный квасъ, сыворотъ и бураковый кислый сокъ, лимонный сокъ, смѣшанный съ водою и лимонадъ. Послѣ насыщенія щелочей кислотами, нужно давать слизистая и обволакивающая средства и постуپашь шакъ, какъ показано при лѣченіи оправленія мышьякомъ (смопр. § 243, подъ № 2).

VII. Шпанскія мушки.

§ 254.

- а) Порошокъ шпанскихъ мушекъ.
- б) Настойка оныхъ и пласпры,

Шпанскія мушки, будучи употребляемы снаружи въ несоразмѣромъ количествѣ, производяще, наипаче у весьма чувствительныхъ людей весьма непріятные припадки; но по принятіи ихъ въ большомъ количествѣ внутрь, что дѣлается даже иногда съ намѣреніемъ для возбужденія ослабленныхъ дѣпородныхъ частей, обнаруживающіе

Припадки.

Непріятный, удушающий запахъ, осен-
ный чрезвычайно пропивный вкусъ; жгу-
чий жаръ въ глошкѣ, желудкѣ и кишкахъ;
наклонность къ рвотѣ, частая и не рѣд-
ко кровавая рвота, учащенное испражне-
ніе на низъ, болѣе или менѣе смѣшанное
съ кровью; сильные боли въ брюхѣ, наи-
паче въ желудочной споронѣ; продолжи-
тельное и весьма болезненное напряже-
ніе дѣшевороднаго уда; жжение въ моче-
вомъ пузырѣ; очень затруднительное
испускание мочи, выпекающей иногда
только по каплямъ, а иногда совершенно
задержанной; кровавая моча. Пульсъ
бываєтъ скорый и твердый; глошаніе
въ нѣкоторыхъ случаяхъ невозможно для
больного, такъ чио поднесенные ему на-
шишки онъ съ отвращеніемъ опишалки-
ваешь; челюсти сжимаються. Наконецъ
появляються ужасныя судороги, съумаше-
шіе и самая смерть.

Лечіе.

§ 255.

Для произведенія рвоты попчасъ над-
лежитъ дать отравленному нѣсколько
спакановъ обыкновенной или лучше са-
харной воды, молока, отвара просвирокъ
или льняныхъ семянъ. Попомъ надле-

житъ обратиши къ лѣченію припадковъ, произведенныхъ ядомъ, какъ пока зано при лѣченіи отправленія мышьякомъ (смотр. § 243, подъ № 2). Сверхъ того надлежитъ впрыскивать въ мочевой пузырь посредствомъ сифончика ошварь льняныхъ сѣмянъ, или другое смягчающее и обволакивающее средство, для предупрежденія воспаленія въ ономъ. Если не смотря на сie, будеши продолжаться жженіе въ спиролѣ и трудное мочеиспускание, то нужно впереть на внутренней сторонѣ ляшекъ и ногъ четыре лопаты масла, въ копоромъ, помощію тепловши, расщворено поллоша камфоры. Внутрь должно дать 8 или 10 гранъ камфоры, расщершой съ яичнымъ желткомъ.

При отправленіи, произшедшемъ отъ наружнаго употребленія шпанскихъ мунекъ, не нужно возбуждать рвоты, а посадишь больнаго на чайверть часа въ теплую ванну, давашь черезъ пять минутъ полспакана сахарной воды и дѣлать вышеупомянутое вшираніе изъ масла и камфоры. Когда больной жалуєтся на сильныя боли въ животѣ и въ мочевомъ пузырѣ, то нужно припушшишь отъ 12 до 15 піявокъ къ болящему мѣсту и прикладывать ко всѣмъ больнымъ мѣстамъ обмакиваемую въ тепловашый ошварь льняныхъ сѣмянъ или просвирокъ холстинку.

VIII. ОСТРЫЯ ЯДОВИТЫЯ РАСТЕНИЯ.

§ 256.

- a) Чемерица (*Helleborus*).
- b) Борецъ, или люпинъ (*Aconitum*).
- c) Вѣтринница (*Anemone*).
- d) Жабникъ или ранункулъ острый (*Ranunculus*).
- e) Волчье лыко или ягодка лавруша (*Daphne*).
- f) Козацкой можжевельникъ (*I. Sabina*).
- g) Ломоносъ (*Clematis vitalba*).
- h) Молочай (*Erophobia*).
- i) Гумигутъ (*Gummi-guttae*).
- k) Переступинъ (*Bryonia*).
- l) Осенний цветъ (*Colchicum autumnale*)
и проч.

Пріпадки отравленія.

Острый жгучій, болѣе или менѣе Ѣдкій вкусъ, палящій жаръ, большая сухость языка и прочихъ частей рта, болезненное скиманіе глошкі, наклонноспль къ рвотѣ, рвота и поносъ, напряженіе къ рвотѣ даже при совершенной пустотѣ желудка, болѣе или менѣе сильныя боли въ желудкѣ и кишкахъ; крѣпкій, скорый и неправильный пульсъ, затруднительное и скорое дыханіе, не рѣдко шатающая походка, такъ чио оправленный представляется пьянымъ; разширеніе глазныхъ зрачковъ. Больной впадаешь въ такую слабость, чио его можно до-

чеспъ мернвымъ, пульсъ постепенно ослабѣваєшъ и наконецъ слѣдуєшъ смерть. Нѣкоторые изъ сихъ ядовъ причиняюшъ болѣе или менѣе сильныя судороги, ощущеніемъ членовъ и жестокія боли, заставляющія больного издавашь пронзительные вопли. Ядовитоспѣшъ сихъ расшепній въ степени весьма различна и зависишиша отъ разноспши пріемовъ.

Лѣченіе.

§ 257.

При лѣченіи оправленныхъ оспрѣмы ядовитыми расшепніями надлежитъ поступашь шакъ, какъ показано при лѣченіи оправленія сулимою и мышьякомъ, исключая, что здѣсь не нужно давать яичнаго бѣлка и всячески остерегаешься употребленія рвотнаго, уксуса и другихъ раздражающихъ напицковъ, ожесточающихъ шокомъ болѣзнь.

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ поглощенный ядъ не причиняєшъ сильныхъ болей въ животѣ, а только обильную рвоту, чрезмѣрную усталость и безчувственность, и тогда по принятіи доепшаточнаго количества парнаго молока, для споспѣшствованія рвоты, надлежитъ дать иѣсколько небольшихъ чашекъ кофе, приготовленного изъ 16 лоповъ пережженаго и въ порошокъ превращеннаго

кофе съ двумя бузылками кипачей воды посредствомъ наспаиванія и процѣживанія. Сверхъ этого употреблять опѣ вре- мени до времени по 3 или по 4 грана распаренной съ яичнымъ желткомъ кам- форы. Если спрѣждущій имѣешь оправ- щеніе къ внутреннему употребленію кофе, то можно спавиши ему клиスピръ изъ онаго и впишашь его на брюхъ.

Не обходимо нужно замѣчать, окажущ- ся ли на послѣдокъ боли въ брюхѣ или нѣть. Если сіе случится, то нужно попи- часъ припушшишь къ оному опѣ 12 до 16 піявокъ.

Если вмѣсто повсемѣженній слабости обнаружится напротивъ этого сильное возбужденіе въ шѣль, судороги, съумас- шествіе и проч.; то надлежитъ давать послѣ произведенной сахарною водою рвоты оправъ маковыхъ головокъ, при- гоновленіе коего предложено при лѣче- ніи оправленія мышьякомъ (§ 245).

Одуряющіе или усыпительные яды.

§ 258.

- 1) Опій или сонное зелѣ.
- 2) Белена или блекоппа (*Nyosciamus*).
- 3) Ядовитый салатъ (*Lactuca virosa*).
- 4) Паслёнъ, наимаче черный.
- 5) Тисъ или пихтовое дерево (*Taxus baccata*).

Припадки отравленія.

По принятіи какого либо изъ сихъ ядовъ, или по употребленіи ихъ снаружи въ большомъ количествѣ, обнаруживающіяся слѣдующіе припадки: оглушеніе, шатаніе въ головѣ, наклонность ко сну, постепенно увеличивающаяся и наконецъ дѣлающаяся непробудимою; нѣкоторый родъ опьянелости, иломный взглядъ съ весьма разширенными глазными зрачками, бѣсновашій или веселый бредъ, иногда боли, небольшія или сильныя судороги въ различныхъ часахъ шѣла и параличъ въ ногахъ. Пульсъ бывающъ переменчивый, но большою часію въ началѣ болѣзни полный и крѣпкій, дыханіе ускоренное; оказывается рвота, напаче, если ядъ приложенъ былъ къ ранамъ или употребленъ въ клиシリѣ; въ скоромъ времени попомъ судороги и успашась увеличиваются и больной умираетъ, если не будешь подано никакой помощи.

Лѣченіе.

§ 259.

Если ядъ поглощенъ внутрь, то нужно спопчать взять 24 граны бѣлаго купороса и, расщворивъ его въ сшаканѣ воды, дашь сперва половину сего раствора, а

попомъ, если черезъ чешверть часа не произойдешь рвоты, и оспальную часы его. Дѣйствію сего средства можно споспѣшествовать вкладываніемъ перспа въ глошку и щекопаніемъ сей послѣдней перышкомъ. При семъ однажды надлежишь остерегаться разводить рвотное большимъ количествомъ воды, или давать слишкомъ много жидкостей для удобнѣйшаго произведенія рвоты: ибо сие не только бесполезно, но еще приведетъ болѣзнь въ худшее состояніе.

Когда больной совершенно испражнишь ядь рвотою или низомъ, то надлежишь давать поперемѣнно чрезъ пять минутъ одинъ разъ чашку разведенаго водою уксуса или лимоннаго сока, либо винаго камня (креморпарата), а другой разъ чашку кофе, приготовленного наспаиваніемъ 16 ложекъ хорошо пережженаго кофе двумя бушылками кипячей воды и чрезъ 10 минутъ процѣженаго чрезъ холщинку. Употребленіе сихъ кислотъ и кофе надлежишь продолжать до шѣхъ поръ, пока больной будешь въ опасности. Оцѣнѣлось членовъ уничтожающія преніемъ рукъ и ногъ кускомъ сукна. Въ такомъ случаѣ, когда сонливость очень велика и болѣзнь сходствуешь съ пострѣломъ, а отъ употребленныхъ средствъ нѣшь никакого облегченія, можно пускать кровь изъ руки, а наилуче

на шеѣ, изъ шейной кровевозвратной жилы (*Vena jugularis externa*).

При оправлениі сими ядами, особенно опіемъ, обливаніе холдою водою головы и груди, оказываетъ чрезвычайную пользу, даже и въ такихъ случаяхъ, гдѣ уже смерть представляется неизбѣжною.

II.

СИНИЛЬНАЯ КИСЛОТА.

(*Acidum Borussicum, sev. hydrocyanicum*)

и всѣ содержащія оную вещества, какъ то:

- a) Лаврово-вишневые листы, приготавляемая изъ нихъ вода, масло и экстрактъ.
- b) Горькие миндали.
- c) Корка черемухи (*Cort. pruni padi*).

Пріпадки стравленія.

§ 260.

Пріпадки, происходящіе отъ разведенной синильной кислоты и содержащихъ оную вещества, вообще одинаковы съ пріпадками оправления усыпительными ядами (Смоп. § 258); но въ числѣ со-сияніи кислота сія сосипавляетъ споль сильный ядъ, чпо оправленный ею

умираеши мгновенно и безъ всякихъ припадковъ.

Л ъ ч е н і е.

Если оправление произошло опь разжиженной синильной кислоты (поелику опь крѣпкой смерти слѣдуешъ въ столь скоромъ времени, что не льзя подать никакой помощи), или опь расщеплій, содержащихъ въ себѣ оную кислоту; то надлежишъ спаравшися произвести рвоту, какъ показано при лѣченіи оправленія одуряющими ядами (§ 259); попомъ давашъ предположенный шамъ же настой кофе и чрезъ полчаса три или четыре ложки скилидарнаго масла, смѣшиваемаго съ настоемъ кофе. Наспояшимъ пропивуяднымъ средствомъ почишаеши лещучая щелочь или нюхательный спиртъ.

ОГЛУШАЮЩЕ-ОСТРЫЕ ЯДЫ.

I. Ядовитые грибы.

§ 261.

- a) Мухоморъ (*Agaricus muscarius* L.).
- b) *Agaricus bulbatus vernus*.
- c) Смертоносный грибъ (*Agaricus pescator*).
- d) Лѣснякъ (*Agaricus praelatus*) и многие другие роды.

Пріпадки отравленія.

Хотя опправление грибами по разношпи родовъ ихъ обнаруживается разными явленіями, но вообще признаки онаго со-ставляющъ: колика, наклонность къ рвотѣ, рвота и поносъ, жаръ въ кишкахъ, успалость, сильныя, почши безпрерывныя боли, судороги въ разныхъ часпяхъ шѣла, несперимаемая жажда. Пульсъ бываетъ малый, твердый, напряженный и скорый. Иногда оказывается нѣкоторый родъ опьяненія, пихій бредъ и сонливость, ехъ копорой больные до шѣхъ поръ находящіяся, пока боли и судороги не пробудятъ ихъ, а иногда при полномъ владѣніи ихъ чувствами изнуряясь

сильными болями, судорогами и обмороками, умираютъ они. Вообще припадки отравления обнаруживаются по прошествии 5, 7, 12 и даже 24 часовъ послѣ ядѣнія шаковыхъ грибовъ.

Лѣченіе.

§ 262.

Коль скоро замѣчаются припадки отравленія грибами, то сей часъ нужно дать рвотное изъ бѣлаго купороса по приложенному при лѣченіи отравленія оглушающими ядами (§ 259) способу. Послѣ рвоты для испражненія оспавшихся въ кишкахъ грибовъ, нужно принять при или чепыре лопша Аспраханской либо Сибирской соли и поставишь промывательное (клистиръ), приготовленное изъ двухъ лопцовъ Александрійскаго листа, варенаго въ двухъ бушылкахъ воды до половины и одного или двухъ лопцовъ горькой Аспраханской соли. Если послѣ сего не произойдетъ никакого испражненія, то можно повторить сіе промывательное два или три раза. Буде послѣ всѣхъ сихъ средствъ не воспослѣдуешь испражненія грибовъ и болѣзнь увеличиться, то взявъ одинъ лопть курительного табаку, варишь онъ съ одною бушылкою воды въ продолженіи чешверти часа и процѣдивъ чрезъ холстинку, сдѣлать клистиръ.

По испражнениі яда можно давать больному по споловой ложкѣ чрезъ часъ смѣсь, сославленную изъ осьми лоповъ ромашковаго, бузинного или мяшнаго наспоя и двухъ чайныхъ ложекъ Гофманскихъ капель.

Но если больной будешь жаловаться на сильныя боли въ брюхѣ, то надобно употреблять сахарную воду, ошваръ льняныхъ сѣмянъ или проскурниченаго корня, прикладывать къ болящимъ мѣстамъ холстинку, обмакиваемую въ сіи самыя жидкости и дѣлашь ванну. Когда послѣ сего боль не уменьшился, то припушшишь къ самой чувствительной части брюха 10 или 12 піявокъ и поспущашъ шакъ, какъ показано при оправлении оспрыми расшипельными ядами (смошири § 257).

Когда больной останется безъ всякой помощи до шѣхъ поръ, пока обнаружится уже сильная горячка, вздушность и сильная боль брюха, сухость языка, большая жажда и палящиій жаръ въ кожѣ, во рту и глоткѣ, то вышеприведенныхъ раздражающихъ слабительныхъ употребляшь не должно, а тощасъ приспушишь къ кровопусканію изъ руки, піявкамъ, припускаемымъ къ брюху, припаркамъ, дѣлаемымъ на ономъ и клиスピрамъ изъ льняныхъ сѣмянъ и льнянаго масла.

Признаки подозрительных грибовъ.

§ 263.

Вообще должно почтапть не безвредными грибы 1) шѣ, кои распушъ на мокрыхъ и болотистыхъ мѣсахъ, въ шѣни гусиныхъ лѣсовъ, куда солнечные лучи не проникаютъ.

2) Грибы ноздреватые, мягкие и содержащіе въ себѣ множесшво жидкости, также имѣющіе влажную и какъ будто замаранную поверхность.

3) Тѣ, кои имѣють пахкость, сильный запахъ и разноцвѣтную поверхность, кои, будучи разрѣзаны, скоро перемѣняютъ свой цветъ, особенно распушающіе въ шѣни кучами.

4) То же должно заключать и о пакихъ, кои надѣдены насекомыми и опять оспавлены, кои имѣють мягкия ножки или спебельки и кои скоро роспупутъ и также скоро портятся.

Ядовитые грибы и по высушеніи не теряютъ вредныхъ своихъ качествъ.

II. Одуряюще-острыя РАСТЕНИЯ.

§ 264.

а) Табакъ (*Nicotiana Tabacum*).

б) Красивица или сонная одурь (*Atropa Belladonna*).

- c) Дурманъ (*Datura stramonium*).
- d) Красный наперсточникъ (*Digitalis purpurea*).
- e) Ядовитый болиголовъ (*Cicuta Virosa*).
- f) Плевель (*Lolium temulentum*).

Означенные здесь яды, послѣ несоразмѣрнаго внутренняго или наружнаго употребленія ихъ произражающъ слѣдующіе припадки: беспокойство, боли, пронзительный крикъ, судорожныя движения мышицъ лица, челюстей и членовъ, разширение глазныхъ зрачковъ, крѣпкій, скорый и правильный или напропивъ малый, медленный и неправильный пульсъ, наклонность къ рвотѣ, упорную рвоту и поносъ, болѣе или менѣе сильныя боли въ брюхѣ. Иногда вмѣсто беспокойства и сильныхъ судорожныхъ движений оказывается нѣкоторый родъ опьяненія, большая успалость, дрожаніе во всѣхъ членахъ — и больные не чувствующіе никакой наклонности къ рвотѣ.

Лѣченіе.

§ 265.

Если оправленнаго не рвешь, то нужно дать рвотное, какъ предложено при лѣченіи оправленія опіемъ и другими усыпительными ядами (смопри § 259). Буде же ядъ поглощенъ давно, то дать

слабищельное и поспавиши клиスピръ, какъ показано при лѣченіи оправлениія ядовитыми грибами (§ 262). Когда болѣй послѣ рвоты и испражненія низомъ сдѣлаешься очень сонливымъ и будешь имѣть признаки приближенія поспрѣла, то пусшиши кровь изъ руки, попомъ давашь чрезъ пять минутъ по чашкѣ разведенного по поламъ водою уксуса, лимоннаго сока, или другихъ кислыхъ веществъ, коихъ употребленіе щеперь щолько полезно, а прежде испражненія яда вредно. Можно также снаружи напирашь все шѣло разведеннымъ уксусомъ. При сильныхъ боляхъ въ брюхѣ припушшиши 12 піявокъ къ оному, употребляшь внутрь сахарную воду, парное и миндальное молоко, ошварь льняныхъ сѣмянъ, проскурнячнаго корня и проч., поспупая шакъ, какъ при оправлениі осирными ядовитыми расщепленіями (§ 257).

III. Спиртные напитки.

§ 266.

- a) Винный спиртъ, ромъ, коньякъ и пр.
- b) Водка или хлѣбное вино.
- c) Ликеры и наливки.
- d) Виноградныя вина.

Припадки.

Послѣ употребленія въ большомъ ко-

лическихъ напишковъ слѣдуешьъ опьяненіе, головная боль, раздупость и мѣдный или багровый цвѣтъ лица, бѣніе и напряженіе кровеносныхъ шейныхъ жилъ, шрудное и не рѣдко съ хрипотою соединенное дыханіе, передвигиваніе губами, вонючій, сивухъ подобный, запахъ изо рта; кислія опрыжки, параличъ нижнихъ конечносостей, или цѣлой половины тѣла, неправильное испущеніе мочи и кала, судороги челюстей, пѣна около рта, совершенное безчувствіе и нако-
нецъ посирѣль.

Лѣчіе.

§ 267.

Надлежишъ въ скоромъ времени произвести рвоту употребленіемъ трехъ или четырехъ гранъ бѣлаго купороса, распивованного въ спаканъ теплой воды и щекопаніемъ зѣва. По произведеніи рвоты должно давать больному чрезъ десять минутъ по полспакану воды съ примѣсью одной ложки уксуса или лимоннаго сока, поставивъ клиシリ изъ Александрийскаго листа и Астраханской соли, какъ показано при оправлении грибами (§ 262) и наширавъ все тѣло холщинкою, обмакиваемою въ уксусъ. Если больной, не смошря на употребленіе сихъ средствъ, впадаетъ въ сонную немочь и имѣетъ

крайкое сложеніе шѣла, то надлежитъ открыть кровь изъ руки, или еще лучше пропустить 12 піявокъ къ шеѣ.

Обливаніе холодною водою, особливо головы и груди, также очень полезно здѣсь.

ОБЪ УКУШЕНИИ РАЗНАГО РОДА ЗМѢЙ.

Припадки укушенія.

§ 268.

На укушенномъ мѣстѣ появляется сперва жгучая боль, распространяющаяся въ скоромъ времени по всему члену и проникающая даже внутрь шѣла; пошомъ обнаруживается опухоль, которая сначала бываетъ твердая и блѣдная, потомъ красноватая, а наконецъ синяя и какъ бы аншоново-огненная: она увеличивается и мало по малу занимаешь ближайшія части; при семъ оказываются обмороки, рвота и судорожные движения, а за ними слѣдуешь не рѣдко желтуха. Желудокъ бываетъ сполъ чувствителенъ, что ничего не можешь удержать въ себѣ; пульсъ скорый, малый, неправильный; дыханіе затруднительное, попъ обильный и холодный, сила зреїя

и умственныхъ способностейъ умаляется. Испекающая въ началѣ изъ раны кровь часпо бываешьъ черноваша, а по прошеспвіи нѣкотораго времени выходишьъ изъ оной смрадная сукровица. Но когда опухоль очень увеличилась, то малые сосуды препятствующіе кровообращенію крови; покрывающая ихъ кожа охладѣваешьъ и пульсъ дѣлаешьъ едва примѣщеннымъ.

Дѣйствіе змѣинаго яда по разносчи климата бываешьъ различно. Въ холодныхъ спранахъ и самыя змѣи рѣдко вспрѣчаются, да и ядъ ихъ гораздо слабѣе, нежели въ жаркихъ.

Лѣченіе.

§ 269.

Топчасъ надлежишъ слегка перевязать членъ выше укушенаго мѣста, не употребляя впрочемъ для сего слишкомъ тонкихъ и жесткихъ снурковъ. Повязку шаковую не должно оставлять на долгое время; ибо она синій цвѣтъ опухоли увеличилась и развитію антибактериального спасительства будешьъ.

Изъ раны нужно пустить кровь и дѣлашь умѣренное давленіе вокругъ укушенаго мѣста, дабы выжать не всосанный еще ядъ. Если это возможно, то спраждущій членъ надлежишъ погрузить

на нѣсколько времени въ теплую воду, дѣлашь на немъ умѣренное давленіе и окушывашь мокрою хол спинкою.

Если болѣзнь шрудная, опухоль нарочито велика и боли очень сильны, по перевязку надлежитъ сняшь, остерегаясь всячески дѣлашь нарѣзы на укушенномъ мѣстѣ, часто умножающіе шокомъ припадки, а лучше всего прижечь рану *раскаленными*, соразмѣрнымъ величинѣ раны *жукскомъ* желѣза. Чѣмъ болѣе раскалено желѣзо, тѣмъ менѣе будетъ боль во время прижиганія. Либо взявъ чесаной хлопчатой бумаги и сдѣлавши изъ нее посредствомъ обведенія вокругъ хол спинкою, видъ довольно крѣпкаго цилиндрика, длиною въ дюймъ, а шириной въ полдюйма, поспавиши его основаніемъ на рану, а верхушку накапавъ нѣсколько масломъ, зажечь и оставиши до шѣхъ поръ, пока она вся сгоришь. Къ сему можно же служиши шакже мыльный щелокъ, коимъ надлежитъ не только очищашь рану, но и прикладывать корпю, обмакиваемую въ щелокъ, укрѣпляя ее перевязкою и возобновляя по прошествіи четырехъ или пяти часовъ. Так же можно употребляти здѣсь Ѣдкую извѣстъ и мыло. Приготовивъ тѣсто изъ двухъ лоповъ чистаго мыла и шакого же количества Ѣдкой извѣстни, съ прибавленіемъ воды и намазавъ хол спинку, шолощеною въ 1 или 2 линіи, приложиши къ

ранъ и прикрывъ повязкою, оставиши на чешверть или на полчаса.

По прошествіи нѣкотораго времени, надлежиши прикладывать на близь лежащія вспухшія мѣста раны смѣсь изъ одной части жидкаго Ѣдкаго амміака (нюхательнаго спирту) и двухъ частей деревяннаго масла. Если важнѣйшіе припадки значительно уменьшатся, то Ѣдкое средство нужно снять прочь и приложить на мѣсто его холстинку, обмоченную въ деревянное масло, попомъ нащирать членъ опять времени до времени деревяннымъ масломъ, съ прибавленіемъ нѣсколькихъ капель нюхательнаго спирту.

Внутрь шопчасъ послѣ укушенія и во время наружнаго лѣченія надлежиши давать больному чрезъ два часа по стакану настойки бузинныхъ цвѣтовъ, съ прибавленіемъ 6 или 8 капель жидкаго амміака (нюхательнаго спирту); можно также давать по рюмкѣ мадеры или ксересу вина, положишь больного въ хорошо покрытую поспель и споспѣшевшую испаренію кожи, тщательно остерегашь его опять простуды. Если оказывается желчная рвота или желтуха и антононъ огонь въ наружныхъ частяхъ распроспрянляется, то взявъ 8 лоповъ изрѣзанной дубовой или вербовой корки, вариши въ продолженіи получаса въ двухъ бушылкахъ воды; по прошествіи сего

времени, прибавишь лопть очищенного паштырю и два золотника ромашковыхъ цветковъ и давъ поспояшь до проспуженія, процѣдишь и употребляши при раза въ день по одной рюмкѣ.

При уменіи болѣзни и насупленіи выздоровленія не должно давать въ первые дни никакой швердой пищи, а только два или три раза легкіе супы въ маломъ количествѣ.

Если укушеніе причинило умеренную болѣзнь, опухоль не очень велика, больной не имѣетъ ни наклонности къ рвотѣ, ни обмороковъ; то раздвинувъ съ осиротленіемъ края раны и взливъ на ону одну или двѣ капли нюхательнаго спирта (жидкаго амміака), покрыши ее небольшимъ свершкомъ корпіи или шонкой холстинки, обмоченной симъ же самымъ спиртомъ и укрепиши слегка повязкою; больной членъ напиравши умеренно теплымъ деревяннымъ масломъ и окупывались холстинкою, обмоченою въ сіе масло. Внушаши черезъ два часа давай по чашкѣ бузинного или ромашковаго чаю (настою), съ прибавленіемъ пяти или шесци капель жидкаго амміака.

О ВЪ УКУШЕНИИ ТАРАНТУЛА.

§ 270.

Въ Южныхъ провинціяхъ Россіи встрѣ-

чаешия весьма много шараншуловъ. Образованіемъ своимъ они сходишающъ съ обыкновенными пауками, но величина ихъ несравненно больше. Цвѣтъ изъ желта-сѣрый или бурый, а съ исподи черный и на ногахъ имѣешся съ низу черная перевязка.

Опасность отъ сего насѣкомаго для людей и живопынхъ состоишъ въ слѣдующемъ: шараншуль весьма оспорожно залязаешь къ спящему на полѣ человѣку (или живопыному) и сосепъ его кровь, оставляя едва примѣтную рану. Приснувшись, укушенній чувствуешь въ ней боль, постепенно увеличивающуюся; мѣсто шаковое воспаляешься и воспаленіе въ нѣсколько часовъ объемлешъ значительное проспранство шакъ, чѣмъ въ короткое время распухаешь весь членъ. Укушенній беспокоишся, появляешься горячка, а въ высшей степени и судороги. Больной находишь облегченіе въ движении, которое нѣкоторымъ образомъ сходишающъ съ пляскою, отъ чего и произошло мнѣніе, что укушенные шараншуломъ, принуждены безпреспанио плясать.

Слѣдствія укушенія не одинаковы: иногда, кромѣ опухоли, на укушенніомъ мѣстѣ ничего не бываешь; но при большой чувствительности, наипаче у молодыхъ людей поврежденіе шаковое сопровождаешься болѣе пягостными припадками. Особливо укушеніе въ голову

весьма опасно, если ядъ всосется и сообщится мозгу. Но самое опасное укушение бываешъ тогда, когда насекомому сему помѣшаюшъ сосаль, при чёмъ оставшійся ядовитый сокъ наисильнѣе дѣйствуетъ.

Если лѣченіе предпринято топчасъ по укушениі, то опасность бываешъ не велика, лишь бы ядъ не былъ давно уже всосанъ. Лучшее средство къ уничтоженію яда есть обмываніе раны нашатырнымъ (нюхательнымъ) спиртомъ, за недостаткомъ онаго можно употребить съ большою пользою растворъ поваренной соли или мочу. Если сіе произведено будеши топчасъ по укушениі, то не бываешъ никакихъ худыхъ послѣдователей.

При сильной горячкѣ и воспаленіи можно купать больнаго въ растворахъ солей и кислотъ, повторяя сіе въ трудныхъ случаяхъ раза три въ день.

Внутрь весьма полезно давать нашатырный (нюхательный спиртъ) по двѣ или по четыре капли въ бузинномъ или ромашковомъ чаѣ, поступая впрочемъ такъ, какъ показано при лѣченіи укушения змѣй (§ 269).

Объ ужаленіи пчелъ, осъ, шершней, оводовъ и другихъ ядовитыхъ насѣкомыхъ.

§ 271.

Въ умѣренномъ климатѣ ужаленіе сихъ насѣкомыхъ причиняетъ шокомъ болѣе или менѣе сильную боль, опухоль и слабую огневицу.

Если же насѣкомое шаковое прежде укушенія сосало ядовитыя распенія или шрупы умершихъ опѣ прилипчивыхъ болѣзней живопиныхъ, либо другое какое гнилое вещества или оно живешъ въ жаркомъ климатѣ; то припадки ужаленія бывають гораздо сильнѣйши, сходствующіе болѣе или менѣе съ припадками укушенія змѣй и могутъ даже причинить смерть.

Въ первомъ случаѣ употребляется для втиранія ужаленной части смѣщеніе изъ двухъ ложекъ миндального или деревянаго масла и одной ложки нашашырнаго (нюхательнаго) спирта, а внутрь чрезъ два часа по чашкѣ ромашковаго или бузиннаго чаю съ 5 или 6 каплями нашашырнаго спирта, какъ предложено при лѣченіи укушенія змѣй. Во второмъ же случаѣ надлежитъ выправливать ужаленное мѣсто шакимъ же образомъ, какъ показано при укушеніи змѣй (§ 269).

Если ужаленіе причинено пчелою, осою или шершнемъ и обнаруживаются неболь-

шай опухоль съ швердымъ бѣлымъ средоточиемъ, то сверхъ вышепоказанныхъ средствъ, нужно вынути жало насѣкомаго оспрѣемъ иглы, либо маленькими щипчиками. Вынувши жало, должно обмыть рану холодною водою, или лучше распворомъ поваренной соли и напирать вышеупомянутою смѣсью масла и нашапырнаго спирта, либо выжатымъ нѣсколько посоленымъ сокомъ изъ бѣлаго луку, покрывая пошомъ ужаленное мѣсто сверхкомъ корпіи или холстинки, напишанной распворомъ поваренной соли.

Если кого сильно искусаютъ комары и окажется огневица, то нужно положить больного въ поспель и давашь ему черезъ чешверть часа по чашкѣ наспоя померанцовыхъ листовъ, либо ромашковыхъ или бузинныхъ цвѣтовъ съ двумя или четырьмя каплями нашапырнаго спирта.

ОБЪ УКУШЕНИИ ВЪШЕНЫХЪ ЖИВОТНЫХЪ И О ТАКЪ НАЗЫВАЕМОЙ ВОДОВОЯЗНИ.

§ 272.

Первоначально бѣшенству чаще всего подвергаются волки, собаки, кошки и лисицы, а чрезъ сообщеніе можешь оно образоваться у человѣка и у весьма многихъ животныхъ.

Сію ужасную болѣзнь произраждають

многія причины, особенно же весьма часто замѣчены они во время очень жаркаго лѣта и сурої чрезвычайно холдной зимы.

Признаки бѣшенства у животныхъ бываютъ различны: либо 1) скоропоспѣшна яростъ, выпущенные, дикіе, сверкающіе глаза; чрезвычайное беспокойство и спремленіе къ бѣгству, нападенію и укушенію прочихъ животныхъ; отвращеніе отъ пищи и питья, щечеіе пѣнистой слюны; нечаянное лишеніе силь и смерть, либо 2) Животные та��овыя дѣлаются пасмурными; лежащъ уединенно; измѣняются въ голосѣ; имѣютъ впалые, мутные и красные глаза; не принимаютъ пищи; становятся беспокойны; кусаютъ подходящихъ къ нимъ людей, даже самыхъ знакомыхъ; убѣгаютъ со двора съ опущеною внизъ головою, съ поджатымъ хвостомъ; шатаются, дѣлаютъ непрямой ходъ и испускаютъ изо рта пѣняющуюся слюну; другія животные убѣгаютъ ихъ и не прогаютъ обмоченного слюною ихъ куска хлѣба или другой пищи.

Вообще бѣшеные животные боятся подносимой къ нимъ воды и другихъ жидкостей, которыхъ, равно какъ свѣтъ и яркіе цвѣты, умножаютъ ихъ бѣшенство.

У людей обнаруживается сія болѣзнь слѣдующимъ образомъ:

Послѣ укушенія бѣшенымъ животнымъ, проходиши нѣсколько времени, въ кошорое не примѣчаешся въ больномъ никакихъ припадковъ. Наконецъ рана, кошорая уже зажила, дѣлаешся опять красною безъ всякой извѣдѣйствующей на онуу причины. Съ симъ обнаруживаешся шоскливость, уныніе, ошвращеніе отъ пищи и питья, нѣкоторая спепень жабы, или воспаленія горла, при коемъ глошаніе затрудняется.

Но вдругъ спрашущій болѣе уже не можешъ глошать никакой жидкости и при одномъ взглядѣ на онуу чувствуешь дрожь, беспрѣшанно плюещъ, иногда бѣсится, хочешь кусать и т. д.

Болѣзнь сія обыкновенно оканчивающія корчами, кошорая наносящъ смерть нерѣдко въ два, или три дня.

Лѣченіе.

§ 273.

При лѣченіи главное дѣло соспощиши въ шомъ, чтобы искоренишь ядъ и уничтожишь образованіе болѣзни въ самомъ началѣ ея.

Средства, попробныя для сего, суть вообще слѣдующія:

- Сперва надобно крѣпко перевязашь членъ повыше раненнаго мѣста.
- Буде есть искусствій Хирургъ, то

можно шопчасъ вырѣзать укушенное мѣсто, или прижечь его раскаленнымъ желѣзомъ. Сверхъ того немедленно обмыть рану крѣпкимъ разсоломъ, либо мыловарнымъ щелокомъ, дѣлать вкругъ ея кровавые нарывы и прикладывать кровососныя банки, оспавляя ихъ до полѣ, пока отшуда выплюнется значительное количество крови. Произведши сie, насыпать на раненое мѣсто отнеспрѣльный порохъ и зажигать; пошомъ прикладывать на оное испанскихъ мухъ порошокъ и безпреспанно въ шеченіи 6 или 7 недѣль производить нагноеніе въ ранѣ посредствомъ вкладыванія въ оную горошины, бобовины, либо кусочка фіалковаго корня.

По новѣйшимъ наблюденіямъ оказалось весьма полезнымъ и весьма предохраняющимъ опѣ водобоязни средствомъ высасываніе раны, производимое шопчасъ по укушеніи самимъ раненнымъ или другимъ кѣмъ. Въ Ліонѣ есть даже шеперь шакія женщины, кои въ жаркое время исключительно занимаются высасываніемъ ранъ, нанесенныхъ бѣшенными собаками.

Равнымъ образомъ увѣряюшъ, основываясь впрочемъ на основательныхъ къ шому поводахъ, что шеплая кровь бѣшеннаго живошнаго, принятая шопчасъ по укушеніи, предохраняетъ опѣ водобоязни.

*Внутреннее лѣченіе укушеніемъ бѣшенымъ
животнымъ теловѣка.*

§ 274.

Въ первыя дни по укушеніи надлежитъ споевъспроводить испаренію кожи, употребленіемъ нашашырнаго спирта, даваемаго отъ 6 до 8 капель, съ наспоемъ бузинныхъ или ромашковыхъ цвѣтовъ, какъ показано при укушеніи змѣй (§ 269). Впрочемъ, если рана очень воспаляется и болитъ, то лучше давашь отваръ проскурнячнаго корня или льняныхъ сѣмянъ. При швердомъ и маломъ пульсѣ можно пустить кровь изъ руки: когда языкъ покрытъ желтою слизью и во рту оказывается глинистый вкусъ, то нужно произвесить рвоту посредствомъ теплого крѣпкаго наспоя ромашковыхъ цвѣтовъ и дашь слабительное изъ двухъ лоповъ Астраханской горькой соли, припомъ употреблять легковаримую пищу и дѣлашь умѣренное движение тѣла; а если обнаружишся горячка, то соблюдать спротивную дѣшу.

Средство, предохраняющее отъ водоболезни.

§ 275.

Изъ многочисленныхъ средствъ, предложенныхъ на сей конецъ, одно, заслужи-

вающее болѣе всѣхъ уваженія и могущее по видимому доспавлять несомнѣнную пользу — есть испрѣбленіе пузырьковъ, показывающихся у укушенныхъ бѣшеною собакою или волкомъ подъ языкомъ. Оно открыто въ Россіи Штабъ-Лѣкаремъ Листовымъ и подтверждено также нѣкоторыми иностранными врачами.

По замѣчаніямъ ихъ на 6, 9 и 12 день, а иногда между 3 и 9 днемъ послѣ укушенія, опекраиваются у больного подъ языкомъ отъ 3 до 9 и болѣе просоподобныхъ прыщиковъ или пузырьковъ, коѣные возрасшаюшь иногда до величины бобового зерна; по прошествіи 24 часовъ исчезаютъ, не оставляя никакого признака своего существованія. Прыщики сіи надлежитъ прокалывать, или дѣлать насѣчки на онѣхъ, чрезъ чѣо выпекаешь гнойная матерія, копорую нужно, сколько можно, болѣе выдавливашь. Проколы можно дѣлать раскаленною или проспою иглою, а насѣчки ланцетомъ или другимъ орудіемъ, и послѣ напирать подъ языкомъ поваренною солью и промывашь полость рта крѣпкимъ ея растворомъ или уксусомъ, либо отваромъ красильнаго дрожа, запрещивъ спрого больному глоташь онѣй, дабы съ нимъ не попалось въ желудокъ выпущенной изъ пузырьковъ матеріи. Вмѣсто обыкновеннаго пипъя давашь каждый день по полпора фунта

опвара красильного дрока (*Genista lutea sev tinctoria*).

Если же сказанные пузырки лопнутъ сами собою и вышекающая изъ нихъ ма-шерія будешъ проглочена или всосана всасывающими сосудами, то въ такомъ случаѣ смерть неизбѣжна.

Польза водяного попутника.

§ 276.

Водяной попутникъ (*тастиха, шильникъ*) (*Alisma Plantago L.*) распенъ въ водѣ, въ болотахъ, озерахъ и въ большихъ споя-чихъ лужахъ. Корень его подобенъ луку съ полстыми мочками. До Іюня мѣсяца находишся сіе распеніе въ водѣ, а въ на-чалѣ Іюля, при очень же теплой погодѣ и въ Маїѣ выходяще изъ воды по оди-начкѣ длинныя полуокруглыя его киспи. Киспи сіи имѣюще снаружи нѣсколько красновашую кожицу, на всякой изъ нихъ находишся лице-сердцеобразный, гладкій и темной краски листочекъ. Въ Іюль мѣ-сяцѣ показывающіяся уже круглый, зеленої краски спебель сего распенія, снабжен-ный однимъ бугромъ, подобно спаржи; иногда выходящій онъ изъ воды безъ листьевъ, а иногда съ листами. Сей спе-бель раздѣляющіяся на многіе совершенно безлистные оппрыски, на верхушкѣ ко-ихъ находящіяся маленькие шрилисные

цвѣточки блѣдно-краснаго цвѣта, а по-
шомъ образуешся и сѣмя.

Употребленіе сего средства состоитъ
въ слѣдующемъ: корни его собираютъ
въ Августѣ мѣсяцѣ, очищають ихъ со-
вершенно отъ ила и земли, пошомъ вы-
сушивають на солнцѣ, берутъ отъ од-
ного до двухъ, трехъ и болѣе корней,
смокрия по величинѣ ихъ, распирають
въ порошокъ, насыпають его на хлѣбъ,
намазанный масломъ и даютъ больному
съѣдать. Двукрашное, или по крайней
мѣрѣ прекрашное употребленіе сего сред-
ства, досчаточно уже для уничтоженія
яда бѣшеной собаки. Его можно давать
и въ шо время, когда начнетъ обнару-
живаться бѣшенство и водобоязнь. Сей
корень оказываетъ равную силу и у жи-
вотныхъ, при уязвленіи ихъ бѣшеною
собакою. Впрочемъ дѣйствіе его невсегда
бываєтъ вѣрное.

ЛѢКАРСТВЕННЫЕ СОСТАВЫ.

№ 1.

Уксусо-медъ.

Возьми одну чашень хорошаго уксуса и двѣ
чашни чистаго меду, поспашь на огонь и вари
въ чистомъ немуравленномъ горшкѣ (но не
въ косшрюль) до тѣхъ поръ, пока во время
кипѣнія будешъ оказываться пѣна, которую
надлежитъ снимать до совершеннаго ея очи-
щенія; по помъ снявъ съ огня и давъ про-
спынуть, влей въ спеклянныи сосудъ и храни
для употребленія.

№ 2.

Полосканье.

а) Возьми обыкновеной воды полбушылки,
уксуса чешыре лопа, меду два лопа и смѣ-
шивъ ихъ надлежащимъ образомъ посредствомъ
болшанія, выполаскивай почаше ропъ.

Или

б) Возьми винныхъ ягодъ два лопа, вари ихъ
въ продолженіи четверти часа въ одномъ фун-
тѣ ячменного пышья (смопр. § 9), по помъ про-
спуди и выполаскивай имъ ропъ.

№ 3.

Противъспалительный составъ.

Возьми ячменного пышья (приготовленнаго,

какъ показано въ ф 9, безъ уксусо-меду) двенадцать споловыхъ ложекъ, селишры, сперой въ порошокъ, два золотника, уксусо-меду подъ № 1 чешыре споловыя ложки, смѣшай надлежащимъ образомъ и давай больному шесть разъ въ день по одной или по двѣ споловыя ложки.

№ 4.

Крѣпительная наливка.

Бозьми травы полыни два лопта, корицы одинъ золотникъ, налей на нихъ кипячей воды полбушылки и дай поспоясть въ закрытомъ сосудѣ въ продолженіи часа, пошомъ процѣди и принимай чрезъ два часа по споловой ложкѣ.

№ 5.

Пластырь шпанскихъ мухъ.

Бозьми еловой смолы одинъ лопть, счищенаго несоленаго свинаго сала два лопта, желшаго воску шри лопта, смѣшай ихъ, положи въ глиняную плошку и поспашь на раскаленныя уголья, чтобъ оная смѣсь расплодилась, пошомъ снявши съ огня, прибавь полпора лопта превращенныхъ въ порошокъ шпанскихъ мухъ и мѣшай деревянною лопаткою, пока проспынешь.

№ 6.

Горчичникъ или горчичное тесто.

Бозьми кислаго тесто, приготовленного для печенія хлѣбовъ и смѣшавъ его съ половинною частію порошка горчицы, намажь оное на хол-

спинную вепрошку, величиною въ ладонь или и болѣе (смотря по надобности), а толщиною въ палецъ и прикладывай, куда слѣдуешьъ, наблюдая, чтобы горчичное мѣсто лежало на приложенномъ мѣстѣ не болѣе 2 или 3 часовъ.

При недоспаникѣ горчицы можно употреблять для сего порошокъ волчьяго лыка или испермажаго хрѣну.

№ 7.

Камфорный спиртъ.

Возьми чистаго хлѣбнаго вина (пѣннику) одинъ шпофъ, положи въ оное 4 лопа камфоры и закупоривъ сосудъ, держи въ тепломъ мѣстѣ, пока оная распустится.

№ 8.

Камфорный уксусъ.

Взявъ камфоры одинъ золотникъ, спереть ее съ 40 каплями чистаго хлѣбнаго вина и 4 лопами сахару до превращенія ихъ въ мелкій порошокъ; попомъ помѣшивая, прибавлять по немногу уксусъ, мѣрою до полубузылки.

№ 9.

Рвотные средства.

Смѣшавъ вмѣстѣ одну споловую ложку копытнаго или линялого масла, половину ложки проспой соли и шесть ложекъ тепловой воды и принять на тощахъ.

№ 10.

Смѣшавъ съ чистою водою третью часть

золотника корня подъесника, превращенного въ мелкій порошокъ, принять разомъ.

No 11.

Слабительные средства.

Размѣшавъ въ одномъ стаканѣ огуречнаго разсолу, двѣ споловыя ложки меду, выпить вдругъ на щощахъ.

Сюда относятся также и средства, означенныя въ § 46, подъ № 2, а) б) с) и д).

No 12.

Крѣпительное вино.

Возьми корня горечавки, ириаго корня по 1 лопшу, дерева квассии, корицы, кардамону или сухихъ померанцовъ, каждого по $1\frac{1}{2}$ золотника, превративъ всѣ сіи вещества въ крупный порошокъ и наливъ на оные 6 лопсовъ Кизлярской водки или спирту и 30 лопсовъ хорошаго краснаго вина, поставивъ въ теплое мѣсто на цѣльые сушки, попомъ процѣди съ выжимкою и принимай чрезъ два часа по споловой ложкѣ.

No 13.

Глазная примотка.

Возьми слизи, (приготовленной изъ двухъ лопсовъ льняныхъ семянъ, варенныхъ въ фунтѣ воды до половины) одну споловую ложку, распустивъ въ фунтѣ ошварной или розовой воды, прибавь 30 капель свинцового уксуса, подъ № 17 означенного, и смѣшавъ надлежащимъ образомъ, примачивай глаза.

№ 14.

Настой от кашля.

Взять проевирня, или Алтейного корня, шравъ: буквицы, бѣлокопытника и вероники, каждого по три ложи, солодковаго (лакричнаго) корня, анизовыхъ съмянъ и маковыхъ головокъ по 1 ложу, изрѣжь ихъ и смѣшай, попомъ возьми двѣ щепоши сего набора шравъ, положи въ чистый осудъ и обливъ б спаканами кипячей воды, дай нѣсколько времени настояться, а послѣ процѣди сквозь холшинку и пей теплое почаще.

№ 15.

Обыкновенный клистиръ или промывательное.

Возьми проспой соли или мыла два золотника, расщвори въ одномъ фунтѣ ошвара ячменныхъ крупъ, предложеннаго въ 59, или нашоя ромашки и прибавь льнянаго масла двѣ споловыя ложки; попомъ смѣшай и употребляй, когда нужно, тепловашое.

№ 16.

Болеутолительный клистиръ.

Возьми крахмала одинъ лопъ, кипячей воды полфунта, льнянаго или деревяннаго масла одинъ лопъ, смѣшай и употребляй тепловашое въ клистирѣ за однимъ разомъ.

№ 17.

Свинцовыи цуксусъ.

Возьми бѣлизъ или сурику полфунта, поло-

жи въ глиняный горшокъ и налей проспаго хорошаго уксусу одинъ шпофъ, вари на умѣренномъ огнѣ при часа, мѣшай деревянною лопашкою почаше; попомъ снявши съ огня, поспавь въ холодное мѣсто, чтобы порошокъ опсыль, и тогда уксусъ слей и храни въ шпофѣ.

No 18.

Свинцовая вода.

Возьми проспой чистой воды одинъ шпофъ, свинцового уксусу 4 ложки и смѣшай.

No 19.

Липкий пластырь.

Возьми еловой смолы и желтаго воску по два ложки, лыннаго свѣжаго масла одну ложку, смѣшай онъя, положи въ глиняную плошку и поспавь на раскаленные уголья, чтобы она смѣсь расппопилась; попомъ снявши съ огня, мѣшай деревянною лопашкою, пока проспышнесть.

Конецъ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.





П О Г Р Ъ Ш Н О С Т И
ПЕРВОЙ ЧАСТИ.

Ст.	Стр. съ в.	Нап.	Читай:
4.	1.	— почка	почки
	2.	— имѣющаясь	имѣющаяся
5.	14.	съ н. Корь	корь
—	—	— Хопля	, хопля
6.	17.	— испражняеши	испражняющи
22.	11.	съ в. одержанный	одержимый
27.	6.	съ н. шаеніи	шаяніи
28.	18.	— воздуха. Пріо-	воздуха пріобрѣ-
		брѣшаешся	шаешся
30.	12.	— все возможное	всевозможное
35.	12.	и пр. Гнилый	напр. гнилый
54.	1.	— шрудной	шрупный
56.	2.	съ в. испражненіи	испражненій
63.	11.	— въ пишье ли-	въ пишье. Лимо-
		моны,	ны,
68.	2.	съ н. на оной	къ оной
73.	1.	съ с. требляшъ.	употребляшъ
86.	12.	— пиво, хваляшъ	пиво.
—	13.	съ н. ренское вино	(ренское вино)

<i>Стр. съ и. Нап.</i>		<i>Читай:</i>
94.	5.	— ляжкахъ
100.	9.	— мужамъ.
125.	6.	— чрезъ полчаса, полчаса,
136.	5.	съ в. шемными
157.	8.	— соведеніе
145.	10.	— глазъ, чпені- глазъ чпеніемъ емъ
146.	9.	съ и. примочки.
		примочку подъ № 13.
150.	9.	съ в. ; безпримѣп- безъ примѣпной ной
151.	7.	съ и. и большею
155.	11.	съ в. произведепъ
170.	8.	— всемъ
172.	2.	— , въ шакомъ въ шакомъ слу- случаѣ
182.	2.	съ и. въширашь
192.	4.	съ в. проходу.
195.	14.	— обоихъ
198.	1.	ет и. пластиры
202.	15.	съ в. о граничи- просширается ваешся
212.	14.	въ и. спраданіе
214.	3.	гъ в. боль
230.	6.	съ и. часпое
235.	12.	съ в. припадковъ,
241.	15.	— предписы- предписывается ваешся.
250.	7.	— припадки
254.	10.	— принадлежа- предлежащей щей

Стр. съ и. Нап.

			Читай:
255.	3.	— сей	ей,
262.	8.	— прямой	прямой
268.	13.	— изюмъ	изюмъ
272.	10.	— исходъ	переходъ
284.	5.	съ в. пицци	пицци
288.	8.	попелиная,	попашная,
290.	14.	съ и. крови,	кровью,
—	4.	— сей	кошорый
323.	6.	— желаніе	жеваніе
324.	15.	— свѣденіе	совѣденіе
328.	9.	съ в. шеплою фла-	шеплой фланели,
		нелью,	
336.	8.	съ и. изложенный	изложенный же
359.	7.	съ в. неупомимый	неуполимый
342.	2.	— лисунного	мауиного
353.	14.	— само по себѣ	самы по себѣ
369.	5.	— рвота, веще- ствомъ	рвота вещеси- вомъ
374.	13.	— если	и если
	15.	— и брюха	, брюхъ
579.	11.	— неупомимую	неуполимую
392.	10.	— Clematis	Clematis
	11.	— Euphorbia	Euphorbia
	16.	— autumnale	autumnale
393.	4.	съ и. рвотъ,	рвотъ,
403.	1.	съ и. stramonium	Stramonium
425.	11.	съ и. поспавивъ	поспавъ









Предоставляю съ величайшою радостью
Книгу описанную АCADEMICOU IMPERATORSKOU
Академии Ведах. Издательство Государственное
издательство С. П. Третьякова в Москве.